

# 分支过程

赵敏智

Zhejiang University

April 16, 2019

1. 设 $\xi$ 是取值非负整数的随机变量,  
 $P(\xi = k) = p_k, k = 0, 1, \dots$ , 这里 $p_0 < 1$ .

# 模型介绍

1. 设 $\xi$ 是取值非负整数的随机变量,  
 $P(\xi = k) = p_k, k = 0, 1, \dots$ , 这里 $p_0 < 1$ .
2. 一个祖先 $Z_0 = 1$ .

# 模型介绍

1. 设 $\xi$ 是取值非负整数的随机变量,  
 $P(\xi = k) = p_k, k = 0, 1, \dots$ , 这里 $p_0 < 1$ .
2. 一个祖先 $Z_0 = 1$ .
3. 第一代个体数 $Z_1$ 与 $\xi$ 同分布.

# 模型介绍

1. 设 $\xi$ 是取值非负整数的随机变量,  
 $P(\xi = k) = p_k, k = 0, 1, \dots$ , 这里 $p_0 < 1$ .
2. 一个祖先 $Z_0 = 1$ .
3. 第一代个体数 $Z_1$ 与 $\xi$ 同分布.
4.  $Z_1$ 个个体独立繁衍, 方式与祖先一致. 用 $\xi_{1,j}$ 表示第1代第 $j$ 个个体的后代数, 则 $\{\xi_{1,j} : j = 1, 2, \dots\}$ 独立同分布, 与 $\xi$ 同分布, 且与 $Z_1$ 独立.

# 模型介绍

1. 设 $\xi$ 是取值非负整数的随机变量,  
 $P(\xi = k) = p_k, k = 0, 1, \dots$ , 这里 $p_0 < 1$ .
2. 一个祖先 $Z_0 = 1$ .
3. 第一代个体数 $Z_1$ 与 $\xi$ 同分布.
4.  $Z_1$ 个个体独立繁衍, 方式与祖先一致. 用 $\xi_{1,j}$ 表示第1代第 $j$ 个个体的后代数, 则 $\{\xi_{1,j} : j = 1, 2, \dots\}$ 独立同分布, 与 $\xi$ 同分布, 且与 $Z_1$ 独立. 第二代个体数为:

$$Z_2 = \sum_{j=1}^{Z_1} \xi_{1,j}.$$

5. 令  $Z_n$  为第  $n$  代个体总数. 用  $\xi_{n,j}$  表示第  $n$  代第  $j$  个个体的后代数, 则  $\{\xi_{n,j} : j = 1, 2, \dots\}$  独立同分布, 与  $\xi$  同分布, 且与  $(Z_1, \dots, Z_n)$  独立.

5. 令  $Z_n$  为第  $n$  代个体总数. 用  $\xi_{n,j}$  表示第  $n$  代第  $j$  个个体的后代数, 则  $\{\xi_{n,j} : j = 1, 2, \dots\}$  独立同分布, 与  $\xi$  同分布, 且与  $(Z_1, \dots, Z_n)$  独立. 第  $n+1$  代个体数为:

$$Z_{n+1} = \sum_{j=1}^{Z_n} \xi_{n,j}.$$

...



5. 令  $Z_n$  为第  $n$  代个体总数. 用  $\xi_{n,j}$  表示第  $n$  代第  $j$  个个体的后代数, 则  $\{\xi_{n,j} : j = 1, 2, \dots\}$  独立同分布, 与  $\xi$  同分布, 且与  $(Z_1, \dots, Z_n)$  独立. 第  $n+1$  代个体数为:

$$Z_{n+1} = \sum_{j=1}^{Z_n} \xi_{n,j}.$$

...

### Example

设  $P(\xi = 1) = p$ ,  $P(\xi = 0) = 1 - p$ ,  $0 < p < 1$ .  
则  $P(Z_n = 1) = p^n$ ,  $P(Z_n = 0) = 1 - p^n$ .

## Theorem

$\{Z_n; n \geq 0\}$  是时齐 *Markov* 链, 状态空间为  $\{0, 1, \dots\}$ ,

$$p_{ij} = P\left(\sum_{l=1}^i \xi_l = j\right), \quad i, j \geq 0,$$

其中  $\xi_1, \xi_2, \dots$  独立同分布且与  $\xi$  分布相同.

## Theorem

$\{Z_n; n \geq 0\}$  是时齐 *Markov* 链, 状态空间为  $\{0, 1, \dots\}$ ,

$$p_{ij} = P\left(\sum_{l=1}^i \xi_l = j\right), \quad i, j \geq 0,$$

其中  $\xi_1, \xi_2, \dots$  独立同分布且与  $\xi$  分布相同.

证明:

$$P(Z_{n+1} = j | Z_0 = 1, Z_1 = i_1, \dots, Z_{n-1} = i_{n-1}, Z_n = i)$$

## Theorem

$\{Z_n; n \geq 0\}$  是时齐 *Markov* 链, 状态空间为  $\{0, 1, \dots\}$ ,

$$p_{ij} = P\left(\sum_{l=1}^i \xi_l = j\right), \quad i, j \geq 0,$$

其中  $\xi_1, \xi_2, \dots$  独立同分布且与  $\xi$  分布相同.

证明:

$$\begin{aligned} & P(Z_{n+1} = j | Z_0 = 1, Z_1 = i_1, \dots, Z_{n-1} = i_{n-1}, Z_n = i) \\ &= P\left(\sum_{l=1}^i \xi_{n,l} = j | Z_0 = 1, Z_1 = i_1, \dots, Z_{n-1} = i_{n-1}, Z_n = i\right) \end{aligned}$$

## Theorem

$\{Z_n; n \geq 0\}$  是时齐 *Markov* 链, 状态空间为  $\{0, 1, \dots\}$ ,

$$p_{ij} = P\left(\sum_{l=1}^i \xi_l = j\right), \quad i, j \geq 0,$$

其中  $\xi_1, \xi_2, \dots$  独立同分布且与  $\xi$  分布相同.

证明:

$$\begin{aligned} & P(Z_{n+1} = j | Z_0 = 1, Z_1 = i_1, \dots, Z_{n-1} = i_{n-1}, Z_n = i) \\ &= P\left(\sum_{l=1}^i \xi_{n,l} = j | Z_0 = 1, Z_1 = i_1, \dots, Z_{n-1} = i_{n-1}, Z_n = i\right) \\ &= P\left(\sum_{l=1}^i \xi_{n,l} = j\right) \cdot (\because (\xi_{n,1}, \dots, \xi_{n,i}) \text{ 与 } (Z_0, \dots, Z_n) \text{ 独立.}) \end{aligned}$$

## Theorem

设  $E\xi = \mu$ ,  $\text{Var}(\xi) = \sigma^2$ . 那么对  $n \geq 1$ ,

(1)  $E(Z_n) = \mu^n$ ;

(2)  $\text{Var}(Z_n) = \sigma^2 \mu^{n-1} (1 + \mu + \cdots + \mu^{n-1})$ .

## Theorem

设  $E\xi = \mu$ ,  $\text{Var}(\xi) = \sigma^2$ . 那么对  $n \geq 1$ ,

(1)  $E(Z_n) = \mu^n$ ;

(2)  $\text{Var}(Z_n) = \sigma^2 \mu^{n-1} (1 + \mu + \cdots + \mu^{n-1})$ .

证明: (1)  $E(Z_1) = E\xi = \mu$ .

## Theorem

设  $E\xi = \mu$ ,  $\text{Var}(\xi) = \sigma^2$ . 那么对  $n \geq 1$ ,

(1)  $E(Z_n) = \mu^n$ ;

(2)  $\text{Var}(Z_n) = \sigma^2 \mu^{n-1} (1 + \mu + \cdots + \mu^{n-1})$ .

证明: (1)  $E(Z_1) = E\xi = \mu$ . 若已证得  $EZ_n = \mu^n$ , 则

$$EZ_{n+1} = E\left(\sum_{k=1}^{Z_n} \xi_{n,j}\right)$$



## Theorem

设  $E\xi = \mu$ ,  $\text{Var}(\xi) = \sigma^2$ . 那么对  $n \geq 1$ ,

(1)  $E(Z_n) = \mu^n$ ;

(2)  $\text{Var}(Z_n) = \sigma^2 \mu^{n-1} (1 + \mu + \cdots + \mu^{n-1})$ .

证明: (1)  $E(Z_1) = E\xi = \mu$ . 若已证得  $EZ_n = \mu^n$ , 则

$$\begin{aligned} EZ_{n+1} &= E\left(\sum_{k=1}^{Z_n} \xi_{n,j}\right) \\ &= E\left[E\left(\sum_{k=1}^{Z_n} \xi_{n,j} \mid Z_n\right)\right] \end{aligned}$$

## Theorem

设  $E\xi = \mu$ ,  $\text{Var}(\xi) = \sigma^2$ . 那么对  $n \geq 1$ ,

(1)  $E(Z_n) = \mu^n$ ;

(2)  $\text{Var}(Z_n) = \sigma^2 \mu^{n-1} (1 + \mu + \cdots + \mu^{n-1})$ .

证明: (1)  $E(Z_1) = E\xi = \mu$ . 若已证得  $EZ_n = \mu^n$ , 则

$$\begin{aligned} EZ_{n+1} &= E\left(\sum_{k=1}^{Z_n} \xi_{n,j}\right) \\ &= E\left[E\left(\sum_{k=1}^{Z_n} \xi_{n,j} \mid Z_n\right)\right] \\ &= E(Z_n \mu) = \mu E(Z_n) = \mu^{n+1}. \end{aligned}$$

## Theorem

设  $E\xi = \mu$ ,  $\text{Var}(\xi) = \sigma^2$ . 那么对  $n \geq 1$ ,

(1)  $E(Z_n) = \mu^n$ ;

(2)  $\text{Var}(Z_n) = \sigma^2 \mu^{n-1} (1 + \mu + \cdots + \mu^{n-1})$ .

证明: (1)  $E(Z_1) = E\xi = \mu$ . 若已证得  $EZ_n = \mu^n$ , 则

$$\begin{aligned} EZ_{n+1} &= E\left(\sum_{k=1}^{Z_n} \xi_{n,j}\right) \\ &= E\left[E\left(\sum_{k=1}^{Z_n} \xi_{n,j} \mid Z_n\right)\right] \\ &= E(Z_n \mu) = \mu E(Z_n) = \mu^{n+1}. \end{aligned}$$

由归纳法, (1)对所有  $n \geq 1$  成立.

证明: (2)  $\text{Var}(Z_1) = \text{Var}(\xi) = \sigma^2$ .

证明: (2)  $\text{Var}(Z_1) = \text{Var}(\xi) = \sigma^2$ . 若已证得(2)对 $n$ 成立, 则

$$E(Z_{n+1}^2) = E[E([\sum_{k=1}^{Z_n} \xi_{n,j}]^2 | Z_n)]$$

证明: (2)  $\text{Var}(Z_1) = \text{Var}(\xi) = \sigma^2$ . 若已证得(2)对 $n$ 成立, 则

$$\begin{aligned} E(Z_{n+1}^2) &= E[E([\sum_{k=1}^{Z_n} \xi_{n,j}]^2 | Z_n)] \\ &= E(Z_n \sigma^2 + Z_n^2 \mu^2) = \sigma^2 E(Z_n) + \mu^2 E(Z_n^2) \end{aligned}$$

证明: (2)  $\text{Var}(Z_1) = \text{Var}(\xi) = \sigma^2$ . 若已证得(2)对 $n$ 成立, 则

$$\begin{aligned} E(Z_{n+1}^2) &= E\left[E\left(\left[\sum_{k=1}^{Z_n} \xi_{n,j}\right]^2 \middle| Z_n\right)\right] \\ &= E(Z_n \sigma^2 + Z_n^2 \mu^2) = \sigma^2 E(Z_n) + \mu^2 E(Z_n^2) \end{aligned}$$

$$\text{Var}(Z_{n+1}) = E(Z_{n+1}^2) - [E(Z_{n+1})]^2$$

证明: (2)  $\text{Var}(Z_1) = \text{Var}(\xi) = \sigma^2$ . 若已证得(2)对 $n$ 成立, 则

$$\begin{aligned} E(Z_{n+1}^2) &= E\left[E\left(\left[\sum_{k=1}^{Z_n} \xi_{n,j}\right]^2 \middle| Z_n\right)\right] \\ &= E(Z_n \sigma^2 + Z_n^2 \mu^2) = \sigma^2 E(Z_n) + \mu^2 E(Z_n^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(Z_{n+1}) &= E(Z_{n+1}^2) - [E(Z_{n+1})]^2 \\ &= \sigma^2 E(Z_n) + \mu^2 E(Z_n^2) - \mu^2 (EZ_n)^2 \end{aligned}$$



证明: (2)  $\text{Var}(Z_1) = \text{Var}(\xi) = \sigma^2$ . 若已证得(2)对 $n$ 成立, 则

$$\begin{aligned} E(Z_{n+1}^2) &= E\left[E\left(\left[\sum_{k=1}^{Z_n} \xi_{n,j}\right]^2 \middle| Z_n\right)\right] \\ &= E(Z_n \sigma^2 + Z_n^2 \mu^2) = \sigma^2 E(Z_n) + \mu^2 E(Z_n^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(Z_{n+1}) &= E(Z_{n+1}^2) - [E(Z_{n+1})]^2 \\ &= \sigma^2 E(Z_n) + \mu^2 E(Z_n^2) - \mu^2 (EZ_n)^2 \\ &= \sigma^2 E(Z_n) + \mu^2 \text{Var}(Z_n) \end{aligned}$$

证明: (2)  $\text{Var}(Z_1) = \text{Var}(\xi) = \sigma^2$ . 若已证得(2)对 $n$ 成立, 则

$$\begin{aligned} E(Z_{n+1}^2) &= E\left[E\left(\left[\sum_{k=1}^{Z_n} \xi_{n,j}\right]^2 \middle| Z_n\right)\right] \\ &= E(Z_n \sigma^2 + Z_n^2 \mu^2) = \sigma^2 E(Z_n) + \mu^2 E(Z_n^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(Z_{n+1}) &= E(Z_{n+1}^2) - [E(Z_{n+1})]^2 \\ &= \sigma^2 E(Z_n) + \mu^2 E(Z_n^2) - \mu^2 (E Z_n)^2 \\ &= \sigma^2 E(Z_n) + \mu^2 \text{Var}(Z_n) \\ &= \sigma^2 \mu^n + \mu^2 \sigma^2 \mu^{n-1} (1 + \mu + \cdots + \mu^{n-1}) \end{aligned}$$

证明: (2)  $\text{Var}(Z_1) = \text{Var}(\xi) = \sigma^2$ . 若已证得(2)对 $n$ 成立, 则

$$\begin{aligned} E(Z_{n+1}^2) &= E\left[E\left(\left[\sum_{k=1}^{Z_n} \xi_{n,j}\right]^2 \middle| Z_n\right)\right] \\ &= E(Z_n \sigma^2 + Z_n^2 \mu^2) = \sigma^2 E(Z_n) + \mu^2 E(Z_n^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(Z_{n+1}) &= E(Z_{n+1}^2) - [E(Z_{n+1})]^2 \\ &= \sigma^2 E(Z_n) + \mu^2 E(Z_n^2) - \mu^2 (EZ_n)^2 \\ &= \sigma^2 E(Z_n) + \mu^2 \text{Var}(Z_n) \\ &= \sigma^2 \mu^n + \mu^2 \sigma^2 \mu^{n-1} (1 + \mu + \cdots + \mu^{n-1}) \\ &= \sigma^2 \mu^n (1 + \mu + \cdots + \mu^n). \end{aligned}$$

由归纳法, (2)对所有 $n \geq 1$ 成立.

注:

(1) 当 $\mu > 1$ 时, 平均人数几何级数增长;

注:

- (1) 当 $\mu > 1$ 时, 平均人数几何级数增长;
- (2) 当 $\mu = 1$ 时, 平均人数恒为1;

注:

- (1) 当 $\mu > 1$ 时, 平均人数几何级数增长;
- (2) 当 $\mu = 1$ 时, 平均人数恒为1;
- (3) 当 $\mu < 1$ 时, 平均人数几何级数递减.

注:

- (1) 当 $\mu > 1$ 时, 平均人数几何级数增长;
- (2) 当 $\mu = 1$ 时, 平均人数恒为1;
- (3) 当 $\mu < 1$ 时, 平均人数几何级数递减.

注:  $Z_n$ 的分布律一般很难算.

## Example

设  $p_0 = 0.2, p_1 = 0.3, p_2 = 0.2, p_3 = 0.2, p_4 = 0.1$ .  
求  $P(Z_2 = 0)$  和  $P(Z_2 = 1)$ .



## Example

设  $p_0 = 0.2$ ,  $p_1 = 0.3$ ,  $p_2 = 0.2$ ,  $p_3 = 0.2$ ,  $p_4 = 0.1$ .  
求  $P(Z_2 = 0)$  和  $P(Z_2 = 1)$ .

解:

$$P(Z_2 = 0) = \sum_{k=0}^4 P(Z_2 = 0 | Z_1 = k) P(Z_1 = k)$$

## Example

设  $p_0 = 0.2$ ,  $p_1 = 0.3$ ,  $p_2 = 0.2$ ,  $p_3 = 0.2$ ,  $p_4 = 0.1$ .  
求  $P(Z_2 = 0)$  和  $P(Z_2 = 1)$ .

解:

$$P(Z_2 = 0) = \sum_{k=0}^4 P(Z_2 = 0 | Z_1 = k) P(Z_1 = k) = \sum_{k=0}^4 p_0^k p_k$$

### Example

设  $p_0 = 0.2, p_1 = 0.3, p_2 = 0.2, p_3 = 0.2, p_4 = 0.1$ .  
求  $P(Z_2 = 0)$  和  $P(Z_2 = 1)$ .

解:

$$\begin{aligned} P(Z_2 = 0) &= \sum_{k=0}^4 P(Z_2 = 0 | Z_1 = k) P(Z_1 = k) = \sum_{k=0}^4 p_0^k p_k \\ &= 0.2 + 0.2 \times 0.3 + 0.2^2 \times 0.2 \\ &\quad + 0.2^3 \times 0.2 + 0.2^4 \times 0.1 \\ &= 0.26976. \end{aligned}$$

$$P(Z_2 = 1) = \sum_{k=0}^4 P(Z_2 = 1 | Z_1 = k) P(Z_1 = k)$$

$$\begin{aligned}P(Z_2 = 1) &= \sum_{k=0}^4 P(Z_2 = 1|Z_1 = k)P(Z_1 = k) \\&= \sum_{k=1}^4 kp_1p_0^{k-1}p_k\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P(Z_2 = 1) &= \sum_{k=0}^4 P(Z_2 = 1 | Z_1 = k) P(Z_1 = k) \\
&= \sum_{k=1}^4 k p_1 p_0^{k-1} p_k \\
&= p_1^2 + 2p_0 p_1 p_2 + 3p_0^2 p_1 p_3 + 4p_0^3 p_1 p_4 \\
&= 0.12216.
\end{aligned}$$

设 $\xi$ 的生成函数为:

$$\phi(s) := E(s^\xi) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k s^k, 0 \leq s \leq 1.$$

# 生成函数

设 $\xi$ 的生成函数为:

$$\phi(s) := E(s^\xi) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k s^k, 0 \leq s \leq 1.$$

生成函数性质:



# 生成函数

设 $\xi$ 的生成函数为:

$$\phi(s) := E(s^\xi) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k s^k, 0 \leq s \leq 1.$$

**生成函数性质:**(i)  $0 \leq \phi(s) \leq 1$ ,  $\phi(0) = p_0$ ,  $\phi(1) = 1$ ,

# 生成函数

设 $\xi$ 的生成函数为:

$$\phi(s) := E(s^\xi) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k s^k, 0 \leq s \leq 1.$$

**生成函数性质:**(i)  $0 \leq \phi(s) \leq 1$ ,  $\phi(0) = p_0$ ,  $\phi(1) = 1$ ,  $\phi(s)$ 在 $[0, 1]$  单调递增且一致连续.

设 $\xi$ 的生成函数为:

$$\phi(s) := E(s^\xi) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k s^k, 0 \leq s \leq 1.$$

**生成函数性质:**(i)  $0 \leq \phi(s) \leq 1$ ,  $\phi(0) = p_0$ ,  $\phi(1) = 1$ ,  
 $\phi(s)$ 在 $[0, 1]$  单调递增且一致连续.

(ii) 对正整数 $k$ , 若 $E(\xi^k) < \infty$ , 则

$$E[\xi(\xi-1)\cdots(\xi-k+1)] = \phi^{(k)}(1).$$

设 $\xi$ 的生成函数为:

$$\phi(s) := E(s^\xi) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k s^k, 0 \leq s \leq 1.$$

**生成函数性质:**(i)  $0 \leq \phi(s) \leq 1$ ,  $\phi(0) = p_0$ ,  $\phi(1) = 1$ ,  
 $\phi(s)$ 在 $[0, 1]$  单调递增且一致连续.

(ii) 对正整数 $k$ , 若 $E(\xi^k) < \infty$ , 则

$$E[\xi(\xi-1)\cdots(\xi-k+1)] = \phi^{(k)}(1).$$

特别地若 $E\xi < \infty$ , 则 $E\xi = \phi'(1)$ ;

设 $\xi$ 的生成函数为:

$$\phi(s) := E(s^\xi) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k s^k, 0 \leq s \leq 1.$$

**生成函数性质:**(i)  $0 \leq \phi(s) \leq 1$ ,  $\phi(0) = p_0$ ,  $\phi(1) = 1$ ,  
 $\phi(s)$ 在 $[0, 1]$  单调递增且一致连续.

(ii) 对正整数 $k$ , 若 $E(\xi^k) < \infty$ , 则

$$E[\xi(\xi-1)\cdots(\xi-k+1)] = \phi^{(k)}(1).$$

特别地若 $E\xi < \infty$ , 则 $E\xi = \phi'(1)$ ;

(iii) 非负整数随机变量的分布律与生成函数一一对应:

# 生成函数

设 $\xi$ 的生成函数为:

$$\phi(s) := E(s^\xi) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k s^k, 0 \leq s \leq 1.$$

**生成函数性质:** (i)  $0 \leq \phi(s) \leq 1$ ,  $\phi(0) = p_0$ ,  $\phi(1) = 1$ ,  $\phi(s)$ 在 $[0, 1]$  单调递增且一致连续.

(ii) 对正整数 $k$ , 若 $E(\xi^k) < \infty$ , 则

$$E[\xi(\xi-1)\cdots(\xi-k+1)] = \phi^{(k)}(1).$$

特别地若 $E\xi < \infty$ , 则 $E\xi = \phi'(1)$ ;

(iii) 非负整数随机变量的分布律与生成函数一一对应:

$$p_k = \frac{\phi^{(k)}(0)}{k!}.$$

## Example

设  $\xi \sim Poi(\lambda)$ , 则

## Example

设  $\xi \sim Poi(\lambda)$ , 则

$$\phi(s) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} s^k = e^{\lambda(s-1)},$$



## Example

设  $\xi \sim Poi(\lambda)$ , 则

$$\phi(s) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} s^k = e^{\lambda(s-1)},$$

$$E(\xi) = \phi'(1) = \lambda.$$

## Example

设  $\xi \sim Poi(\lambda)$ , 则

$$\phi(s) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} s^k = e^{\lambda(s-1)},$$

$$E(\xi) = \phi'(1) = \lambda.$$

## Example

设  $P(\xi = k) = (1-p)^{k-1}p$ ,  $k \geq 1$ , 则

## Example

设  $\xi \sim Poi(\lambda)$ , 则

$$\phi(s) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} s^k = e^{\lambda(s-1)},$$

$$E(\xi) = \phi'(1) = \lambda.$$

## Example

设  $P(\xi = k) = (1-p)^{k-1}p$ ,  $k \geq 1$ , 则

$$\phi(s) = \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{k-1} p s^k = \frac{ps}{1 - (1-p)s},$$

## Example

设  $\xi \sim Poi(\lambda)$ , 则

$$\phi(s) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} s^k = e^{\lambda(s-1)},$$

$$E(\xi) = \phi'(1) = \lambda.$$

## Example

设  $P(\xi = k) = (1-p)^{k-1}p$ ,  $k \geq 1$ , 则

$$\phi(s) = \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{k-1} p s^k = \frac{ps}{1 - (1-p)s},$$

$$E(\xi) = \phi'(1) = 1/p.$$

令  $Z_n$  的生成函数为  $\phi_n(s) = E(s^{Z_n})$ .

## Theorem

$$\phi_0(s) = s,$$

$$\phi_1(s) = \phi(s),$$

对  $n \geq 1$ ,

$$\phi_{n+1}(s) = \phi_n(\phi(s)) = \phi(\phi_n(s)).$$

证明:

$$\phi_0(s) = E(s^{Z_0}) = E(s^1) = s,$$

证明:

$$\phi_0(s) = E(s^{Z_0}) = E(s^1) = s,$$

$$\phi_1(s) = E(s^{Z_1}) = E(s^\xi) = \phi(s),$$

证明:

$$\phi_0(s) = E(s^{Z_0}) = E(s^1) = s,$$

$$\phi_1(s) = E(s^{Z_1}) = E(s^\xi) = \phi(s),$$

对  $n \geq 1$ ,

$$\phi_{n+1}(s) = E(s^{Z_{n+1}}) = E[E(s^{\sum_{j=1}^{Z_n} \xi_{n,j}} | Z_n)]$$



证明:

$$\phi_0(s) = E(s^{Z_0}) = E(s^1) = s,$$

$$\phi_1(s) = E(s^{Z_1}) = E(s^\xi) = \phi(s),$$

对  $n \geq 1$ ,

$$\begin{aligned}\phi_{n+1}(s) &= E(s^{Z_{n+1}}) = E[E(s^{\sum_{j=1}^{Z_n} \xi_{n,j}} | Z_n)] \\ &= E[(\phi(s))^{Z_n}] = \phi_n(\phi(s))\end{aligned}$$

证明:

$$\phi_0(s) = E(s^{Z_0}) = E(s^1) = s,$$

$$\phi_1(s) = E(s^{Z_1}) = E(s^\xi) = \phi(s),$$

对  $n \geq 1$ ,

$$\begin{aligned}\phi_{n+1}(s) &= E(s^{Z_{n+1}}) = E[E(s^{\sum_{j=1}^{Z_n} \xi_{n,j}} | Z_n)] \\ &= E[(\phi(s))^{Z_n}] = \phi_n(\phi(s)) \\ &= \underbrace{\phi(\phi \cdots \phi(s))}_{n+1}\end{aligned}$$

证明:

$$\phi_0(s) = E(s^{Z_0}) = E(s^1) = s,$$

$$\phi_1(s) = E(s^{Z_1}) = E(s^\xi) = \phi(s),$$

对  $n \geq 1$ ,

$$\begin{aligned}\phi_{n+1}(s) &= E(s^{Z_{n+1}}) = E[E(s^{\sum_{j=1}^{Z_n} \xi_{n,j}} | Z_n)] \\ &= E[(\phi(s))^{Z_n}] = \phi_n(\phi(s)) \\ &= \underbrace{\phi(\phi \cdots \phi(s))}_{n+1} \\ &= \phi(\underbrace{\phi(\phi \cdots \phi(s))}_n) = \phi(\phi_n(s)).\end{aligned}$$

## Example

设  $P(\xi = k) = \frac{1}{2^{k+1}}$ ,  $k = 0, 1, \dots$ , 对  $n \geq 1$ , 计算 (1)  $\phi_n(s)$ ,  
(2)  $Z_n$  的分布律.

## Example

设  $P(\xi = k) = \frac{1}{2^{k+1}}$ ,  $k = 0, 1, \dots$ , 对  $n \geq 1$ , 计算(1)  $\phi_n(s)$ ,  
(2)  $Z_n$  的分布律.

解:

$$\phi(s) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{k+1}} s^k = \frac{1}{2-s}, \quad 0 \leq s \leq 1.$$

所以  $\phi_1(s) = \phi(s) = \frac{1}{2-s}$ ,

## Example

设  $P(\xi = k) = \frac{1}{2^{k+1}}$ ,  $k = 0, 1, \dots$ , 对  $n \geq 1$ , 计算 (1)  $\phi_n(s)$ ,  
(2)  $Z_n$  的分布律.

解:

$$\phi(s) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{k+1}} s^k = \frac{1}{2-s}, \quad 0 \leq s \leq 1.$$

所以  $\phi_1(s) = \phi(s) = \frac{1}{2-s}$ ,

$$\phi_2(s) = \phi(\phi_1(s)) = \frac{1}{2 - \phi_1(s)} = \frac{1}{2 - \frac{1}{2-s}} = \frac{2-s}{3-2s}.$$

若已算得  $\phi_n(s) = \frac{n-(n-1)s}{n+1-ns}$ , 则

若已算得  $\phi_n(s) = \frac{n-(n-1)s}{n+1-ns}$ , 则

$$\phi_{n+1}(s) = \phi(\phi_n(s)) = \frac{1}{2 - \phi_n(s)}$$



若已算得 $\phi_n(s) = \frac{n-(n-1)s}{n+1-ns}$ , 则

$$\begin{aligned}\phi_{n+1}(s) &= \phi(\phi_n(s)) = \frac{1}{2 - \phi_n(s)} \\ &= \frac{1}{2 - \frac{n-(n-1)s}{n+1-ns}}\end{aligned}$$

若已算得  $\phi_n(s) = \frac{n-(n-1)s}{n+1-ns}$ , 则

$$\begin{aligned}\phi_{n+1}(s) &= \phi(\phi_n(s)) = \frac{1}{2 - \phi_n(s)} \\ &= \frac{1}{2 - \frac{n-(n-1)s}{n+1-ns}} = \frac{(n+1) - ns}{(n+2) - (n+1)s}.\end{aligned}$$

若已算得  $\phi_n(s) = \frac{n-(n-1)s}{n+1-ns}$ , 则

$$\begin{aligned}\phi_{n+1}(s) &= \phi(\phi_n(s)) = \frac{1}{2 - \phi_n(s)} \\ &= \frac{1}{2 - \frac{n-(n-1)s}{n+1-ns}} = \frac{(n+1) - ns}{(n+2) - (n+1)s}.\end{aligned}$$

由归纳法知对  $n \geq 1$ ,  $\phi_n(s) = \frac{n-(n-1)s}{n+1-ns}$ .

$$\phi_n(s) = \frac{n - (n-1)s}{n+1 - ns}$$

$$\phi_n(s) = \frac{n - (n-1)s}{n+1 - ns} = \frac{n - (n-1)s}{n+1} \frac{1}{1 - \frac{n}{n+1}s}$$

$$\begin{aligned}
\phi_n(s) &= \frac{n - (n-1)s}{n+1 - ns} = \frac{n - (n-1)s}{n+1} \frac{1}{1 - \frac{n}{n+1}s} \\
&= \frac{n - (n-1)s}{n+1} \sum_{k=0}^{\infty} \left( \frac{n}{n+1} s \right)^k
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\phi_n(s) &= \frac{n - (n-1)s}{n+1 - ns} = \frac{n - (n-1)s}{n+1} \frac{1}{1 - \frac{n}{n+1}s} \\
&= \frac{n - (n-1)s}{n+1} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}s\right)^k \\
&= \frac{n}{n+1} + \sum_{k=0}^{\infty} \left( \frac{n}{n+1} \frac{n^{k+1}s^{k+1}}{(n+1)^{k+1}} - \frac{n-1}{n+1} \frac{n^k s^{k+1}}{(n+1)^k} \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\phi_n(s) &= \frac{n - (n-1)s}{n+1 - ns} = \frac{n - (n-1)s}{n+1} \frac{1}{1 - \frac{n}{n+1}s} \\
&= \frac{n - (n-1)s}{n+1} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}s\right)^k \\
&= \frac{n}{n+1} + \sum_{k=0}^{\infty} \left( \frac{n}{n+1} \frac{n^{k+1}s^{k+1}}{(n+1)^{k+1}} - \frac{n-1}{n+1} \frac{n^k s^{k+1}}{(n+1)^k} \right) \\
&= \frac{n}{n+1} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{n^{k-1}}{(n+1)^{k+1}} s^k.
\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
\phi_n(s) &= \frac{n - (n-1)s}{n+1 - ns} = \frac{n - (n-1)s}{n+1} \frac{1}{1 - \frac{n}{n+1}s} \\
&= \frac{n - (n-1)s}{n+1} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}s\right)^k \\
&= \frac{n}{n+1} + \sum_{k=0}^{\infty} \left( \frac{n}{n+1} \frac{n^{k+1}s^{k+1}}{(n+1)^{k+1}} - \frac{n-1}{n+1} \frac{n^k s^{k+1}}{(n+1)^k} \right) \\
&= \frac{n}{n+1} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{n^{k-1}}{(n+1)^{k+1}} s^k.
\end{aligned}$$

所以  $P(Z_n = 0) = \frac{n}{n+1}$ ,

$$\begin{aligned}
\phi_n(s) &= \frac{n - (n-1)s}{n+1 - ns} = \frac{n - (n-1)s}{n+1} \frac{1}{1 - \frac{n}{n+1}s} \\
&= \frac{n - (n-1)s}{n+1} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}s\right)^k \\
&= \frac{n}{n+1} + \sum_{k=0}^{\infty} \left( \frac{n}{n+1} \frac{n^{k+1} s^{k+1}}{(n+1)^{k+1}} - \frac{n-1}{n+1} \frac{n^k s^{k+1}}{(n+1)^k} \right) \\
&= \frac{n}{n+1} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{n^{k-1}}{(n+1)^{k+1}} s^k.
\end{aligned}$$

所以  $P(Z_n = 0) = \frac{n}{n+1}$ ,

$$P(Z_n = k) = \frac{n^{k-1}}{(n+1)^{k+1}}, \quad k \geq 1.$$

设  $0 < p_0 < 1$ . 令  $\alpha_n = P(Z_n = 0)$ .

设  $0 < p_0 < 1$ . 令  $\alpha_n = P(Z_n = 0)$ .  
由于0是吸收态, 所以  $\alpha_n$  单调递增.

设  $0 < p_0 < 1$ . 令  $\alpha_n = P(Z_n = 0)$ .

由于0是吸收态, 所以 $\alpha_n$ 单调递增.

令  $\tau := \lim_{n \rightarrow \infty} P(Z_n = 0)$ , 则  $\tau = P(Z_n = 0 \text{ for some } n)$ .

设  $0 < p_0 < 1$ . 令  $\alpha_n = P(Z_n = 0)$ .

由于0是吸收态, 所以 $\alpha_n$ 单调递增.

令  $\tau := \lim_{n \rightarrow \infty} P(Z_n = 0)$ , 则  $\tau = P(Z_n = 0 \text{ for some } n)$ .

**问题:** 灭绝概率 $\tau$  为多少?

设  $0 < p_0 < 1$ . 令  $\alpha_n = P(Z_n = 0)$ .

由于0是吸收态, 所以 $\alpha_n$ 单调递增.

令  $\tau := \lim_{n \rightarrow \infty} P(Z_n = 0)$ , 则  $\tau = P(Z_n = 0 \text{ for some } n)$ .

**问题:** 灭绝概率 $\tau$  为多少?

若  $\mu < 1$ , 则由Markov不等式,

设  $0 < p_0 < 1$ . 令  $\alpha_n = P(Z_n = 0)$ .

由于0是吸收态, 所以  $\alpha_n$  单调递增.

令  $\tau := \lim_{n \rightarrow \infty} P(Z_n = 0)$ , 则  $\tau = P(Z_n = 0 \text{ for some } n)$ .

**问题:** 灭绝概率  $\tau$  为多少?

若  $\mu < 1$ , 则由Markov不等式,

$$P(Z_n \geq 1) \leq E(Z_n) = \mu^n \rightarrow 0.$$



# 灭绝概率

设  $0 < p_0 < 1$ . 令  $\alpha_n = P(Z_n = 0)$ .

由于0是吸收态, 所以 $\alpha_n$ 单调递增.

令  $\tau := \lim_{n \rightarrow \infty} P(Z_n = 0)$ , 则  $\tau = P(Z_n = 0 \text{ for some } n)$ .

**问题:** 灭绝概率 $\tau$  为多少?

若  $\mu < 1$ , 则由Markov不等式,

$$P(Z_n \geq 1) \leq E(Z_n) = \mu^n \rightarrow 0.$$

所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} P(Z_n = 0) = 1$ , 即  $\tau = 1$ .

## Theorem

(1)  $\tau$  是方程  $s = \phi(s)$  的最小正解.

## Theorem

- (1)  $\tau$  是方程  $s = \phi(s)$  的最小正解.
- (2)  $\tau = 1$  当且仅当  $\mu \leq 1$ .

证明：(1)

$$\alpha_{n+1} = \phi_{n+1}(0) = \phi(\phi_n(0)) = \phi(\alpha_n).$$

令  $n \rightarrow \infty$ , 由  $\phi(s)$  在  $[0, 1]$  连续推得  $\tau = \phi(\tau)$ .

证明：(1)

$$\alpha_{n+1} = \phi_{n+1}(0) = \phi(\phi_n(0)) = \phi(\alpha_n).$$

令  $n \rightarrow \infty$ , 由  $\phi(s)$  在  $[0, 1]$  连续推得  $\tau = \phi(\tau)$ .

令  $s_0$  是方程  $s = \phi(s)$  的最小非负解, 则  $\tau \geq s_0$ .

证明: (1)

$$\alpha_{n+1} = \phi_{n+1}(0) = \phi(\phi_n(0)) = \phi(\alpha_n).$$

令  $n \rightarrow \infty$ , 由  $\phi(s)$  在  $[0, 1]$  连续推得  $\tau = \phi(\tau)$ .

令  $s_0$  是方程  $s = \phi(s)$  的最小非负解, 则  $\tau \geq s_0$ .

由于  $\phi(0) = p_0 > 0$  和  $\phi(1) = 1$ , 所以  $0 < s_0 \leq 1$ ,  $s_0$  是最小正解, 1 是方程的解. 因为  $s_0 \geq 0$ , 所以  $s_0 = \phi(s_0) \geq \phi(0) = \alpha_1$ .

证明: (1)

$$\alpha_{n+1} = \phi_{n+1}(0) = \phi(\phi_n(0)) = \phi(\alpha_n).$$

令  $n \rightarrow \infty$ , 由  $\phi(s)$  在  $[0, 1]$  连续推得  $\tau = \phi(\tau)$ .

令  $s_0$  是方程  $s = \phi(s)$  的最小非负解, 则  $\tau \geq s_0$ .

由于  $\phi(0) = p_0 > 0$  和  $\phi(1) = 1$ , 所以  $0 < s_0 \leq 1$ ,  $s_0$  是最小正解, 1 是方程的解. 因为  $s_0 \geq 0$ , 所以

$s_0 = \phi(s_0) \geq \phi(0) = \alpha_1$ . 若已证得  $s_0 \geq \alpha_n$ ,

则  $s_0 = \phi(s_0) \geq \phi(\alpha_n) = \alpha_{n+1}$ . 因此  $s_0 \geq \alpha_n$  对所有  $n$  成立. 所以  $s_0 \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \tau$ .

证明: (1)

$$\alpha_{n+1} = \phi_{n+1}(0) = \phi(\phi_n(0)) = \phi(\alpha_n).$$

令  $n \rightarrow \infty$ , 由  $\phi(s)$  在  $[0, 1]$  连续推得  $\tau = \phi(\tau)$ .

令  $s_0$  是方程  $s = \phi(s)$  的最小非负解, 则  $\tau \geq s_0$ .

由于  $\phi(0) = p_0 > 0$  和  $\phi(1) = 1$ , 所以  $0 < s_0 \leq 1$ ,  $s_0$  是最小正解, 1 是方程的解. 因为  $s_0 \geq 0$ , 所以

$s_0 = \phi(s_0) \geq \phi(0) = \alpha_1$ . 若已证得  $s_0 \geq \alpha_n$ ,

则  $s_0 = \phi(s_0) \geq \phi(\alpha_n) = \alpha_{n+1}$ . 因此  $s_0 \geq \alpha_n$  对所有  $n$  成立. 所以  $s_0 \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \tau$ .

这就证明了  $\tau = s_0$ .



(2) 若  $p_0 + p_1 = 1$ , 则  $\mu = p_1 < 1$ , 所以  $\tau = 1$ .

(2) 若  $p_0 + p_1 = 1$ , 则  $\mu = p_1 < 1$ , 所以  $\tau = 1$ .  
下设  $p_0 + p_1 < 1$ . 令  $h(s) = \phi(s) - s$ ,  $0 \leq s \leq 1$ .

(2) 若  $p_0 + p_1 = 1$ , 则  $\mu = p_1 < 1$ , 所以  $\tau = 1$ .  
下设  $p_0 + p_1 < 1$ . 令  $h(s) = \phi(s) - s, 0 \leq s \leq 1$ .  
则  $h'(s) = \sum_{k=1}^{\infty} k p_k s^{k-1} - 1$  在  $[0, 1]$  严格递增,  
 $h(0) = p_0 > 0, h(1) = 0$ .

(2) 若  $p_0 + p_1 = 1$ , 则  $\mu = p_1 < 1$ , 所以  $\tau = 1$ .

下设  $p_0 + p_1 < 1$ . 令  $h(s) = \phi(s) - s, 0 \leq s \leq 1$ .

则  $h'(s) = \sum_{k=1}^{\infty} k p_k s^{k-1} - 1$  在  $[0, 1]$  严格递增,

$h(0) = p_0 > 0, h(1) = 0$ .

若  $\mu \leq 1$ , 则对  $0 \leq s < 1, h'(s) < h'(1) = \mu - 1 \leq 0$ ,

(2) 若  $p_0 + p_1 = 1$ , 则  $\mu = p_1 < 1$ , 所以  $\tau = 1$ .

下设  $p_0 + p_1 < 1$ . 令  $h(s) = \phi(s) - s, 0 \leq s \leq 1$ .

则  $h'(s) = \sum_{k=1}^{\infty} k p_k s^{k-1} - 1$  在  $[0, 1]$  严格递增,

$h(0) = p_0 > 0, h(1) = 0$ .

若  $\mu \leq 1$ , 则对  $0 \leq s < 1, h'(s) < h'(1) = \mu - 1 \leq 0$ ,

所以  $h$  在  $[0, 1]$  严格递减, 方程  $h(s) = 0$  在  $[0, 1]$  上有唯一解  $s = 1$ , 即 1 是方程  $s = \phi(s)$  的最小正解, 所以  $\tau = 1$ .

(2) 若  $p_0 + p_1 = 1$ , 则  $\mu = p_1 < 1$ , 所以  $\tau = 1$ .

下设  $p_0 + p_1 < 1$ . 令  $h(s) = \phi(s) - s$ ,  $0 \leq s \leq 1$ .

则  $h'(s) = \sum_{k=1}^{\infty} k p_k s^{k-1} - 1$  在  $[0, 1]$  严格递增,

$h(0) = p_0 > 0$ ,  $h(1) = 0$ .

若  $\mu \leq 1$ , 则对  $0 \leq s < 1$ ,  $h'(s) < h'(1) = \mu - 1 \leq 0$ ,

所以  $h$  在  $[0, 1]$  严格递减, 方程  $h(s) = 0$  在  $[0, 1]$  上有唯一解  $s = 1$ , 即 1 是方程  $s = \phi(s)$  的最小正解, 所以  $\tau = 1$ .

若  $\mu > 1$ , 则  $h'(0) = p_1 - 1 < 0$  而  $h'(1) = \mu - 1 > 0$ . 所以  $h$  在  $[0, 1]$  先严格递减后严格递增,

(2) 若  $p_0 + p_1 = 1$ , 则  $\mu = p_1 < 1$ , 所以  $\tau = 1$ .

下设  $p_0 + p_1 < 1$ . 令  $h(s) = \phi(s) - s$ ,  $0 \leq s \leq 1$ .

则  $h'(s) = \sum_{k=1}^{\infty} k p_k s^{k-1} - 1$  在  $[0, 1]$  严格递增,

$h(0) = p_0 > 0$ ,  $h(1) = 0$ .

若  $\mu \leq 1$ , 则对  $0 \leq s < 1$ ,  $h'(s) < h'(1) = \mu - 1 \leq 0$ ,

所以  $h$  在  $[0, 1]$  严格递减, 方程  $h(s) = 0$  在  $[0, 1]$  上有唯一解  $s = 1$ , 即 1 是方程  $s = \phi(s)$  的最小正解, 所以  $\tau = 1$ .

若  $\mu > 1$ , 则  $h'(0) = p_1 - 1 < 0$  而  $h'(1) = \mu - 1 > 0$ . 所以  $h$  在  $[0, 1]$  先严格递减后严格递增, 因此  $h$  在  $[0, 1]$  存在两个零点. 即  $\tau < 1$ .

## Example

设  $P(\xi = k) = \frac{1}{2^{k+1}}, k = 0, 1, \dots$ .



## Example

设  $P(\xi = k) = \frac{1}{2^{k+1}}, k = 0, 1, \dots$ .

则  $\phi(s) = \frac{1}{2-s}, \mu = \phi'(1) = 1$ , 因此  $\tau = 1$ .

## Example

设  $P(\xi = k) = \frac{1}{2^{k+1}}, k = 0, 1, \dots$ .

则  $\phi(s) = \frac{1}{2-s}, \mu = \phi'(1) = 1$ , 因此  $\tau = 1$ .

已算得  $\alpha_n = P(Z_n = 0) = \frac{n}{n+1}$ .

## Example

设  $P(\xi = k) = \frac{1}{2^{k+1}}, k = 0, 1, \dots$ .

则  $\phi(s) = \frac{1}{2-s}, \mu = \phi'(1) = 1$ , 因此  $\tau = 1$ .

已算得  $\alpha_n = P(Z_n = 0) = \frac{n}{n+1}$ .

令  $T_0 = \min\{n \geq 1 : Z_n = 0\}$ , 首次灭绝的时刻.

## Example

设  $P(\xi = k) = \frac{1}{2^{k+1}}, k = 0, 1, \dots$ .

则  $\phi(s) = \frac{1}{2-s}, \mu = \phi'(1) = 1$ , 因此  $\tau = 1$ .

已算得  $\alpha_n = P(Z_n = 0) = \frac{n}{n+1}$ .

令  $T_0 = \min\{n \geq 1 : Z_n = 0\}$ , 首次灭绝的时刻.

则对  $n \geq 1$ ,

$$P(T_0 = n) = P(Z_n = 0, Z_{n-1} \neq 0)$$

## Example

设  $P(\xi = k) = \frac{1}{2^{k+1}}, k = 0, 1, \dots$ .

则  $\phi(s) = \frac{1}{2-s}, \mu = \phi'(1) = 1$ , 因此  $\tau = 1$ .

已算得  $\alpha_n = P(Z_n = 0) = \frac{n}{n+1}$ .

令  $T_0 = \min\{n \geq 1 : Z_n = 0\}$ , 首次灭绝的时刻.

则对  $n \geq 1$ ,

$$\begin{aligned} P(T_0 = n) &= P(Z_n = 0, Z_{n-1} \neq 0) \\ &= P(Z_n = 0) - P(Z_{n-1} = 0) = \frac{1}{n(n+1)}. \end{aligned}$$

## Example

设  $P(\xi = k) = (1 - p)^k p, k = 0, 1, \dots$ .

## Example

设  $P(\xi = k) = (1 - p)^k p, k = 0, 1, \dots$ .  
则  $\phi(s) = \frac{p}{1 - (1 - p)s}, \mu = \phi'(1) = \frac{1 - p}{p}$ .

## Example

设  $P(\xi = k) = (1 - p)^k p, k = 0, 1, \dots$ .

则  $\phi(s) = \frac{p}{1 - (1 - p)s}, \mu = \phi'(1) = \frac{1 - p}{p}$ .

$$\begin{aligned}\phi(s) = s &\Leftrightarrow (1 - p)s^2 - s + p = 0 \\ &\Leftrightarrow (s - 1)((1 - p)s - p) = 0\end{aligned}$$



## Example

设  $P(\xi = k) = (1 - p)^k p, k = 0, 1, \dots$ .

则  $\phi(s) = \frac{p}{1 - (1 - p)s}, \mu = \phi'(1) = \frac{1 - p}{p}$ .

$$\begin{aligned}\phi(s) = s &\Leftrightarrow (1 - p)s^2 - s + p = 0 \\ &\Leftrightarrow (s - 1)((1 - p)s - p) = 0\end{aligned}$$

所以当  $p \geq 1/2$  时,  $\tau = 1$ .

## Example

设  $P(\xi = k) = (1 - p)^k p, k = 0, 1, \dots$ .

则  $\phi(s) = \frac{p}{1 - (1 - p)s}, \mu = \phi'(1) = \frac{1 - p}{p}$ .

$$\begin{aligned}\phi(s) = s &\Leftrightarrow (1 - p)s^2 - s + p = 0 \\ &\Leftrightarrow (s - 1)((1 - p)s - p) = 0\end{aligned}$$

所以当  $p \geq 1/2$  时,  $\tau = 1$ .

当  $p < 1/2$  时,  $\tau = p/(1 - p)$ .