

1. 设 Y_1, \dots, Y_n i.i.d. 为抽取自 $N(0, \sigma^2)$, $\sigma > 0$ 的样本,

$$T_1 =: \frac{Y_1^2}{\sum_{j=2}^n Y_j^2} \text{ 和 } T_2 =: \frac{Y_n^2}{\sum_{j=2}^n Y_j^2}$$

的分布相同吗? 求它们的分布(用熟悉的分布一例如统计学中的三大分布 χ^2 分布、 t 分布和 F 分布的分布函数一表示 T_1, T_2 的分布函数).

2. 设 X_1, \dots, X_n i.i.d. 为抽取自指数分布总体的样本, 总体的密度函数为

$$f(x; \lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & 0 < x < \infty, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ 为参数, $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(r)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ 为次序统计量.

- ① 以 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ 为样本, 证明 $T = \sum_{i=1}^n X_i$ 是 λ 的充分、完全统计量;
- ② 求条件概率 $P(X_1 \leq x | T = t)$;
- ③ 求 $\mathbf{Y} = (X_{(1)}, \dots, X_{(r)})$ 的密度函数; 以 \mathbf{Y} 为样本, 证明 $S = \sum_{i=1}^r X_{(i)} + (n-r)X_{(r)}$ 是 λ 的充分、完全统计量.