

**КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ ФОКУСИН®**

Регистрационный номер: ЛС-001633. Торговое название препарата: Фокусин®. Международное непатентованное название: Тамсулозин. Лекарственная форма: капсулы с модифицированным высвобождением. **Активное вещество:** тамсулозина гидрохлорид 0,4 мг. **Показания:** лечение функциональных расстройств при доброкачественной гиперплазии предстательной железы. **Противопоказания:** повышенная чувствительность к компонентам препарата; ортостатическая гипотензия (в т.ч. в анамнезе); выраженная печеночная недостаточность; возраст до 18 лет. **С осторожностью:** хроническая почечная недостаточность (снижение клиренса креатинина ниже 10 мл/мин); артериальная гипотензия (в т.ч. ортостатическая); запланированная операция по поводу катаракты; при совместном использовании с мощными или умеренно активными ингибиторами изофермента CYP3A4. **Побочное действие** (см. полную инструкцию по применению. Указаны часто и нечасто встречающиеся): головокружение, головная боль, сердцебиение, ортостатическая гипотензия, ринит, кожная сыпь, зуд, крапивница, астенический синдром. **Необходимо ознакомиться с полной инструкцией по медицинскому применению препарата.**

Информация предназначена для специалистов здравоохранения.
Перед назначением необходимо ознакомиться с полной версией инструкции
по медицинскому применению.

1. Регистрационное удостоверение препарата Фокусин®: ЛС-001633 http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=73a9d4ae-d580-472c-82cd-e4d5f4a958ee&t= (дата последнего обращения 30.06.2017).
2. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Фокусин® от 08.08.2017.
3. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Пенестер® от 08.08.2017.

* * * Ингибиторы 5-альфа-редуктазы
 * * * McConnell J. D. et al. N Engl J Med. 2003; 349(25): 2387–98. (Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование безопасности и эффективности терапии доброкачественной гиперплазии предстательной железы доксазолином и финастеридом. Период наблюдения – 5 лет. Группа плацебо – 737 пациентов. Группа терапии доксазолином (4 или 8 мг/сут) – 756 пациентов. Группа терапии финастеридом (5 мг/сут) – 768 пациентов. Группа комбинированной терапии (доксазозин 4–8 мг/сут + финастерид 5 мг/сут) – 786 пациентов. Для групп плацебо не определились риски указанных клинических явлений.)
 * * * Доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

Представительство АО «Санофи-авентис груп» (Франция)
125009, Москва, ул. Тверская, д. 22. Тел.: (495) 721-14-00, факс: (495) 721-14-11, www.sanofi.ru, SARU.GTAMZ.17.11.2127

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПЕНЕСТЕР®

Регистрационный номер: ЛС-000133. Торговое название препарата: Пенестер®. Международное непатентованное название: Финастерид. Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Активное вещество: финастерид 5 мг. Показания: лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) и профилактики урологических осложнений с целью: снижения риска острой задержки мочи; снижения риска необходимости проведения хирургических вмешательств, в том числе трансуретральной резекции простаты и простатэктомии. Лечение с целью уменьшения размеров увеличенной предстательной железы, улучшения мочеиспускания и уменьшения выраженности симптомов, связанных с ДГПЖ. В сочетании с доказанным для снижения риска прогрессирования симптомов, связанных с ДГПЖ. Противопоказания: повышенная чувствительность к финастериду и/или другим компонентам препарата; возраст до 18 лет; беременность и применение препарата у женщин с сохраненным репродуктивным потенциалом; наследственная непереносимость лактозы, дефицит лактазы или нарушение всасывания глюкозы/галактозы. С осторожностью: пациентам с большим объемом остаточной мочи и/или существенно сниженной скоростью мочеиспускания; пациентам с печеночной недостаточностью; лицам пожилого возраста. Побочное действие (см. полную инструкцию по применению. Указаны частота и нечасто встречающиеся): снижение либидо, кожная сыпь, нарушение сексуальной функции, нарушение эякуляции, уменьшение объема эякулята, увеличение грудных желез, болезненность в области грудных желез. Необходимо ознакомиться с полной инструкцией по медицинскому применению препарата.

УРОЛОГ ЗНАЕТ, О ЧЕМ МОЛЧАТ МУЖЧИНЫ

более 10 лет в России
ЗАБОТИМСЯ О МУЖСКОМ ЗДОРОВЬЕ¹



ВЕРНЫЙ КУРС НА МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ^{2, 3}

SANOFI


Комбинированная терапия (α-блокаторы+5-АРИ*) повышает эффективность лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы**

■ Монотерапия
α-блокаторами


■ Монотерапия
ингибиторами
5-альфа-редуктазы

■ Комбинированная терапия
α-блокаторами + ингибиторами
5-альфа-редуктазы

Снижение риска
хирургического
вмешательства



Снижение риска
прогрессии ДГПЖ***



Снижение риска
острой задержки
мочи





Фамилия, имя пациента

Возраст

Дата заполнения

Международная система суммарной оценки заболеваний предстательной железы	Никогда	Реже, чем один раз из 5 случаев	Реже, чем в половине случаев	Примерно в половине случаев	Чаше, чем в половине случаев	Почти всегда
1. Как часто в течение последнего месяца у Вас было ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря после мочеиспускания?	0	1	2	3	4	5
2. Как часто в течение последнего месяца у Вас была потребность мочиться чаще, чем через 2 часа после мочеиспускания?	0	1	2	3	4	5
3. Как часто в течение последнего месяца у Вас было прерывистое мочеиспускание (во время мочеиспускания Вам приходилось останавливаться и начинать снова)?	0	1	2	3	4	5
4. Как часто в течение последнего месяца Вам было трудно удерживать мочу?	0	1	2	3	4	5
5. Как часто в течение последнего месяца у Вас была вялая струя мочи?	0	1	2	3	4	5
6. Как часто в течение последнего месяца Вам приходилось натуживаться, чтобы начать мочеиспускание?	0	1	2	3	4	5
7. Как часто в течение последнего месяца Вам приходилось вставать ночью с постели (начиная со времени, когда Вы ложились спать, и заканчивая временем подъема утром), чтобы помочиться?	нет 0	1 раз 1	2 раза 2	3 раза 3	4 раза 4	5 раз и более 5

☐ обструктивный симптом ☐ ирритативный симптом

Суммарный балл по IPSS =

Качество жизни вследствие расстройств мочеиспускания

1. Как бы Вы отнеслись к тому, если бы Вам пришлось жить с имеющимися у Вас проблемами с мочеиспусканием до конца жизни?	Прекрасно 0	Хорошо 1	Удовлетворительно 2	Смешанное чувство 3	Неудовлетворительно 4	Плохо 5	Очень плохо 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------------	------------------------	------------------------	--------------------------	------------	------------------

Индекс оценки качества жизни L =