


Эскиз-проект устройства  
галактики и её ядра  
по Общей Теории Всего  
Ю. В. Козлова



в исполнении художника Игоря Романовича Григорьянца

Россия СПб 2023

1.

на примере  
1 усл. единицы  
вещества и  
его пути в  
галактике.

возможное  
отставание  
отработанного,  
(+)вещества (шлак)  
во вне ареала  
галактики по пути  
её следования.

Возникновение  
хвостовых  
облаков  
пыли.

Композитный путь - это итоговый, опрощённый вектор движения вещества - которое вращаясь против часовой диском галактики - постепенно отстаёт, смещаясь к краю; см. илл.на 6 стр.

Ю.В.Козлов  
Общая Теория Всего.  
Ядра галактик как  
производители  
вещества во  
Вселенной.

тут пространству  
подобные условия

Возможный  
путь ждета, в  
следствие  
жёсткой  
втяжки  
вещества  
в ядро и  
реакции  
на это  
втягиваемого  
облака  
шлака.

Втяжка  
веществ  
в Ядро.  
вращение  
по часовой с  
ускорением  
падения

глюонно→ кварковая  
«шуба» где  
порождаются  
нейтроны

Ядро  
(усл. красное)

Возможно дело обстоит так:  
Падающий материал имеет отрицательный заряд, его элементы крутятся против часовой, а магнитно – гравитационная воронка **ядра** заставляет вещество всасываться **по часовой** – тем вызывая «электро-магнитный антагонизм». Причём материал закручивается в трубкообразные кластеры, сквозь которые и пробиваются джеты.  
Результат – жёсткое излучение и двунаправленное движение веществ со взаимным трением. Можно предположить возникновение **вторичных электро-магнитных полей** поперечных основному.  
Это должно привести к накоплению заряда и жёсткого импульсивного разряда с некоторой периодичностью, которая, в свою очередь, коррелирует с выбросом возрождённого вещества в диск галактики...  
«Волшебный Горшочек» в действии!

Разряды  
провоцирующие  
выгонку джета  
из воронки.

Вне ареала. Движение вещества в + времени и + пространству подобной среде.

о е  
нницы  
и

галактический ареал

...ства в + времени и +  
...галактический ареал

Композитное направление исхода (+) вещества

MA

примерное положение  
Солнца 

 $V < C$ 

50000 СВ.ЛЕТ

**бюджет**

2.

Ю.В.Козлов  
Общая Теория Всего.  
Ядра галактик как  
производители  
вещества во  
Вселенной.

Область  
пространству  
подобных условий  
и её светоподобный  
интервал по границе  
времени и  
пространству  
подобных  
миров.

Силовые линии  
магнитного поля  
ядра

тут пространству  
подобные условия

## Магнитные поля Ядра

1<sup>й</sup> фазовый переход

## 2<sup>й</sup> фазовый

 $V < C$ 


тут времени подобные условия

вращение веществ галактики против часовой

MA

3.

Ю.В.Козлов  
Общая Теория Всего.  
Ядра галактик как  
производители  
вещества во  
Вселенной.



Условное изображение, позволяющее представить ход событий. Изображение ядра и галактики представлены не пропорционально для лучшей демонстрации.

4. Предполагается проникновение вещества через полюса Ядра с превышением ск. света, со спагеттизацией и далее **фазовым переходом** в полевое состояние на полюсной поверхности Шварцшильда; далее падение внутри на **Центр Ядра** и раскрутка по часовой стр., далее движение к нулевому радиусу Ядра, замедление до скорости света и вновь **фазовый переход** в состояние глюонно → кварковой «шубы» с порождением нейтронов и антигравитационным выбросом их от **ядра** в диск галактики.

Ю.В.Козлов  
Общая Теория Всего.  
Ядра галактик как  
производители  
вещества во  
Вселенной.

$$S_{0,0}^2 = 0;$$

$$V = c;$$

$$m_0 = 0;$$

$$\pm E_{CB} = [E_\varphi]$$

$$-E_{CB} = \frac{-i m_0 c^2}{\sqrt{\frac{c^2}{c^2} - 1}} - E_\varphi;$$

$$E_{CB} = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{c^2}{c^2}}} + E_\varphi$$

(11)

для частицы падающей в ядро  $V = c$

или возрождающейся из ядра  $V < c$


$$E_t = E_m + E_\varphi;$$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$E_t = \frac{m_0 v^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} + E_\varphi$$

(9)

для частицы в + состоянии  $V < c$



$$E_t = -E_m - E_\varphi;$$

$$-m = \frac{-i m_0}{\sqrt{\frac{v^2}{c^2} - 1}};$$


$$-E_e = \frac{-i m_0 v^2}{\sqrt{\frac{v^2}{c^2} - 1}} - E_\varphi$$

для (-) частиц у которых  $v \geq c$  (10)

Условное изображение, позволяющее представить ход событий.

5. Ю.В.Козлов  
Общая Теория Всего.  
Ядра галактик как  
производители  
вещества во  
Вселенной.

Вид сверху.




Композитный путь - это итоговый, опрощённый вектор движения вещества - которое вращаясь против часовой диском галактики - постепенно отстаёт, смещаясь к краю; см. илл.на 6 стр.

Условное изображение, позволяющее представить ход событий. Изображение ядра и галактики представлены не пропорционально для лучшей демонстрации.

6.

Вероятный  
путь вещества  
(атома)  
из времени  
подобного  
состояния в  
пространству-  
подобное,  
и далее  
падение  
в **Ядро**.

вращение  
против часовой




Поступление  
вещества и  
излучений  
(информации)  
из  
межгалактического  
пространства

компоЗИтный путь этого вещества (атома)

$v < c$

$v > c$

$V = c$  на пов. Шварцшильда



Ю.В.Козлов  
Общая Теория Всего.  
Ядра галактик как  
производители  
вещества во  
Вселенной.

Вид с права

Условное изображение, позволяющее представить ход событий. Изображение ядра и галактики представлены не пропорционально для лучшей демонстрации.

7. Ю.В.Козлов  
Общая Теория Всего.  
Ядра галактик как  
производители  
вещества во  
Вселенной.

Магнитные  
поля.

Светоподобный  
интервал по границе  
времени  
и пространству  
подобных миров.  
Гиперповерхность  
гиперболического  
типа.


Состав возможных путей вещества  
от ядра к полюсам.

втяжка  
веществ  
в Ядро

50000 св.лет

Вид сбоку


Условное изображение, позволяющее представить ход событий. Изображение ядра и галактики представлены не пропорционально для лучшей демонстрации.



8.

Ю.В.Козлов  
Общая Теория Всего.  
Ядра галактик как  
производители  
вещества во  
Вселенной.

Магнитные поля  
галактики  
распространяются  
далеко за пределы  
ареала галактики и  
её гиперболических  
областей.  
Связываются с  
магнитными полями  
прочих галактик  
и всей Вселенной.



Возможные  
тороидные  
образования  
магнитного поля  
в пространству  
подобных  
условиях.

Центр Ядра

Условное изображение, позволяющее представить ход событий. Изображение ядра и галактики представлены не пропорционально для лучшей демонстрации.

9.


Ю.В.Козлов  
Общая Теория Всего.  
Ядра галактик как  
производители  
вещества во  
Вселенной.

возможные доп. границы галактики диаметром ~ 30000 св.лет, содержание - шлак.

Вид в ракурсе  
верх перспективы.

возможное  
отставание  
отработанного,  
(+)вещества (шлак)  
во вне ареала  
галактики по пути  
её следования.

Возникновение  
хвостовых  
облаков  
пыли.




Условное изображение, позволяющее представить ход событий. Изображение ядра и галактики представлены не пропорционально для лучшей демонстрации.

Эскизы возможных состояний и устройства Ядра галактики  
в исполнении художника Игоря Романовича Григорьянца

Рисунок предполагаемых топологических состояний внутри **Ядра** галактики.


**Вещество** (+) достигающее полюса Ядра - вретенообразно (скрутка по часовой, скорость падения  $> c$ ).  
 Попад на **поверхность Шварцшильда** совершая **1й фазовый переход** становится полем ( $v=c$ ). Пройдя далее, внутри ядра растягивается и скручивается (по часовой) в веретенообразную гипер-ленту ( $v > c$ ), информируясь в (-) **вещество**, и перед падением\касанием **Центра Ядра** вещество расплющивается в диск, далее протягивается спирально-плоской лентой стремясь, с замедлением ( $v > c \rightarrow v \leq c$ ), к экватору\0-радиусу **Ядра**. Изнутри достигнув **поверхности Шварцшильда** проходит **2й фазовый переход** (в состоянии **поля**  $v=c$ ) вновь скручивается в спираль **против часовой**, и находясь уже в «яслях», обретает объем - глюоны  $\rightarrow$  кварки, возрождаясь как известное нам (+) **вещество**  $v < c$ .



Возможно, преобразование веществ на поверхности  
**Центра Ядра** соответствует понятию  
**информативирования**.

То что до проникновения в **Ядро** мы называем  
**+веществом**, **койноматерией** - становится  
**полевой информацией** в момент **фазового перехода**,  
силы у которой: интерференция и резонанс.  
Значит информация ждёт команд и сигналов...  
**Отрицательное вещество** внутри Ядра должно  
структурироваться в динамике!

Следует ожидать ёлочно-дисковых структур,  
реагирующих на **команды** из иных порядков мира.  
Регулярность и направленность команд задаёт  
число силовых линий-интерференций.  
Например, 4 ритмующих команды -  
провоцирует возникновение  
4х рукавов галактики.



13.

Вариант, где **Центр Ядра** представляет собой **информальный волчок** по поверхностям которого стекает вещество, достигает нулевого радиуса\экватора и информируясь через полевое состояние возрождается как койноматерия

Ю.В.Козлов  
Общая Теория Всего.  
Ядра галактик как  
производители  
вещества во  
Вселенной.

выброс нейтронов

вытягивание  
вещества и  
проникновение  
в **Ядро**.


информационные вихри  
тороидального вида.

выброс нейтронов


**Центр-волчок** выполняет стабилизирующую функцию всей галактики!  
На поверхности волчка ожидаем интерференции числом кратные количеству рукавов галактики?

Возможно **центр\волчок** представляет собой вывертку - **информальное** состояние, которое мы можем описать «действительный вакуум-ничто». Это особый «мир» который не содержит собой ни отрицательных ни положительных состояний веществ, там нет ни времени ни пространства ни гравитации. Он полный **антагонист** +/- миру. То есть волны-резонансы и интерференции на его поверхности ему не принадлежат. Такое ядро - **супер якорь** для вселенского положения галактики.


2023г. По заданию Юрия Витальевича Козлова  
рис. Игоря Романовича Григорьянца



Модуль «9 миров»  
в разработке Игоря Романовича Григорьянца.



Соответствует древнейшей мифологии о 9 божествах и о 9 силах разных народов Земли.



число управляющих  
векторов прокрутки:  
**2, 3, 4** в модуле.



D: **30 уе.** - общий диаметр модуля.

D подетально: **1 уе.** , **2уе.** , **3уе.** , **4уе.**

**1** Центральный скручивает по часовой все **8 миров** →  
прокручиваются против часовой; а в них - **малые красные модули**  
- по часовой.

Модуль ограничен 9 «мирами».

Попытка преумножения до 13 и более - не результативна.