




Детализация структур и образов некоторых веществ
по Общей Теории Всего
Ю. В. Козлова



в исполнении художника Игоря Романовича Григорьянца

Россия СПб 2023

На основе предыдущих публикаций, в которых мы утверждаем строение и функцию Ядер галактик как производителей и переработчиков веществ во Вселенной, предлагаем ознакомиться с нашей версией векторно-вибрационной сути элементарных явлений.



$$-E_{n+1} = \frac{m_0 v^2}{\sqrt{\frac{v^2}{c^2} - 1}} - E\varphi$$



$$-m = \frac{-m_0}{\sqrt{\frac{v^2}{c^2} - 1}}$$


$$-E = \frac{m_0 \times (10c)^2}{\sqrt{\frac{(10c)^2}{c^2} - 1}}$$

$$-E_0 = m_0 c^2$$

При прохождении веществом первого **фазового перехода** на поверхности Шварцшильда, оно преобразуется в глюоны и проникает в Ядро модифицируясь в «антивещество», **антикварки**, позитроны с особыми свойствами:

1. Движение сверхсветовое и преимущественно с ускорением\торможением.
2. Масса имеет отрицательный характер - антагонист «нашей», привычной массе.
3. Собираясь фракционно в крупные объекты - обладает преимущественно **полевым характером**, с напряжением резонансов, интерференций и особой чуткостью к вибрациям! Гипервещества в Ядре галактики **звучат**. А плотность и скорость вращения всего Ядра говорит о вибрационно-звуковом его предназначении, помимо продуцирующей функции!
4. Ударные звуковые волны, изнутри провоцируют на экваторе Ядра возрождение веществ во 2 **Фазовом Переходе** - сначала глюонов, далее кварков и далее нейтронов.





3 периода\стадии
жёсткой модификации
вещества в
векторные
состояния.

В период
«Гармошка Бовта» явление
теряет «зернистость» и
характеризуется
спиралью-вектором.

В период «спягетификация»
характеризуется вытянутым
во и по времени состоянием

В период «струна»
характеризуется как
напряжённый вектор
готовый к превращению.

А внутри **Ядра**, в результате
1го Фазового Перехода
получаем «**антивещество**»
характеризующееся
отрицательной массой -
в следствии постоянных
ускорения\торможения
«кварков» и сверхсветового
вращения всего **Ядра**.


$$-E = \frac{m_0 v^2}{\sqrt{\frac{v^2}{c^2} - 1}} :$$

$$m_0 = m u$$

Комплекс гипотез

**«Гармошка Бовта»
«Множество Хафизова»,
и «Эффект Григорьянца»**

Состав и топология
преобразований
элементарных
явлений.




Принципиальный образ
«Гармошки Бовта»:

«Гармошка Бовта» - это вибрационно-векторная суть элементарной частицы.

Мы предполагаем, что элементарное явление, например «волно-частица» представляет собой динамический **вектор** исходящий из **точки начала** (0\0) на выделенном ей участке **браны** (интерферирующем, вибрирующем информационном поле) и возвращающийся туда в изменённом виде. Частота витков вектора\плети, амплитуда его волнения, направление волн и прочие метаморфозы предопределяют все свойства так звучащей волно-частицы.

1. Предполагаем вращение по и против часовой.
2. Предполагаем вибрацию любых элементов\фрагментов.
3. Дополнительные смещения\изгибы\прогибы\отгибы\склонения\наклонения\отклонения и т.п. относительно устоявшихся.
4. Предполагаем все возможные модификации. Изменения числа витков и их разворот.




Принципиальный образ «Гармошки Бовта»:

Состояние «начальное».
Гармошка Бовта может
модифицироваться/усложниться в глюон, квант,
фотон, кварк... В таком состоянии актуальна
брана и точка центрo-массы (**РА**).

Состояние «зародышевое».
Гармошка Бовта начинает модифицироваться в предназначенное явление.
Из точки проявляется центральная петля, которая станет осью.

Состояние «плодное».
Гармошка Бовта модифицировалась в зернистое
явление, например в протон. Сильно вращается
со склонениями/наклонениями.
По внешней спирали пробегают волны вибраций.



Дальнейшие модификации «Гармошки Бовта»
совершаются под жёстким воздействием **Ядер**
галактик.

Силами воронки **Ядра**
(галактики или иного явления)
начинает вытягиваться,
суживаться одновременно
повышая частоту
вибраций.







РА - источник
энергичности

МА - вменение
массы - вибрация.

низкие
вибрации
вектора

высокие
вибрации
вектора

брана



«Множество Хафизова»

Метаморфозы
протона, электрона и нейтрона
до и после втяжки в Ядро галактики

«Протон»

Состав и топология
преобразований

$$\begin{matrix} \mathbf{p} \\ +2\backslash 3 +2\backslash 3 -1\backslash 3 = +1 \end{matrix}$$


$$\begin{matrix} 1,6726 \cdot 10^{-27} \text{ кг.} \\ \text{или } 938,27 \text{ МэВ} \end{matrix}$$

Примерная, вибрационно-векторная структура **протона**.

вид векторного каркаса
«спереди»


момент массы как «касание реальности»

$u+2/3$ $u+2/3$




момент массы как «касание реальности»


вид векторного каркаса
с торца



вид векторного каркаса
«сверху»




вид векторного каркаса
в проекции



Принято считать, что связь «кварков» осуществляется в глюонном поле. **Глюон** - это актуализация бранного\полевого фрагмента, который появляется в период остановки кручения частицы, также, в моментах самостоятельности «кварков», на которые «частица» распадается в результате разрыва\остановки кручения вибрирующего вектора (см. стр. 11) и в момент падения разорванных элементов «частицы» (кварков) на поверхность **Ядра**. По нашему соображению: «кварки» во время «зернистости\реальности» частицы - суть одно - единое\целое с ней - это проявления вектора вращения в его взаимодействии\контактах с прочими «частицами»!


вид с эффектом прокрутки вектора протона по оси-координате с докруткой\качением поперёк.



Вектор вибрирует **радиально** от центра масс (**волна массы**) и **продольно** (**по стрелке** как пульсация керна). **Радиальная волна** создаёт «реальность»\актуальность частицы, обозначает её спин, **массу** и в проявляет «кварки», а **продольное\пульсирующее волнение** определяет **гравитационные** и **динамические** характеристики.

Продольно-радиальное волнение вектора определяет **электро-магнитные** свойства «частицы»

Вибрирующая
«интерференционная шуба»




Прокрутка вектора относительно **Центра Порождения Масс** создаёт вибрирующую «шубу» с пульсирующим «керном» в центре.

Моделирование показало появление 3 слоёв в такой интерференционно-динамической композиции, что соответствует его составу из 3 кварков. Возможно, качение подобной 3х-слойной «шубы» предопределяет его спин $1\frac{1}{2}$ и способность ко всем четырём фундаментальным взаимодействиям. Масса протона предопределяется числом прокрутки его вектора в период $1\frac{1}{2}$ спина (интенсивность радиальной вибрации) и силой качения относительно оси и пульсирующего керна (напряжённость продольной вибрации).

3 интерференционных слоя во вращении основаны 3 витками вектора. Это означает, что вектор протона достаточно стабилен и предопределён по форме!

Центр
Порождения
Масс




Метаморфозы
протона
на пути и
в воронке
Ядра галактики.




0. **1ФП**
Метаморфоза кварков **u u d** в состояние **глюон** - режим «**поле**». Актуальность материнской браны каждого глюона в моменте, на шварцшильдовской поверхности **Ядра** в **1 Фазовом Переходе**.

Форма пятна «**глюон**» γ квант соответствует основному элементу Мандельброта.




Волнение вектора
протона по внешней
стороне **радиально**.




Метаморфозы
протона,
вид в ракурсе.


Вектор протона
формирующий
вещественное,
«зернистое»
состояние.




Промежуточные
состояния.
«Гармошка Бовта»



Экстремальные
состояния - **разрывы**.



«пред-кварк»



«кварк»




ГЛЮОН

«Электрон»
«Позитрон»



Состав и топология преобразований

$$\begin{array}{c} e^- e^+ \\ 1\backslash 2 \\ 0,511 \text{ МэВ} \\ \text{или } 9 \cdot 10^{-31} \text{ кг} \end{array}$$

Волнение вектора электрона
внутри, у центра вращения -
радиально.




волнение вектора электрона
по внешней стороне
продольно.




Вектор электрона во вращении
формирует образ
напоминающий кровяные клетки.
В центре пульсирует «кern»
радиальных вибраций



вид «сверху»



Благодаря **продольному**
волнению вектора
электрон обладает
«**юркостью**»
- способностью
«проскальзывать»
в материалах. **0** изоспин.
Чутко реагировать
на температуры
проводника и наличие
магнитных полей.




В особых состояниях, например в
шаровой молнии, вектор электрона
может проявить свою
брану и становится подобен «кварку»,
но в отличие от него, - имеет сильную
продольно-радиальную вибрацию.
А преобразуясь в **фотон** - приобретает
больше **радиальной** вибрации теряя
продольную.




Примерная, последовательность метаморфоз **электрона** на пути и в воронке **Ядра** галактики.


Вектор электрона в кручении формирующий вещественное, «зернистое» состояние.



Вектор электрона вытягивается и суживается
Кручение замедляется




Вектор электрона вытягивается и суживается
Кручение медленное.



Вектор электрона вытягивается и суживается.
Низкочастотные вибрации. Объект очень «холодный»

4.




В период 4-5 метаморфозы вибрации имеют **радиально-продольный** характер но очень слабые. Этого достаточно для подчинения пост-электрона магнитным силам воронки.

Вектор электрона вытягивается и суживается настолько, что вибрации прекращаются. Дойдя до предела растяжения он резко сокращается с выверткой, превращаясь в **позитрон**. Именно как позитрон он проходит воронку и **1ФП**

На этапе 6-7 возможно превращение в фотон или глюон, однако векторно-вибрационные задатки требуют превращения скорее в себе подобное явление -
- в позитрон или обратно в электрон.

Так мы говорим о вменённых условиях метаморфоз - «фенотипических тенденциях».

8.




7.



6.



5.



Появление γ кванта излучения не связано с собственной метаморфозой электрона. Это реакция браны на вывертку электрона в позитрон.

«Нейтрон»

Состав и топология
преобразований


$$\begin{array}{c} n \\ +2\sqrt{3} - 1\sqrt{3} - 1\sqrt{3} = 0 \\ 939,565 \text{ МэВ} \\ \text{или } 1,674 \cdot 10^{-27} \text{ кг} \end{array}$$

Примерная, вибрационно-векторная структура **нейтрона**.

вид векторного каркаса
«спереди»

момент массы как «касание реальности»

$u+2/3$



момент массы как «касание реальности»

$d-1/3$ $d-1/3$

вид векторного каркаса
торца

$u+2/3$

ось-координата
векторов

$d-1/3$ $d-1/3$

вид векторного каркаса
«сверху»

$u+2/3$

$d-1/3$

ось-координата
векторов

нейтрона

сравнение
изотопина

и протона


вид векторного каркаса
в проекции

$u+2/3$




$d-1/3$

$d-1/3$

вид с эффектом прокрутки вектора нейтрона по оси-координате с докруткой/качением поперёк.




наклонение с докруткой




Вектор **нейтрона** вибрирует **радиально** от центра масс (**волна массы**). В отличие от **протона** продольная активность нейтрона мала, поэтому он не имеет заряда и меньше реагирует на магнитные внешние ему силы.


Продольно-радиальное волнение вектора **нейтрона** невелико.




Вибрация вектора
нейтрона сильная
но низкочастотная
в сравнении с
протоном.



вид торца



вид «сверху»



«Кварки»

Состав и топология
преобразований

u верхний
+ кварк

Направления выброса
формирующей кварк плети,
виды её волны (сечений)
и возвращение под брану.

u верхний
— кварк



вид сверху

вид сверху

примерная область
ухода волны из
«реальности»

вектор
кварка

в соответствии
спирали
Фибоначчи.



Волновая структура
(в сечении) **u** кварка



заряд + $\frac{2}{3}$

заряд - $\frac{2}{3}$

Интерферирующие векторы входа и
выхода кварковой волны создающие
эффекты очарованность и истинность.

масса **u** кварка - $2,3 \pm 0,7 \text{ Мэв}/c^2$

брана горизонт «реальности»

условно против
часовой

условно по
часовой

вид сбоку

вид сбоку

вывинчивание от браны

вывинчивание от браны

звинчивание под брану

звинчивание под брану

d нижний
— кварк

вид сверху




Направления выброса
формирующей кварк плети,
виды её волны (сечений)
и возвращение под брану.

вектор
кварка

примерная область
ухода волны из
«реальности»

d нижний
+ кварк

вид сверху





масса **d** кварка - $4,8 \pm 0,5 \text{ Мэв}/c^2$


брана горизонт «реальности»

условно по
часовой

условно против
часовой



u + кварк




u - кварк



c очарованный
t истинный

d - кварк




s странный
b прелестный

d + кварк



Бранная основа **конфайнмента** «кварков». В сущности это интерференционное **поле** для **Фазовых Переходов**.

Мы предполагаем что «кварк», в начале исхода его вектора из бранной центрo-массы волнуется продольно (в направлении от браны) а в развитии - радиально - полагая себе массу.



брана

брана

радиальное
волнение

Направление хода времени/вибрации
и оси «кварка»


брана

продольное
волнение



γ



«ФОТОН»

Суть и топология
преобразований




Выверт вектора фотона из материнской браны сопровождается радиальной вибрацией с небольшим склонением. Благодаря этому фотон не демонстрирует свою массу, но в состоянии оказывать давящее воздействие.






вид с торцов

Волнующаяся брана (фрагмент выделенный под фотон)









«Эффект Григорьянца»

Метаморфозы
фотона при взаимодействии
с Ядром галактики








Мы предполагаем что т.н. «эффект красного смещения» не свидетельствует о ускоренном расширении Вселенной!
«Покраснение» фотонов провоцируется силами Ядер галактик, их полюсных воронок; возможно и иных мощных гравитирующих объектов космоса.





Юрий Витальевич Козлов
Общая Теория Всего



Примерный вид метаморфоз вектора и «Гармошки Бовта» фотона при пролёте у воронки Ядра галактики. Радиальная частота\интенсивность увеличивается, продольная волна растягивается - «покраснение».

