Отчет о взаимодействии лекарств

Обнаружено 9 потенциальных взаимодействий и/или предупреждений для следующих 3 препаратов:

- клозапин
- рисперидон
- венлафаксин

Добавить еще один препарат

Потребитель | Профессиональный

- [x] Майор (2)
- [x] Умеренный (1)
- [x] Незначительный (0)
- [x] Еда/образ жизни (5)
- [x] Терапевтическое дублирование (1)

Взаимодействие между вашими препаратами

Главный **клозапин рисперидон** ⇄

Применимо к: клозапину, рисперидону

Проконсультируйтесь с врачом перед использованием клозапина вместе с рисперидоном . Клозапин может иногда вызывать серьезные сердечно-сосудистые побочные эффекты, такие как низкое кровяное давление и остановка сердца или дыхания , и риск может быть выше у пациентов, которые также получают такие препараты, как рисперидон. Сердечно-сосудистые побочные эффекты чаще всего возникают при первом приеме клозапина, при его возобновлении после перерыва в терапии или при быстром увеличении дозы. Также могут быть увеличены риск и/или тяжесть других побочных эффектов, включая головокружение, сонливость , нечеткость зрения, спутанность сознания, сухость во рту , спазмы в животе, запор , затрудненное мочеиспускание, непереносимость жары, учащенное сердцебиение, нерегулярный сердечный ритм, паркинсоноподобные симптомы и аномальные мышечные движения, затрагивающие в первую очередь лицо и иногда конечности. Вам может потребоваться корректировка дозы или более частый контроль со стороны врача для безопасного использования обоих препаратов. Сообщите своему врачу, если в любой момент лечения этими препаратами у вас возникнут усиленные или чрезмерные побочные эффекты, и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас возникнет внезапное головокружение, предобморочное состояние, обморок , одышка или учащенное или сильное сердцебиение. Избегайте вождения или работы с опасными механизмами, пока не узнаете, как на вас влияют препараты, и будьте осторожны, вставая из положения сидя или лежа. Если вы пропустили прием клозапина в течение двух или более дней, обратитесь к врачу, прежде чем возобновить лечение, так как вам может потребоваться начать с более низкой дозы. Важно сообщить врачу обо всех других принимаемых вами препаратах, включая витамины и травы. Не прекращайте прием каких-либо препаратов без предварительной консультации с врачом.

Главный **клоЗАПин венлафаксин** ⇄

Применимо к: клозапину, венлафаксину

Использование клозапина вместе с венлафаксином может увеличить риск нарушения сердечного ритма, что может быть серьезным и потенциально опасным для жизни, хотя это относительно редкий побочный эффект. Вы можете быть более восприимчивы, если у вас есть заболевание сердца, называемое врожденным синдромом удлиненного интервала QT , другие сердечные заболевания, нарушения проводимости или электролитные нарушения (например, потеря магния или калия из-за тяжелой или продолжительной диареи или рвоты). Обратитесь к врачу, если у вас есть какие-либо вопросы или опасения. Ваш врач, возможно, уже знает о рисках, но определил, что это лучший курс лечения для вас, принял соответствующие меры предосторожности и внимательно наблюдает за вами на предмет любых потенциальных осложнений. Вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если у вас возникнет внезапное головокружение, предобморочное состояние, обморок , одышка или учащенное сердцебиение во время лечения этими препаратами, как вместе, так и по отдельности. Важно сообщить врачу обо всех других принимаемых вами препаратах, включая витамины и травы. Не прекращайте прием каких-либо лекарств без предварительной консультации с врачом.

Умеренный **рисперидон венлафаксин** ⇄

Применимо к: рисперидону, венлафаксину

Использование рисперидона вместе с венлафаксином может увеличить риск нерегулярного сердечного ритма, который может быть серьезным и потенциально опасным для жизни, хотя это относительно редкий побочный эффект. Вы можете быть более восприимчивы, если у вас есть заболевание сердца, называемое врожденным синдромом удлиненного интервала QT , другие сердечные заболевания, нарушения проводимости или нарушения электролитов (например, потеря магния или калия из-за тяжелой или продолжительной диареи или рвоты). Обратитесь к врачу, если у вас есть какие-либо вопросы или опасения. Вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если во время лечения этими препаратами, как вместе, так и по отдельности, у вас возникло внезапное головокружение, предобморочное состояние, обморок , одышка или учащенное сердцебиение . Важно сообщить врачу обо всех других принимаемых вами препаратах, включая витамины и травы. Не прекращайте прием каких-либо лекарств без предварительной консультации с врачом.

Других взаимодействий между выбранными вами препаратами не обнаружено. Однако это не обязательно означает отсутствие других взаимодействий. Всегда консультируйтесь с врачом.

Взаимодействие лекарств и продуктов питания/образа жизни

Умеренный **еда/стиль жизни клозапин** ⇄

Применимо к: клозапину

Алкоголь может усилить побочные эффекты клозапина со стороны нервной системы, такие как головокружение, сонливость и трудности с концентрацией внимания. У некоторых людей также могут наблюдаться нарушения мышления и суждений. Во время лечения клозапином следует избегать или ограничить употребление алкоголя. Не превышайте рекомендуемую дозу клозапина и избегайте видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания, таких как вождение автомобиля или работа с опасными механизмами, пока не узнаете, как препарат на вас влияет. Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения, обратитесь к врачу или фармацевту.

Умеренный **risperiDONE еда/стиль жизни** ⇄

Применимо к: рисперидону

Раствор для приема внутрь Рисперидона нельзя смешивать с чаем или колой. Его можно принимать с водой, кофе, апельсиновым соком или обезжиренным молоком. Во время лечения Рисперидоном следует избегать употребления алкоголя. Алкоголь может усилить побочные эффекты Рисперидона со стороны нервной системы, такие как головокружение, сонливость и трудности с концентрацией внимания. У некоторых людей также могут наблюдаться нарушения мышления и суждений. Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения, обратитесь к врачу или фармацевту.

Умеренный **венлафаксин еда/образ жизни** ⇄

Применимо к: венлафаксину

Алкоголь может усилить побочные эффекты венлафаксина со стороны нервной системы, такие как головокружение, сонливость и трудности с концентрацией внимания. У некоторых пациентов также могут наблюдаться нарушения мышления и суждений. Во время лечения венлафаксином следует избегать или ограничить употребление алкоголя. Не превышайте рекомендуемую дозу венлафаксина и избегайте видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания, таких как вождение автомобиля или работа с опасными механизмами, пока не узнаете, как препарат влияет на вас. Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения, обратитесь к врачу или фармацевту.

Умеренный **еда/стиль жизни клозапин** ⇄

Применимо к: клозапину

Информация для потребителей по данному взаимодействию в настоящее время недоступна.

МОНИТОРИНГ: Отказ от курения может привести к повышению концентрации в плазме и усилению фармакологических эффектов препаратов, являющихся субстратами CYP450 1A2 (и, возможно, CYP450 1A1), и/или некоторых препаратов с узким терапевтическим индексом (например, флекаинида, пентазоцина). Один из предполагаемых механизмов связан с потерей индукции CYP450 1A2 и 1A1 полициклическими ароматическими углеводородами табачного дыма; при начале приема препаратов для отказа от курения и последующем прекращении курения метаболизм некоторых препаратов может замедляться, что приводит к повышению их концентрации в плазме. Механизм, посредством которого отказ от курения влияет на препараты с узким терапевтическим индексом, которые не являются известными субстратами CYP450 1A2 или 1A1, неизвестен. Клиническое значение этого взаимодействия неизвестно, поскольку клинические данные отсутствуют.

ЛЕЧЕНИЕ: До получения дополнительной информации рекомендуется соблюдать осторожность при одновременном применении препаратов для прекращения курения с препаратами, являющимися субстратами CYP450 1A2 или 1A1, и/или препаратами с узким терапевтическим диапазоном. Пациентам, принимающим препараты для прекращения курения, может потребоваться периодическая коррекция дозы и более тщательный клинический и лабораторный мониторинг препаратов, являющихся субстратами CYP450 1A2 или 1A1.

Незначительный **еда/стиль жизни клозапин** ⇄

Применимо к: клозапину

Информация об этом незначительном взаимодействии доступна в профессиональной версии .

Предупреждения о терапевтическом дублировании

Терапевтическая дублировка — это использование нескольких лекарственных препаратов из одной категории или терапевтического класса для лечения одного и того же заболевания. Это может быть намеренным, когда препараты со схожим действием используются совместно для достижения доказанного терапевтического эффекта. Это также может быть непреднамеренным, когда пациент лечился у нескольких врачей или получал лекарства по рецепту в нескольких аптеках, и может иметь потенциально неблагоприятные последствия.

Дублирование **Антипсихотики**

Терапевтическое дублирование

Рекомендуемое максимальное количество препаратов категории «антипсихотики» для одновременного приёма обычно составляет **один** . Ваш список включает **два** препарата, относящихся к категории «антипсихотики»:

- клозапин
- рисперидон

Примечание: При определенных обстоятельствах польза от приема этой комбинации препаратов **может** перевешивать любые риски. Всегда консультируйтесь с врачом, прежде чем вносить изменения в прием лекарств или дозировку.

Параметры отчета

Загрузка...

- Добавить/удалить лекарства
- Перейти к данным о профессиональном взаимодействии
- Сохранить отчет о взаимодействиях
- Отправьте этот отчет другу, врачу или пациенту по электронной почте.
- Задавайте вопросы, находите ответы

Классификация лекарственного взаимодействия

Эти классификации носят лишь рекомендательный характер. Определить значимость взаимодействия конкретного препарата для конкретного человека сложно. Всегда консультируйтесь с врачом перед началом или прекращением приёма любого препарата.

Главный	Высокая клиническая значимость. Избегайте сочетаний: риск взаимодействия перевешивает пользу.
Умеренный	Умеренно клинически значимый. Обычно следует избегать сочетаний; применять только в особых случаях.
Незначительный	Минимальная клиническая значимость. Минимизировать риск; оценить риск и рассмотреть альтернативный препарат, принять меры для предотвращения риска взаимодействия и/или разработать план мониторинга.
Неизвестный	Информация о взаимодействии отсутствует.

Смотрите также:

Рексульти
Рексулти — антипсихотик, используемый для лечения большого депрессивного расстройства, шизофрении или ажитации...
Обзоры и рейтинги
6.6 / 10 — 501 отзыв
Посмотреть больше

Врайлар
Врайлар — антипсихотический препарат для приема один раз в день, используемый для лечения психических расстройств или расстройств настроения...
Обзоры и рейтинги
6.1 / 10 — 537 отзывов
Посмотреть больше

ИЗБРАННОЕ
Оземпик
Узнайте больше о пре... Оземпик (семаглутид)... диабета 2 типа, контр... сердечно-сосудистых...
Обзоры и рейтинги
6.6 / 10
Посмотреть б...

Узнать больше

- Применение клозапина и побочные эффекты
- Применение рисперидона и побочные эффекты
- Применение и побочные эффекты венлафаксина

Дополнительная информация

Всегда консультируйтесь с лечащим врачом, чтобы убедиться, что информация, представленная на этой странице, соответствует вашим личным обстоятельствам.

Медицинская отмена ответственности



Мобильное приложение Drugs.com

Получайте доступ к информации о лекарственных препаратах и методах лечения, идентифицируйте таблетки, проверяйте взаимодействие между ними и создавайте личные записи о приеме лекарств.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Drugs.com предоставляет точную и независимую информацию о более чем 24 000 рецептурных и безрецептурных препаратов, а также натуральных продуктах. Этот материал предоставлен исключительно в образовательных целях и не предназначен для медицинских консультаций, диагностики или лечения. Источники данных включают Micromedex (обновлено 4 августа 2025 г.), Cerner Multum™ (обновлено 17 августа 2025 г.), ASHP (обновлено 10 августа 2025 г.) и другие.

TRUSTe Certified Privacy | @TRUST AACI Certified Medical Content | Ad Choices

Авторские права © 2000-2025 Drugs.com. Все права защищены.