

Análise Exploratória de Dados

Gabriela Scarpini e Victor Fossaluza

2025-05-27

Contents

1	Introdução	7
1.1	Apresentação	7
1.2	Programa	7
1.3	Bibliografia	8
1.4	Bibliografia Jupiterweb	8
1.5	Bibliografia Complementar	9
2	Conceitos básicos de Análise Exploratória de Dados	11
2.1	O que significa algo ser “aleatório”?	11
2.2	O que é Probabilidade?	12
2.3	O que é Estatística?	14
2.4	Método Científico	15
2.5	População X Amostra, Probabilidade X Estatística	16
2.6	Estatística Descritiva	16
2.7	Inferência Estatística	17
2.8	Aprendizado Estatístico	17
3	Apresentação à linguagem R	19
3.1	Como instalar	19
3.2	Comparação com outras linguagens estatísticas	19
3.3	Introdução ao RMarkdown	20
3.4	Operadores Básicos	21
3.5	Estrutura de Dados em R	25

3.6	Estruturas de controle	32
3.7	Funções	35
3.8	Funções Básicas e Pacotes	37
3.9	Exercícios	37
4	Dados	39
4.1	Processos de obtenção, importação, organização e transformação	39
4.2	Tipos de Variáveis	40
4.3	Tabelas de Frequências	40
4.4	Manipulação de Dados usando o tidyverse	42
4.5	Exercícios	46
5	Medidas de uma variável	47
5.1	Medidas de posição ou de Tendência Central	47
5.2	Medidas de Dispersão	48
5.3	Medidas de ordem	50
5.4	Calculo de medidas no R	52
5.5	Exercícios	53
6	Modelos Gráficos	55
6.1	Gráfico de Barras	55
6.2	Gráfico de Setores (Pizza)	57
6.3	Histograma	59
6.4	Ramos e Folhas	63
6.5	Box-Plot	64
6.6	Gráficos e simetria	66
6.7	Medidas de assimetria	70
6.8	Função de distribuição empírica (FDE)	72
6.9	Exercícios	74

7	Medidas de duas variáveis	77
7.1	Tabela de Contingência (de Frequências)	77
7.2	Correlação amostral	78
7.3	Qui-Quadrado de Pearson	79
7.4	Medidas de Associação baseadas no Qui-Quadrado	80
7.5	Outras Medidas de Associação	81
7.6	Medidas para Testes de Diagnóstico	82
7.7	Exercícios	84
8	Respostas dos exercícios	85
8.1	Capítulo 3	85
8.2	Capítulo 4	88
8.3	Capítulo 5	89
8.4	Capítulo 6	91
8.5	Capítulo 7	99
9	Regressão linear (incompleto)	101
9.1	Estimar a e b	102

Chapter 1

Introdução

1.1 Apresentação

Esse material está em fase inicial de desenvolvimento e será utilizado para apoiar as aulas de MAE0111 - Análise Exploratória de Dados.

O objetivo principal da apostila é funcionar como um resumo e auxiliar os estudantes na compreensão dos conceitos teóricos, com capítulos curtos e por meio de exercícios ao final de cada capítulo.

Comentários e correções podem ser enviadas para gabi.scarpini@usp.br.

1.2 Programa

1. A profissão de Estatística. A Estatística como metodologia de todas as ciências experimentais. O mercado de trabalho. O perfil profissional do Estatístico. A Estatística acadêmica: pós-graduação e pesquisa.
2. Apresentação de problemas reais analisados no CEA – Centro de Estatística Aplicada da USP, com ênfase na análise descritiva dos dados. Conclusões dos estudos.
3. Estatística descritiva e inferência estatística, tipos de dados, bancos de dados, ordem de grandeza, precisão e arredondamento de dados quantitativos, proporções e porcentagens, taxas e números índices, sugestões para construção e apresentação de gráficos e tabelas.
4. Representação gráfica e tabular da distribuição de dados: tabelas de frequências, gráficos de barras e do tipo “torta”, histogramas, densidade suavizada e função de distribuição empírica.

5. Medidas-resumo: medidas de posição, de dispersão, de assimetria e curtose, gráficos do tipo boxplot.
 6. Modelos para distribuições de frequências: gráficos de probabilidade.
 7. Associação entre variáveis qualitativas: tabelas de contingência de dupla entrada, coeficientes de associação, sensibilidade e especificidade, risco relativo, razão de chances, tabelas de contingência de múltiplas entradas.
 8. Associação entre variáveis quantitativas: gráficos de dispersão, covariância, correlação linear, matriz de covariâncias, matriz de correlações.
 9. Associação entre uma variável quantitativa e uma variável qualitativa: homogeneidade de distribuições, gráficos de médias, gráficos de perfis.
 10. Outros tópicos: elaboração de relatórios técnicos, uso do aplicativo R, dashboards.
-

1.3 Bibliografia

- Damiani, A., Milz, B., Lente, C., Falbel, D., Correa, F., Trecenti, J., Luduvica, N., Lacerda, T., Amorim, W. Ciência de Dados em R, Curso-R [link](#)
 - Peng, R.D. Exploratory Data Analysis with R, Leanpub. [link](#)
 - Mayer, F.P, Bonat, W.H., Zeviani, W.M., Krainski, E.T., Ribeiro Jr, P.J. Estatística Computacional com R. [link](#)
 - Grolemund, G. Wickham, H. R for Data Science. [link](#) (versão em português: [link](#))
 - Chang, W. R Graphics Cookbook, 2nd edition. [link](#)
 - Grolemund, G. Hands-On Programming with R. [link](#)
-

1.4 Bibliografia Jupiterweb

- Morettin, P. A., Bussab, W. O. (2017). Estatística Básica. 9a edição. Saraiva Educação SA.
- Wickham, H., Grolemund, G. (2017). R for data science: import, tidy, transform, visualize, and model data, O'Reilly Media, Inc. [link](#)
- Tukey, J. W. (1977). Exploratory Data Analysis. Reading: Addison Wesley.

- Cairo, A. (2016). The truthful art: Data, charts, and maps for communication. New Riders.
 - Tufte, E. R. (1983). The Visual Display of Quantitative Information, Cheshire: Graphics Press.
 - Few, S. (2012). Show Me the Numbers: Designing Tables and Graphs to Enlighten, 2a ed. Analytics Press.
-

1.5 Bibliografia Complementar

- Relatórios do CEA – Centro de Estatística Aplicada – USP.
 - Magalhães, M. N, de Lima, A. C. P. (2015). Noções de Probabilidade e Estatística. 7a edição. Editora da Universidade de São Paulo.
 - Murteira, B. F. J., Black, G. H. J.. (1983). Análise Exploratória de Dados - Estatística Descritiva, Lisboa: McGraw Hill.
 - Wexler, S., Shaffer, J., & Cotgreave, A. (2017). The big book of dashboards: visualizing your data using real-world business scenarios. John Wiley & Sons.
 - Chambers J. M., Cleveland W. S., Tukey, P. A.. (1983). Graphical Methods for Data Analysis. Boston: Duxbury Press.
 - W. M. Cleveland. (1993). Visualizing Data, Summit, New Jersey: Hobart Press.
 - W. M. Cleveland. (1994). The Elements of Graphing Data, Summit: Hobart Press.
-

Chapter 2

Conceitos básicos de Análise Exploratória de Dados

2.1 O que significa algo ser “aleatório”?

- **Aleatório** (*Google - Oxford Languages*)
(*adjetivo*)

1. que depende das circunstâncias, do acaso; casual, fortuito, contingente.
2. (física) referente a fenômenos físicos para os quais as variáveis tomam valores segundo uma determinada lei de probabilidade (p.ex., o movimento browniano).

- **Experimento Aleatório** (*The Concise Encyclopedia of Statistics, pp 430–433*)

Um experimento em que o resultado não é previsível com antecedência é chamado de experimento aleatório. Um experimento aleatório pode ser caracterizado da seguinte forma:

1. É possível descrever o conjunto de todos os resultados possíveis (chamado espaço amostral do experimento aleatório).
2. Não é possível prever o resultado com certeza.
3. É possível associar cada resultado possível a uma probabilidade de ocorrência.

2.2 O que é Probabilidade?

- **Probabilidade** (*Google - Oxford Languages*)
(substantivo feminino)

1. perspectiva favorável de que algo venha a ocorrer; possibilidade, chance.
“há pouca probabilidade de chuva”
2. grau de segurança com que se pode esperar a realização de um evento, determinado pela frequência relativa dos eventos do mesmo tipo numa série de tentativas.

- **Probabilidade** (*The Concise Encyclopedia of Statistics, pp 430–433*)

Podemos definir a probabilidade de um evento usando as frequências relativas ou por meio de uma abordagem axiomática.

Na primeira abordagem, supomos que um experimento aleatório é repetido muitas vezes nas mesmas condições. Para cada evento A definido no espaço amostral Ω , definimos n_A como o número de vezes que o evento A ocorreu durante as primeiras n repetições do experimento. Neste caso, a probabilidade do evento A , denotada por $P(A)$, é definido por:

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_A}{n} ,$$

o que significa que $P(A)$ é definido como o limite relativo ao número de vezes que o evento A ocorreu relativo ao número total de repetições.

Na segunda abordagem, para cada evento A , aceitamos que existe uma probabilidade de A , $P(A)$, satisfazendo os três axiomas a seguir:


1. $0 \leq P(A) \leq 1$,
2. $P(\Omega) = 1$,
3. Para cada sequência de eventos mutuamente exclusivos A_1, A_2, \dots (isto é, eventos tais que $A_i \cap A_j = \emptyset$ se $i \neq j$):

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) .$$

—

2.2.1 Interpretações de Probabilidade

- **Interpretação Clássica** (De Moivre, Laplace)
 - baseia-se na equiprobabilidade dos resultados;
 - $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$.
 - **Exemplo:** um lançamento de moeda, $A = \text{“cara”}$, $P(A) = \frac{1}{2}$.
- **Interpretação Frequentista** (Venn, von Mises, Reichenbach, etc.)
 - quase unânime na primeira metade do século XX e ainda é a mais aceita;
 - baseia-se na regularidade das frequências relativas (lei dos grandes números);
 - $P(A) = \lim \frac{A_n}{n}$, onde A_n é o número de ocorrências de A em n realizações *idênticas e independentes* do experimento;
 - Supõe que é possível repetir indefinidamente o experimento nas mesmas circunstâncias.
 - **Exemplo:** um lançamento de moeda, $A = \text{“cara”}$.



- **Interpretação Lógica** (Keynes, Jeffreys, Carnap, etc.)

- medida de “vínculo parcial” entre uma evidência e uma hipótese;
- baseia-se em relações objetivas entre proposições.
- **Exemplo:** considere duas proposições: “até agora todos os lançamentos resultaram em cara” e “será realizado um novo lançamento”. Pode-se afirmar que “provavelmente o resultado do novo lançamento será cara”.

- **Interpretação Subjetivista** (Ramsey, de Finetti, Savage, etc)

- probabilidade como medida subjetiva de crença;
- baseada na experiência de cada indivíduo, portanto única.
- **Exemplo:** suponha que Bruno lançou uma moeda 3 vezes e todos os resultados foram cara. Esse indivíduo, em posse dessa informação, pode acreditar que o resultado cara é mais provável que coroa. Contudo, quando pergunta sobre a probabilidade de cara ao seu colega Olavo, ignorante com relação a moeda, ele responde que é $1/2$.

2.2.2 Comentários sobre Probabilidade e Aleatoriedade

- Exemplo da moeda. Aleatoriedade é uma característica (física) do lançamento da moeda?
- Exemplo das bolas na Urna. A “aleatoriedade” está em “chacoalhar” a urna? E se eu “embrulhar” as bolas e colocá-las em fila sobre a mesa? O experimento ainda é “aleatório”? Qual a “probabilidade” de selecionar uma bola verde?

2.3 O que é Estatística?

- **Estatística** (*Google - Oxford Languages*)
(*substantivo feminino*)

1. ramo da matemática que trata da coleta, da análise, da interpretação e da apresentação de massas de dados numéricos.
2. qualquer coleta de dados quantitativos.

- **Estatística** (*The Concise Encyclopedia of Statistics, pp 518–520*)

A palavra estatística, derivada do latim, refere-se à noção de estado (status): “que é relativo ao estado”. Os governos têm uma grande necessidade de contar e medir numerosos eventos e atividades, como mudanças demográficas, nascimentos, tendências de imigração e emigração, mudanças nas taxas de emprego, negócios, etc.

Nessa perspectiva, o termo “estatística” é usado para indicar um conjunto de dados disponíveis sobre um determinado fenômeno (por exemplo, estatísticas de desemprego).

No sentido mais moderno e preciso da palavra, “estatística” é considerada uma disciplina que se preocupa com dados quantitativos. É constituído por um conjunto de técnicas de obtenção de conhecimento a partir de dados incompletos, de um rigoroso sistema científico de gestão de coleta de dados, da sua organização, análise e interpretação, quando é possível apresentá-los de forma numérica.

Numa população de indivíduos, pode ser de interesse saber, em termos de teoria estatística, se um determinado indivíduo tem carro ou se fuma. Por outro lado, também pode ser de interesse saber quantos indivíduos têm automóvel e são fumantes, e se existe relação entre possuir automóvel e hábitos de tabagismo na população estudada.

Gostaríamos de conhecer as características da população globalmente, sem nos preocuparmos com cada pessoa ou cada objeto da população.

Distinguimos dois subconjuntos de técnicas: (1) aquelas que envolvem estatísticas descritivas e (2) aquelas que envolvem estatísticas inferenciais. O objetivo essencial da estatística descritiva é representar a informação em um formato compreensível e útil. A estatística inferencial, por outro lado, visa facilitar a generalização dessas informações ou, mais especificamente, fazer inferências (relativas a populações) com base em amostras dessas populações.

- **Estatístico** (*segundo prof. Carlos Alberto de Bragança Pereira*)

“The Statistician is the Wizard who makes “scientific” statements about invisible states and quantities. However, contrary to the real wishes (or witches), he attaches uncertainties to his statements.”

2.4 Método Científico

1. Formulação de uma questão, teoria ou hipótese.
2. Coleta de informações: planejamento de um experimento para obtenção de dados ou apenas a observação de um fenômeno ou variáveis de interesse.

3. Conclusões (por vezes, parciais) baseadas nos dados obtidos anteriormente.
 4. Se necessário, repetir (2) e (3) ou formular novas hipóteses.
-

2.5 População X Amostra, Probabilidade X Estatística

- *População* é o conjunto de todos os elementos ou resultados possíveis.
 - *Amostra* é um subconjunto da população.
 - *Experimento* é “tornar visível o que antes era invisível”, por exemplo, observar uma amostra da população.
 - *Probabilidade* é uma descrição matemática da incerteza, é bem especificada quando a população é conhecida.
 - *Estatística* estuda a distribuição de probabilidades quando esta não está bem especificada (é desconhecida, ao menos parcialmente).
 - **Modelo Probabilístico:** $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$, onde Ω é o espaço amostral, \mathcal{F} é uma coleção (σ -álgebra) de subconjuntos de Ω e \mathbf{P} é uma medida de probabilidade (conhecida, fixada)
 - **Modelo Estatístico:** simplifcadamente, um modelo estatístico é uma forma probabilística de relacionar uma quantidade desconhecida de interesse (*parâmetro*) com os dados observados.
 - $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$, onde \mathcal{P} é uma família de distribuições de probabilidade. Na estatística, o objetivo é fazer afirmações sobre essa família.
-

2.6 Estatística Descritiva

- Conjunto de técnicas para visualização (redução) dos dados.

- Análises e conclusões preliminares.
 - Fornece informações que auxiliam na especificações de um *modelo estatístico*.
 - Também utilizada para
 - Avaliação de modelos;
 - Interpretação de modelos complexos;
 - Comunicação dos resultados.
 - Exemplo: medidas resumo, gráficos e tabelas.
-

2.7 Inferência Estatística

- Generalizar resultados observados em uma amostra para a população de interesse.
 - Normalmente baseada em algumas suposições que são traduzidas em um *modelo estatístico*.
 - Principais objetivos: concluir se há relações entre variáveis, estimativas pontuais e intervalares e testes de hipóteses.
 - Como o objetivo é generalizar conclusões para a população, é usual ter uma grande preocupação com a verificação das suposições do modelo estatístico adotado.
 - Por vezes chamada de “análise confirmatória”.
-

2.8 Aprendizado Estatístico

- Similarmente à inferência estatística, estuda relação entre variáveis mas tem como objetivo fazer predições para novas observações.

- Como o objetivo é fazer predições, o foco é obter um modelo que “acerte” mais ou, em outras palavras, que minimize algum tipo de função de perda, dando menos atenção às suposições sobre o modelo probabilístico utilizado.
 - Na prática, o conjunto de dados é dividido em um *conjunto de treinamento* e um *conjunto de teste*. O primeiro é usado para a obtenção de modelos e o segundo para a sua avaliação. O modelo escolhido é aquele que “acerta mais” no conjunto de teste.
 - Também pode ser pensada como uma forma reproduzir o mecanismo gerador dos dados.
-

Chapter 3

Apresentação à linguagem R

O R é uma linguagem de programação amplamente utilizada para análise de dados, cálculo estatísticos e visualização de dados. Além disso, o R tem uma enorme coleção de pacotes que ampliam suas funcionalidades, usaremos alguns durante o nosso estudo. O RStudio é uma interface gráfica para a linguagem de programação R. Ele torna o R mais fácil de usar e fornece algumas funcionalidades úteis.

3.1 Como instalar

Para instalar o R e o R-Studio basta seguir as instruções [aqui](#) e [aqui](#)

3.2 Comparação com outras linguagens estatísticas

Diferente de outras linguagens de programação, o R foi desenvolvido especificamente para a área de estatística, sendo usado na análise de dados e modelagem. Por isso, essa linguagem possui uma enorme quantidade de pacotes voltados para visualização e análise de dados (alguns exemplos são o `ggplot2`, `dplyr`, `caret`).

3.3 Introdução ao RMarkdown

Na disciplina de Análise Exploratória de Dados, usaremos somente o RMarkdown, uma ferramenta que nos permite escrever textos e executar códigos em R.

Para criar um arquivo em RMarkdown clique em *File > New File > R Markdown*. Preencha as informações iniciais, como o título do documento e o autor e por fim escolha o tipo de saída, como PDF, HTML ou Word.

- **Estrutura de um Arquivo RMarkdown**

Um arquivo .Rmd tem a seguinte estrutura:

1. Cabeçalho YAML, que define as configurações do documento.

```
title: "Introdução ao RMarkdown"
author: "Seu Nome"
date: "18/03/2025"
output: html_document
```

2. Texto formatado, que usa a sintaxe Markdown para formatação de texto, por exemplo:
 - “# Título 1” para criar títulos de nível 1.
 - Para destacar: “*Texto em itálico*” ou “**Texto em negrito**”.
 - Para criar listas não ordenadas (com marcadores): use - ou * antes dos itens. Já para listas ordenadas (numeradas): use números seguidos de ponto.
3. Blocos de códigos (chunks), que são delimitados por três crases (“`”`) e é onde você pode escrever e executar os comandos em R. Eles permitem integrar o código diretamente ao documento, gerando tabelas, gráficos, etc. Para cria-lo basta escrever as três crases Um atalho para cria-lo é com CTRL+ALT+I.

```
# seu código R.
```

- **Equações Matemáticas no RMarkdown:**

É possível fazer equações matemáticas em R Markdown usando a sintaxe do LaTeX. Existem duas formas principais:

1. Equações em linha: use cifrões simples $\$ \dots \$$ para inserir fórmulas no meio do texto.
2. Equações destacadas (em bloco): use dois cifrões $\$ \$ \dots \$ \$$ para centralizar a equação.

Para mais informações sobre o R Markdown, acesse a cheatsheet oficial diretamente pelo RStudio. Basta ir em Help > Cheatsheets > R Markdown Cheat Sheet. Lá você encontra um resumo com os principais comandos de formatação, código, tabelas, gráficos e equações.

3.4 Operadores Básicos

- Operadores de atribuição:

Em R usamos os operadores de atribuição para atribuir valores a variáveis. Para fazer isso podemos usar `<-`, `->` e `=`.

```
a <- 5 # armazena o valor 5 dentro da variável "a"
a
```

```
## [1] 5
```

```
10 -> b # armazena o valor 10 dentro da variável "b"
b
```

```
## [1] 10
```

```
c = 7 # armazena o valor 7 dentro da variável "c"
c
```

```
## [1] 7
```

Mesmo sendo possível usar diferentes operadores de atribuição, o padrão costuma ser feito com `<-`. Para isso, podemos usar o atalho `ALT+-`.

- Operadores aritméticos:

Para realizar operações matemáticas básicas, usamos:

```
# Adição: "+"
resultado1 <- 7 + 3

# Subtração: "-"
resultado2 <- 50 - 5

# Multiplicação: "*"
resultado3 <- 6 * 7 # 42

# Divisão: "/"
resultado4 <- 17 / 3

# Exponenciação: "^" ou "**"
resultado5 <- 2 ^ 4
resultado6 <- 3 ** 2

# Resto da divisão: "%%"
resultado7 <- 10 %% 3

# Divisão inteira: "%/%"
resultado8 <- 10 %/% 3
```

- Operadores de comparação:

Usamos os operadores de comparação para comparar dois valores, sendo retornado um valor lógico: TRUE ou FALSE, dependendo do resultado da comparação.

```
# Igualdade: "=="
3 == 3 # retorna TRUE
```

```
## [1] TRUE
```

```
3 == 4 # retorna FALSE
```

```
## [1] FALSE
```

```
# Desigualdade: "!="  
8 != 7 # retorna TRUE
```

```
## [1] TRUE
```

```
9 != 9 # retorna FALSE
```

```
## [1] FALSE
```

```
# Maior que: ">"  
7 > 3 # retorna TRUE
```

```
## [1] TRUE
```

```
# Menor que: "<"  
7 < 3 # retorna FALSE
```

```
## [1] FALSE
```

```
# Maior ou igual: ">="  
8 >= 10 # retorna FALSE
```

```
## [1] FALSE
```

```
# Menor ou igual: "<="  
9 <= 9 # retorna TRUE
```

```
## [1] TRUE
```

- **Valores especiais**

Os valores especiais são usados para representar situações atípicas ou condições especiais nos dados, como valores ausentes, infinitos ou indefinidos.

1. NA (Not Available): O valor NA representa dados ausentes ou não disponíveis.

```
a <- NA  
  
b <- c(1, 2, 3)  
b[4] # valor fora dos limites de um vetor também é NA
```

```
## [1] NA
```

```
# Verifica se o valor é NA  
is.na(a)
```

```
## [1] TRUE
```

```
is.na(b)
```

```
## [1] FALSE FALSE FALSE
```

2. NaN (Not a Number): um tipo especial de NA, usado para representar resultados indefinidos de operações matemáticas, como divisões por zero.

```
c <- 0/0  
d <- log(-1)
```

```
## Warning in log(-1): NaNs produzidos
```

```
# Verifica se o valor é NaN  
is.nan(c)
```

```
## [1] TRUE
```

```
is.nan(d)
```

```
## [1] TRUE
```

3. Inf e -Inf (Infinito): Inf e -Inf representam valores infinitos.

```
f <- 2 / 0  
g <- -1 / 0  
  
# Verifica se o valor é Inf  
is.infinite(f)
```



```
## [1] TRUE
```

4. NULL: representa a ausência de um valor ou objeto. Diferente do NA, que representa um valor ausente dentro de um vetor ou lista, NULL indica que o objeto não existe. Usamos normalmente para iniciar variáveis ou para remover elementos de listas.

```
h <- NULL

# Verifica se o valor é null
is.null(h)
```

```
## [1] TRUE
```

3.5 Estrutura de Dados em R

- Vetores

Os vetores são uma estrutura de dados que armazena uma sequência de elementos, sendo todos do mesmo tipo (número, caracteres ou valores lógicos).

- Vetor numérico:

```
n <- c(11, 22, 33, 44)

n[2] # Valor no índice 2 do vetor
```

```
## [1] 22
```

```
# Valor do vetor em um subconjunto de índices
n[c(1,3)]
```

```
## [1] 11 33
```

```
n[c(3,1,4,2)]
```

```
## [1] 33 11 44 22
```

```
n[1:3] # valores do vetor do índice 1 ao índice 3
```

```
## [1] 11 22 33
```

```
# Multiplicação por escalar (multiplica cada elemento)
2*n
```

```
## [1] 22 44 66 88
```

```
# Soma com escalar (soma cada elemento)
v <- n+1
```

```
# Soma de Vetores (soma cada termo de n com o elemento de mesmo índice de v)
n+v
```

```
## [1] 23 45 67 89
```

```
# Produto de Vetores (termo a termo)
n*v
```

```
## [1] 132 506 1122 1980
```

```
# Produto Escalar (multiplica os dois vetores da mesma posição e soma os resultados de
n%*%v
```

```
##      [,1]
## [1,] 3740
```

```
# Quando somamos vetores de tamanhos diferentes repetimos os elementos até o tamanho d
n - c(1,2)
```

```
## [1] 10 20 32 42
```

```
# Caso o tamanho de um deles não seja múltiplo do outro, o R solta uma mensagem de erro
c(1,2,3) - n
```

```
## Warning in c(1, 2, 3) - n: comprimento do objeto maior não é múltiplo do
## comprimento do objeto menor
```

```
## [1] -10 -20 -30 -43
```

- Vetor de Caracteres:

```
Nomes = c("Letícia","Mariana","Guilherme","Viviane",  
          "Ana","Otávio","Eduardo")
```

```
# Identificando o tipo de vetor  
typeof(Nomes)
```

```
## [1] "character"
```

```
class(Nomes)
```

```
## [1] "character"
```

- Vetor de valores lógicos:

```
Feminino = c(TRUE,TRUE,FALSE,TRUE, TRUE, FALSE, FALSE)
```

```
# Identificando o tipo de vetor  
class(Feminino)
```

```
## [1] "logical"
```

```
# TRUE e FALSE são tratados como 1 e 0  
sum(Feminino)
```

```
## [1] 4
```

-
- Matrizes

Matrizes é uma estrutura de dados que permite armazenar os dados de uma forma bidimensional, com linhas e colunas. Todos os elementos precisam ser do mesmo tipo.

```
M <- matrix(c(1, 0, 0, 2, 1, 0, 3, 4, 1), ncol=3)
```

```
# Dimensão da Matriz M  
dim(M) # linha, coluna
```

```
## [1] 3 3
```

```
# Acessando um elemento da matriz
M[1, 2] # elemento da linha 1 e da coluna 2
```

```
## [1] 2
```

```
M[1,] # primeira linha (vetor)
```

```
## [1] 1 2 3
```

```
M[,3] # última coluna (vetor)
```

```
## [1] 3 4 1
```

```
# Determinante
det(M)
```

```
## [1] 1
```

```
# Matriz Inversa
IM <- solve(M)
```

```
# Produto de Matrizes
M%*%IM
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]    1    0    0
## [2,]    0    1    0
## [3,]    0    0    1
```

- Listas

Diferente dos vetores, as listas podem armazenar objetos de tipos diferentes, sendo muito mais flexíveis.

```
lista <- list(
  nome = "Letícia",
  notas = c(8, 10, 9, 7, 6, 8),
  matriz = matrix(1:4, nrow = 2)
)

# Acessando elementos de uma lista
lista[[3]] # usando o índice
```

```
##      [,1] [,2]
## [1,]    1    3
## [2,]    2    4
```

```
lista$notas # usando o nome
```

```
## [1]  8 10  9  7  6  8
```

```
lista[c("nome", "notas")]
```

```
## $nome
## [1] "Letícia"
##
## $notas
## [1]  8 10  9  7  6  8
```

```
# Modificando elementos
lista$notas <- c(8, 9)
```

• Fatores

No R, a estrutura de dados fatores podem ser usadas para representar os dados categóricos, ou seja, variáveis que assumem valores diferentes, como níveis, podendo ser ordenados ou não.

```
nivel_educacional <- factor(c("Fundamental", "Médio", "Superior"))

satisfacao <- factor(c("baixa", "alta", "média"),
                     levels = c("baixa", "média", "alta"), # indica os níveis
                     ordered = TRUE) # indica que a ordem dos níveis importa
```

Para trabalhar com fatores podemos usar o pacote `forcats`, que nos fornece funções para criar, modificar e organizar fatores de forma eficiente, sendo possível reordenar níveis com base em valores associados, agrupar categorias raras, ordenar níveis com base em suas frequências e trabalhar com dados categóricos de forma mais eficaz. Ainda nesse capítulo, falaremos mais sobre a instalação e o uso de pacotes dentro do RMarkdown.

• Data Frames

Os Data Frames são uma das estruturas mais usadas para armazenar os dados em formato de tabela. Cada coluna é um vetor de mesmo tamanho e pode ter tipos diferentes (números, caracteres, fatores, etc.).

```
df <- data.frame(  
  nome = c("Mariana", "Juliana", "Isabela"),  
  idade = c(19, 8, 14),  
  altura = c(1.68, 1.50, 1.55)  
)
```

```
# Acessando colunas  
df$nome
```

```
## [1] "Mariana" "Juliana" "Isabela"
```

```
# Acessando elementos usando colchetes - o primeiro índice refere-se as linhas e o seg  
df[, "idade"]
```

```
## [1] 19  8 14
```

```
df[1, ]
```

```
##      nome idade altura  
## 1 Mariana    19   1.68
```

```
df[1, "altura"]
```

```
## [1] 1.68
```

Por mais que possa parecer com a estrutura de listas, o data frame é uma tabela de dados em formato de linhas e colunas. Diferente de uma lista, as suas colunas devem ter o mesmo número de elementos.

Também podemos manipular os data frames no R usando banco de dados.

```
# Carregando o banco de dados 'iris'  
data("iris")
```

```
# Vendo o conteúdo do banco de dados  
# iris # tudo  
head(iris) # primeiros elementos
```

```
##      Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 1          5.1          3.5          1.4          0.2   setosa
## 2          4.9          3.0          1.4          0.2   setosa
## 3          4.7          3.2          1.3          0.2   setosa
## 4          4.6          3.1          1.5          0.2   setosa
## 5          5.0          3.6          1.4          0.2   setosa
## 6          5.4          3.9          1.7          0.4   setosa
```

```
tail(iris) # últimos elementos
```

```
##      Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width  Species
## 145          6.7          3.3          5.7          2.5 virginica
## 146          6.7          3.0          5.2          2.3 virginica
## 147          6.3          2.5          5.0          1.9 virginica
## 148          6.5          3.0          5.2          2.0 virginica
## 149          6.2          3.4          5.4          2.3 virginica
## 150          5.9          3.0          5.1          1.8 virginica
```

```
# Dimensões do banco de dados
```

```
dim(iris) # primeiro as linhas, depois as colunas
```

```
## [1] 150  5
```

```
nrow(iris) # número de linhas
```

```
## [1] 150
```

```
ncol(iris) # número de colunas
```

```
## [1] 5
```

```
# Nome das variáveis (colunas)
```

```
names(iris)
```

```
## [1] "Sepal.Length" "Sepal.Width"  "Petal.Length" "Petal.Width"  "Species"
```

```
colnames(iris)
```

```
## [1] "Sepal.Length" "Sepal.Width"  "Petal.Length" "Petal.Width"  "Species"
```

```
# Nome das variáveis (linhas)
rownames(iris)
```

```
## [1] "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "10" "11" "12"
## [13] "13" "14" "15" "16" "17" "18" "19" "20" "21" "22" "23" "24"
## [25] "25" "26" "27" "28" "29" "30" "31" "32" "33" "34" "35" "36"
## [37] "37" "38" "39" "40" "41" "42" "43" "44" "45" "46" "47" "48"
## [49] "49" "50" "51" "52" "53" "54" "55" "56" "57" "58" "59" "60"
## [61] "61" "62" "63" "64" "65" "66" "67" "68" "69" "70" "71" "72"
## [73] "73" "74" "75" "76" "77" "78" "79" "80" "81" "82" "83" "84"
## [85] "85" "86" "87" "88" "89" "90" "91" "92" "93" "94" "95" "96"
## [97] "97" "98" "99" "100" "101" "102" "103" "104" "105" "106" "107" "108"
## [109] "109" "110" "111" "112" "113" "114" "115" "116" "117" "118" "119" "120"
## [121] "121" "122" "123" "124" "125" "126" "127" "128" "129" "130" "131" "132"
## [133] "133" "134" "135" "136" "137" "138" "139" "140" "141" "142" "143" "144"
## [145] "145" "146" "147" "148" "149" "150"
```

3.6 Estruturas de controle

As estruturas de controles são “instruções” que nos permitem criar lógica nos programas e determinar como as operações e funções serão executadas.

- Condicionais

As estruturas condicionais permitem executar blocos de código com base em condições lógicas. Elas verificam se determinada condição é verdadeira ou falsa e executam diferentes blocos do código com base no resultado.

O comando *if* avalia se uma condição é verdadeira (TRUE), caso seja o bloco de código associado é executado.

```
# if (condição) {
#   Código executado se a condição for TRUE
# }

# Exemplo
a <- 10
if (a > 5) {
  print("a é maior que 5")
}
```



```
## [1] "a é maior que 5"
```

Quando é necessário tratar tanto o caso que a condição é verdadeira, quanto o caso em que é falsa, utilizamos *if* - *else*.

```
# if (condição) {  
#   Código executado se a condição for TRUE  
# } else {  
#   Código executado se a condição for FALSE  
# }  
  
# Exemplo  
  
b <- 3  
if (b > 5) {  
  print("b é maior que 5")  
} else {  
  print("b é menor ou igual a 5")  
}
```

```
## [1] "b é menor ou igual a 5"
```

Quando temos mais de uma condição usamos *if* - *else if* - *else*.

```
# if (condição1) {  
#   Código executado se condição1 for TRUE  
# } else if (condição2) {  
#   Código executado se condição1 for falsa e condição2 for TRUE  
# } else {  
#   Código executado se nenhuma das condições anteriores for TRUE  
# }  
  
# Exemplo  
  
c <- 0  
if (c > 0) {  
  print("c é positivo")  
} else if (c < 0) {  
  print("c é negativo")  
} else {  
  print("c é zero")  
}
```

```
## [1] "c é zero"
```

Quando se trata de analisar vetores, podemos usar *ifelse*, que avalia cada elemento de vetor de maneira individual.

```
# ifelse(condição, valor_se_verdadeiro, valor_se_falso)

# Exemplo
d <- c(-5, 0, 4, 9)
resposta <- ifelse(d > 0, "positivo", "não positivo")
print(resposta)
```

```
## [1] "não positivo" "não positivo" "positivo"      "positivo"
```

• Laços de repetição

Os laços de repetição (ou loops) em R nos permitem executar blocos de códigos múltipla vezes. Temos dois principais tipos: *for* e *while*.

O *for* é um laço de iteração, usado para iterar sobre uma sequência, como vetores, listas, etc.

```
# for (variável in sequência) {
#   Código a ser executado
# }

# Exemplo
for (i in 1:5) {
  print(paste("O quadrado de", i, "é", i^2))
}
```

```
## [1] "O quadrado de 1 é 1"
## [1] "O quadrado de 2 é 4"
## [1] "O quadrado de 3 é 9"
## [1] "O quadrado de 4 é 16"
## [1] "O quadrado de 5 é 25"
```

No exemplo acima a variável “i” assume o valor de cada número da sequência em cada iteração, ou seja, i assume a sequência de números de 1 a 5.

O *while* é um laço condicional, ou seja, executa o bloco de código enquanto a condição determinada for verdadeira.

```
# while (condição) {  
  # Código a ser executado  
# }  
  
# Exemplo  
a <- 1  
while (a <= 5) {  
  print(a)  
  a <- a + 1  
}
```

```
## [1] 1  
## [1] 2  
## [1] 3  
## [1] 4  
## [1] 5
```

O exemplo acima realiza uma contagem de 1 até 5. O valor da variável “a” começa em 1, a condição `a <= 5` é verificada e enquanto ela for verdadeira o código dentro do laço é executado. A cada iteração o valor de x é impresso e incrementado 1. O loop finaliza assim que a se torna 6, ou seja, o momento em que a condição `x <= 5` se torna falsa.

É preciso tomar cuidado para que o *while* não se torne um loop infinito, ou seja, é necessário garantir que a condição imposta no *while* se torne falsa em algum momento.

3.7 Funções

As funções são blocos de código reutilizáveis que nos permitem executar tarefas específicas. A estrutura básica de uma função é: - Nome da função; - Argumentos (entrada que a função espera receber); - Corpo da função (especifica o que a função faz); - Valor de retorno (o que a função retorna após a execução).

```
soma <- function(a, b){  
  resultado <- a + b  
  return(resultado)  
}  
  
# Testando a função 'soma'  
soma(7, 3)
```

```
## [1] 10
```

Podemos criar funções utilizando estruturas de controle, para determinar o fluxo de execução do código.

```
# Função que calcula o fatorial de um inteiro não negativo
fatorial <- function(n){
  if(n<0){
    print("Número negativo! Digite um inteiro positivo!")
    return()
  }
  f <- 1
  while(n>1){
    f <- f*n
    n <- n-1
  }
  return(f)
}

# Testa a função 'fatorial'
fatorial(4)
```

```
## [1] 24
```

```
# Teste para um número negativo
fatorial(-1)
```

```
## [1] "Número negativo! Digite um inteiro positivo!"
```

```
## NULL
```

Podemos criar também função com valores padrões, atribuindo valores aos argumentos. Dessa forma, se o usuário não fornecer um valor ao chamar a função, o valor padrão é utilizado.

```
subtracao <- function(a, b = 1) {
  resultado <- a - b
  return(resultado)
}

# Testando a função 'subtracao'
subtracao(7, 2) # com os dois argumentos
```

```
## [1] 5
```

```
subtracao(5) # usando o argumento padrão para "b"
```

```
## [1] 4
```

3.8 Funções Básicas e Pacotes

As funções básicas são aquelas já incorporadas na linguagem, que não requerem pacotes adicionais. Alguns exemplos são: - ‘mean()’ para calcular a média de um vetor - ‘sd()’ para o desvio padrão. - ‘sum()’ para somar os elementos de um vetor. - ‘prod()’ – Multiplica todos os elementos de um vetor.

Já os pacotes são coleções de funções que estendem a funcionalidade do R, permitindo a realização de análises mais específicas. Os pacotes que usaremos nessa apostila são: ggplot2, dplyr, tdyr, forcats, tibble

Pacotes podem ser instalados usando `install.packages("nome_do_pacote")` e carregados com `library(nome_do_pacote)`.

3.9 Exercícios

- 1) Crie dois vetores de números inteiros: `vetor1` e `vetor2`, ambos com a mesma quantidade de elementos. Depois realize as seguintes operações:
 - a. some os dois vetores.
 - b. subtraia o vetor 1 do vetor2.
 - c. multiplique os dois vetores, elemento por elemento.
- 2) Crie duas matrizes de dimensões 3x3. Depois realize as seguintes operações:
 - a. some as duas matrizes.
 - b. subtraia a segunda matriz da primeira.
 - c. multiplique as duas matrizes.
3. Crie um `data.frame` chamado `alunos` com três colunas: `Nome`, `Idade` e `Nota`. Preencha o `data.frame` com pelo menos 5 registros. Em seguida, crie uma nova coluna chamada `Aprovado`, que será `TRUE` se a `Nota` for maior ou igual a 5 e `FALSE` caso contrário.

- 4) Escreva uma função que retorna uma matriz “E” em que cada elemento é o valor “b” elevado a cada elemento da matriz M. Como padrão, $b=e$.
 - 5) Escreva uma função que recebe dois parâmetros: base e altura, e retorna a área de um triângulo.
 - 6) Escreva uma que recebe um vetor de números e retorna uma lista com a quantidade de números positivos e a quantidade de números negativos no vetor.
-

Chapter 4

Dados

4.1 Processos de obtenção, importação, organização e transformação

- **Obtenção:** experimentos controlados, estudos observacionais, etc.
- **Importação:** armazenar (ou importar) os dados em um formato compatível com software utilizado, aqui utilizaremos o R.
- **Organização:** colocar os dados em uma estrutura consistente. Normalmente, cada linha é a uma observação e cada coluna é uma variável.
- **Transformação:** criar novas variáveis como função das variáveis existentes, restringir observações de interesse, calcular medidas resumo, etc.

Ordem Lançamento	Filme	Data	Duração	Bilheteria (Milhões)	Gênero
1	Toy Story	1995-11-22	81	373	Aventura
2	Vida de inseto	1998-11-25	95	363	Comédia
3	Toy Story 2	1999-11-24	92	497	Aventura
4	Monstros S. A.	2001-11-02	92	632	Aventura
5	Procurando Nemo	2003-05-30	100	871	Comédia
6	Os Incríveis	2004-11-05	115	631	Ação
7	Carros	2006-06-09	117	461	Esporte
8	Ratatouille	2007-06-29	111	623	Aventura
9	WALL-E	2008-06-27	98	521	Ficção Científica
10	Up Altas Aventuras	2009-05-29	96	735	Drama

A tabela acima é uma versão reduzida do banco de dados “filmes_pixar”, disponível para download **aqui**. Este banco de dados foi elaborado para servir de base na construção de tabelas e gráficos nesse e nos próximos capítulos. Já a versão reduzida será usada para facilitar os cálculos e a resolução de exemplos na lousa, durante a aula.

Formalmente, uma amostra é uma coleção de vetores aleatórios, X_1, X_2, \dots, X_n , independente e indenticamente distribuída (*i.i.d*), com $X_i = X_{i1}, X_{i2}, \dots, X_{ik}$,

em que o primeiro índice se refere à unidade amostral (ou seja, a linha do banco de dados) e o segundo índice se refere a uma característica (variável) da unidade amostral (ou seja, a coluna do banco de dados).

Denotaremos aqui os valores observados por letras minúsculas, por exemplo, x_1, x_2, \dots, x_n , são os valores observados em uma particular amostra de X_1, X_2, \dots, X_n .

4.2 Tipos de Variáveis

1. **Qualitativas:** atributos não numéricos

- *Nominal*
 - Nomes ou rótulos, sem uma relação de ordem
 - Exemplos: Sexo, Religião, Cor dos Olhos, Time de Futebol
- *Ordinal*
 - As diferentes categorias podem ser colocados em ordem
 - Exemplos: Faixa Etária, Escolaridade, Classe Social

2. **Quantitativas:** atributos numéricos

- *Discretas*
 - Assume uma quantidade enumerável de valores
 - Exemplos: Número de Filhos, Quantidade de Erros na Prova, Número de Livros Lidos em 2023
 - *Contínuas*
 - Assume uma quantidade não enumerável de valores
 - Exemplos: Altura, Pressão, Tempo
-

4.3 Tabelas de Frequências

- Tabela contendo frequências absolutas e/ou relativas de cada categoria de uma *variável qualitativa*.

Gênero	Freq	FreqRel
Aventura	8	0.348
Ação	2	0.087
Comédia	4	0.174
Drama	3	0.130
Esporte	3	0.130
Ficção Científica	1	0.043
Musical	2	0.087

Pode-se afirmar que nesta amostra, o gênero predominante é aventura (34,7% dos filmes).

- Para *variáveis qualitativas ordinais*, pode-se também considerar as frequências relativas acumuladas.
- Também é possível fazer tabela de frequências para *variáveis quantitativas discretas*. Para algumas variáveis, como a duração do filme, poucos valores se repetem. Nesses casos, é comum agrupar os valores dessas variáveis em classes e calcular a frequência de cada classe.

Faixas_duração	Freq	FreqRel
80 – 90	1	0.043
90 – 100	12	0.522
101 – 110	6	0.261
111 – 120	4	0.174

- Por fim, para *variáveis quantitativas contínuas*, também podemos usar

Bilheteria_Mundial	Freq	FreqRel	FreqAcum
1.1 bilhão – 1.3 bilhão	1	0.043	0.043
300 milhões – 500 milhões	8	0.348	0.391
500 milhões – 700 milhões	6	0.261	0.652
700 milhões – 900 milhões	5	0.217	0.869
900 milhões – 1.1 bilhão	3	0.130	1.000

- A quantidade e o tamanho das faixas é arbitrário. Contudo, um número muito pequeno de classes pode ocasionar perda de informação, enquanto um número muito grande de classes pode prejudicar o objetivo de resumir os dados.

- Por fim, as faixas podem ter tamanhos diferentes. No entanto, a análise dessas classes deve ser feito com cuidado. A escolha de classes com tamanhos diferentes normalmente só é feita quando há poucas observações em algum intervalo.

4.4 Manipulação de Dados usando o tidyverse

A manipulação de dados no R tem como objetivo organizar, filtrar e transformar um banco de dados. O *tidyverse* é um conjunto de pacotes que compartilham uma filosofia de design e uma gramática comum, tornando a manipulação de dados mais intuitiva e fluida. Os pacotes principais são:

Tibble

O tibble é uma estrutura de dados do R, sendo uma versão atualizada do data.frame. Ele é mais completo, mais legível e menos propenso a erros do que o data.frame, uma vez que não converte automaticamente strings em fatores e permite colunas com tipos de dados mais complexos (como listas e funções). Além disso, o tibble se encaixa devidamente com outros pacotes do tidyverse.

Para transformar um data.frame já existente em tibble:

```
library(tibble)
exemplo_tibble <- as_tibble(meu_dataframe)
```

Ou então, basta criá-lo diretamente

```
meu_tibble <- tibble(
  x = 1:4,
  y = c("a", "b", "c", "d"),
  z = x^2
)
```

O operador pipe

O pipe (`%>%`) é um operador do pacote *magrittr* que encadeia funções, ou seja, ele pega o resultado de uma expressão e passa como argumento para a próxima função. A ideia é que ao invés de escrever o código de dentro pra fora, escrevemos passo a passo, numa sequência lógica. Por exemplo

```
# As duas linhas representam a mesma coisa
f(x, y)
x %>% f(y)
```

```
# Raiz quadrada sem o pipe
x <- c(5, 3, 1, 0, 4, 2, 1)
sqrt(sum(x))
```

```
## [1] 4
```

```
# Raiz quadrada com o pipe
library(magrittr)
x <- c(5, 3, 1, 0, 4, 2, 1)
x %>% sum() %>% sqrt()
```

```
## [1] 4
```

O pacote dplyr

O dplyr é o pacote mais comum para manipulação de dados no R. Suas principais funções são:

- `select()` - seleciona colunas
- `arrange()` - ordena a base
- `filter()` - filtra linhas
- `mutate()` - cria/modifica colunas
- `group_by()` - agrupa a base
- `summarise()` - sumariza a base

Todas essas funções tem como entrada e como saída uma tibble. Além disso, o dplyr facilita o uso do operador *pipe*.

Exemplo:

```
library(dplyr)
dados %>%
  filter(idade > 18) %>%
  group_by(genero) %>%
  summarise(media_salario = mean(salario))
```

O exemplo acima resulta em uma tabela mostrando, para cada gênero, a média de salário das pessoas maiores de 18 anos. Ou seja, primeiro filtramos (*filter*) apenas as pessoas com idade acima de 18, agrupamos (*group_by*) os dados por gênero e resumimos (*summarise*) calculando a média dos salários de cada grupo.

Outra coisa que o pacote dplyr permite fazer é combinar duas tabelas com base em uma ou mais colunas em comum, o nome disso é *join*. Os principais tipos de join são:

- `inner_join()` - mantém apenas as linhas que aparecem nas duas tabelas.
- `left_join()` → mantém todas as linhas da tabela da esquerda, preenchendo com NA o que não casar na direita.
- `right_join()` - mantém todas as linhas da tabela da direita.
- `full_join()` - mantém todas as linhas das duas tabelas.

Um exemplo:

```
library(dplyr)

clientes <- tibble(cliente_id = c(1, 2, 3),
                   nome = c("Victor", "Letícia", "Mariana"))

compras <- tibble(cliente_id = c(1, 2, 4),
                  valor = c(10, 20, 30))

# Juntar apenas quem aparece nos dois
inner_join(clientes, compras, by = "cliente_id")

## # A tibble: 2 x 3
##   cliente_id nome      valor
##   <dbl> <chr>    <dbl>
## 1         1 Victor      10
## 2         2 Letícia    20
```

O pacote Stringr

O pacote *stringr* é um dos pacotes do *tidyverse* especializado em manipulação de strings (textos). Seu objetivo é tornar o trabalho com strings mais simples, eficiente e legível. Suas principais funções são:

- `str_detect()` - Verifica se um padrão existe em uma string (retorna TRUE/FALSE).
- `str_subset()` - Filtra strings que contêm determinado padrão.
- `str_split()` - Divide strings com base em um delimitador.
- `str_length()` - Retorna o número de caracteres da string.
- `str_trim()` Remove espaços em branco no início e no fim.
- `str_to_lower()` / `str_to_upper()` Converte texto para minúsculas / maiúsculas.

Exemplo:

```
library(tidyverse)

dados <- tibble(nome = c("Letícia", "Mariana", "Mateus", "Guilherme"))
dados %>%
  mutate(comeca_com_B = str_detect(nome, "^G"))
```

```
## # A tibble: 4 x 2
##   nome      começa_com_B
##   <chr>    <lgl>
## 1 Letícia FALSE
## 2 Mariana FALSE
## 3 Mateus  FALSE
## 4 Guilherme TRUE
```

O exemplo abaxio cria uma coluna que retorna *TRUE* se o nome começa com B e *FALSE* caso contrário.

O pacote lubridate

Trabalhar com datas e horários na base do R pode ser complicado, uma vez que, pode ser cheio de erros e formatos diferentes, então o pacote *lubridate*, do *tidyverse* foi criado para deixar tudo isso mais fácil. Suas principais funções são:

- `second()` - extrai os segundos.
- `minute()` - extrai os minutos.
- `hour()` - extrai a hora.
- `wday()` - extrai o dia da semana.
- `mday()` - extrai o dia do mês.
- `month()` - extrai o mês.
- `year()` - extrai o ano.

```
# Data e hora (editados pela última vez)
library(lubridate)
today()
```

```
## [1] "2025-05-07"
```

```
hour(now())
```

```
## [1] 21
```

O pacote Forcats

Embora o R base já tenha suporte a fatores, manipular níveis, ordenar ou recodificar fatores pode ser meio confuso e gerar muito error. O pacote *forcats* (FOR Categorical Variables) é um pacote do *tidyverse* foi criado para facilitar esse trabalhar e tornar a manipulação de fatores mais simples.

O *forcats* criar fatores de forma controlada, renomeia e recodifica níveis, reordena níveis com base em frequência ou valores, lida com fatores não utilizados. Algumas de suas funções são:

- `fct_relevel()` - reordena níveis manualmente, movendo um ou mais para frente.
- `fct_reorder()` - reordena níveis de um fator com base em outra variável.
- `fct_infreq()` - ordena os níveis do fator pela frequência (do mais comum ao menos comum).
- `fct_recode()` - renomeia os níveis.
- `fct_count()` - conta as observações por nível.
- `fct_lump()` - Junta os níveis menos frequentes em “Outro”.

Exemplo:

```
library(forcats)
nivel <- factor(c("alto", "baixo", "médio", "baixo", "alto", "baixo"))
fct_infreq(nivel)
```

```
## [1] alto  baixo médio baixo alto  baixo
## Levels: baixo alto médio
```

O código acima reordena os fatores por frequência.

4.5 Exercícios

1. Usando o conjunto de pacotes *tidyverse* e o banco de dados do R *mtcars*, faça seguinte:
 - (a) Filtre apenas os carros que têm 6 cilindros.
 - (b) Selecione apenas as colunas: `mpg`, `hp` e `wt`.
 - (c) Ordene o resultado do maior para o menor consumo de combustível (`mpg`).
2. Primeiro, crie um vetor com o nome e sobrenome de 5 pessoas, depois, usando o pacote *stringr* separe o nome e o sobrenome de cada pessoa.
3. Crie o fator:

```
cores <- factor(c("rosa", "vermelho", "azul", "amarelo", "rosa", "verde", "azul", "rosa"))
```

A partir disso: (a) Reordene os níveis para que a cor mais frequente venha primeiro. (b) Agrupe todas as cores menos frequentes que “azul” em um novo nível chamado “Outro”.

Chapter 5

Medidas de uma variável

5.1 Medidas de posição ou de Tendência Central

- Utilizadas para resumir variáveis quantitativas.
- Dão a ideia do lugar da reta estão concentrados os valores de uma variável.

5.1.1 Média (Aritmética)

- A medida mais utilizada é a **média**, definida por

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} .$$

*Exemplo - Duração dos filmes da pixar: $\bar{x} = \frac{81+95+92+92+100+115+117+111+98+96+103+106+93+104+95+93+97+102+100.65}{23}$

- Alternativamente, quando há empates (isto é, n_1 observações do valor x_1 , n_2 observações do valor x_2 , e assim por diante), podemos calcular a média por

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i = \sum_{i=1}^k f_i x_i = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \dots + n_k x_k}{n} ,$$

em que $k \leq n$ é a quantidade de valores diferentes assumidos pela variável X e $\sum n_i = n$. Ainda pode-se considerar para o cálculo da média a frequência relativa $f_i = n_i/n$.

- Quando os dados estão agrupados em classes, podemos calcular um valor aproximado da média fazendo

$$\bar{x} \approx \sum_{i=1}^k f_i \bar{x}_i,$$

em que \bar{x}_i é o valor médio da i -ésima classe e f_i é a frequência relativa daquela classe.

5.1.2 Mediana

- A **mediana** é o valor central dos dados. Pode ser calculada por

$$md(x) = \begin{cases} x_{(\frac{n+1}{2})}, & \text{se } n \text{ é ímpar} \\ \frac{x_{(\frac{n}{2})} + x_{(\frac{n}{2}+1)}}{2}, & \text{se } n \text{ é par} \end{cases}$$

em que $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$, $x_{(1)}$ é o menor valor observado na amostra, $x_{(2)}$ é o segundo menor valor, \dots , $x_{(n)}$ é o maior valor na amostra. $x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(n)}$ são chamados *estatísticas de ordem*.

* Para a duração do filme: $md(x) = 1.725$

- **Observação:** a mediana é uma medida mais robusta que a média pois é menos afetada por valores extremos.

5.1.3 Moda

- A **moda** é o valor que mais frequente na amostra.
- Em alguns casos, pode existir mais de uma moda.
 - Para a duração do filme: $mo(x) = 100$

5.2 Medidas de Dispersão

- Na maioria dos casos, somente as medidas de posição trazem pouca informação sobre a variável de interesse.

- Por exemplo, considere as seguintes amostras de tamanho 3: $(1, 5, 9)$, $(4, 5, 6)$ e $(5, 5, 5)$. Em todas elas, $\bar{x} = md(x) = 5$. Contudo, na primeira os valores estão mais “espalhados”, enquanto na última os valores estão mais “concentrados”.
- Para descrever melhor esta diferença, podemos usar medidas que nos informem o quanto os dados estão “espalhados”, ou como é a dispersão dos dados.

5.2.1 Variância

- A variância é a média dos desvios ao quadrado das observações com relação à média, dada por

$$var(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

– No exemplo acima:

1. para a Amostra 1: $\frac{(1-5)^2 + (5-5)^2 + (9-5)^2}{3} = \frac{16 + 0 + 16}{3} = 10.666;$
2. para a Amostra 2: $\frac{(4-5)^2 + (5-5)^2 + (6-5)^2}{3} = \frac{1 + 0 + 1}{3} = 0.666;$
3. para a Amostra 3: $\frac{(5-5)^2 + (5-5)^2 + (5-5)^2}{3} = 0.$

– No exemplo da duração do filme: $var(x) = 73$

5.2.2 Desvio padrão

- A variância está em uma escala diferente da variável observada. Uma forma de contornar isso é calcular sua raiz. A medida resultante é chamada de desvio padrão: $dp(x) = \sqrt{var(x)}$

– No exemplo acima:

1. para a Amostra 1: $\sqrt{\frac{(1-5)^2 + (5-5)^2 + (9-5)^2}{3}} = \sqrt{32/3} = 3.265986;$
2. para a Amostra 2: $\sqrt{\frac{(4-5)^2 + (5-5)^2 + (6-5)^2}{3}} = \sqrt{2/3} = 0.8164966;$
3. para a Amostra 3: $\sqrt{\frac{(5-5)^2 + (5-5)^2 + (5-5)^2}{3}} = 0.$

– No exemplo da duração do filme: $dp(x) = \sqrt{73} = 8.54 \text{ m}$

5.2.3 Desvio médio ou absoluto

- Outra medida de dispersão é o desvio médio (ou absoluto):

$$dm(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|.$$

– No exemplo acima:

1. para a Amostra 1: $\frac{|1-5| + |5-5| + |9-5|}{3} = \frac{8}{3} \approx 2.666;$
2. para a Amostra 2: $\frac{|4-5| + |5-5| + |6-5|}{3} = \frac{2}{3} \approx 0.666;$
3. para a Amostra 3: $\frac{|5-5| + |5-5| + |5-5|}{3} = 0.$

- O desvio médio, assim como o desvio padrão, representam “erros” médios ao aproximar os valores observados pela média.
-

5.3 Medidas de ordem

5.3.1 Quartis e quantis

- Como vimos, a mediana é o valor que “divide ao meio” a amostra.
- De forma similar, podemos dividir a amostra em partes menores. Por exemplo, pode ser de interesse considerar os valores que dividem a amostra nos 5% menores valores, 10% menores, 20% e assim por diante.
- O *quantil* de ordem p ou p -quantil, $0 < p < 1$, é o valor $Q(p)$ tal que $100 \cdot p$ % das observações sejam menores do que $Q(p)$.
- Há diversas formas de definir os quantis amostrais (veja, por exemplo, a ajuda do R para a função *quantile*). Aqui, por simplicidade, vamos considerar a definição a seguir.

$$Q(p) = \begin{cases} x_{(i)} & \text{se } p = p_i = \frac{i-0.5}{n}, \quad i = 1, \dots, n \\ (1-f_i)Q(p_i) + f_i Q(p_{i+1}) & \text{se } p_i < p < p_{i+1} \\ x_{(1)} & \text{se } 0 < p < p_1 \\ x_{(n)} & \text{se } p_n < p < 1 \end{cases}$$

em que $f_i = \frac{p - p_i}{p_{i+1} - p_i}$.

- Quando houver empates (valores iguais) na amostra, vamos considerar o maior p_i entre as observações empatadas.
- Outros quantis podem ser calculados, como por exemplo,

$$\begin{aligned}
 - Q(0.5) &= \left(1 - \frac{0.5-0.45}{0.55-0.45}\right) Q(0.45) + \left(\frac{0.5-0.45}{0.55-0.45}\right) Q(0.55) = \frac{1}{2} \cdot 1.70 + \\
 &\quad \frac{1}{2} \cdot 1.75 = 1.725 = md(x) \\
 - Q(0.83) &= \left(1 - \frac{0.83-0.75}{0.85-0.75}\right) Q(0.75) + \left(\frac{0.83-0.75}{0.85-0.75}\right) Q(0.85) = 0.2 \cdot 1.79 + \\
 &\quad 0.8 \cdot 1.81 = 1.806 \\
 - Q(0.13) &= \left(1 - \frac{0.13-0.05}{0.25-0.05}\right) Q(0.05) + \left(\frac{0.13-0.05}{0.25-0.05}\right) Q(0.25) = 0.6 \cdot 1.50 + \\
 &\quad 0.4 \cdot 1.60 = 1.54
 \end{aligned}$$

- Os quantis $Q(0.25)$, $Q(0.50)$ e $Q(0.75)$ são chamados de primeiro, segundo e terceiro **quantis** e são denotados por q_1 , q_2 e q_3 , respectivamente. Como já foi dito, $q_2 = md(x)$.

5.3.2 Distância (ou Amplitude) Interquartis

- Outra medida de dispersão bastante utilizada é a *distância interquartis*, definida por

$$d_Q = q_3 - q_1 .$$

- A distância interquartis é a amplitude do intervalo que concentra 50% das observações centrais.

5.3.3 Desvio Mediano Absoluto

- Como a mediana é uma medida mais robusta que a média, é possível estabelecer também uma medida de dispersão em termos de desvios em relação à mediana. Assim, defina o *desvio mediano absoluto* como

$$dma(x) = md(|x_i - md(x)|) .$$

5.3.4 Amplitude

- Distância entre o maior e o menos valor observado.

$$\Delta = x_{(n)} - x_{(1)}$$

5.4 Cálculo de medidas no R

- Média: função `mean()`

```
media <- mean(c(10, 20, 30, 40, 50, 55, 60))
```

- Mediana: função `median()`

```
mediana <- median(c(10, 20, 30, 40, 50, 68))
```

- Moda: o R não possui uma função embutida para moda, porém podemos calcular dessa forma:

```
dados <- c(1, 2, 2, 3, 3, 3, 4)
frequencias <- table(dados)
moda <- as.numeric(names(frequencias[frequencias == max(frequencias)]))
```

- Quartis: função `quantile()`

```
quartis <- quantile(c(10, 20, 30, 40, 50))
```

- Variância: função `var()`

```
dados <- c(10, 12, 23, 23, 16, 23, 21, 16)
variancia <- var(dados)
```

- Desvio padrão: função `sd()`

```
dados <- c(10, 12, 23, 23, 16, 23, 21, 16)
desvio_padrao <- sd(dados)
```

- Desvio mediano absoluto: função `mad()`

```
dados <- c(10, 12, 23, 23, 16, 23, 21, 16)
desvio_mediano_absoluto <- mad(dados)
```

Chapter 6

Modelos Gráficos

6.1 Gráfico de Barras

- O gráfico de barras é adequado para variáveis qualitativas (nominais ou ordinais) e também para variáveis quantitativas discretas.
- **Exemplo 1: Variável Qualitativa Nominal** (Gênero de filme)

Gênero	Freq	FreqRel
Aventura	8	0.3478261
Ação	2	0.0869565
Comédia	4	0.1739130
Drama	3	0.1304348
Esporte	3	0.1304348
Ficção Científica	1	0.0434783
Musical	2	0.0869565

```
graf_genero_f <- filmes_pixar %>%
  ggplot() + theme_bw() + xlab("genero") + ylab("Frequência") +
  geom_bar(aes(x = genero, fill= genero)) +
  scale_fill_manual("genero", values = c("Aventura" = "deeppink",
    "Comédia" = "magenta", "Ação" = "coral2",
    "Esporte" = "seagreen1", "Drama" = "turquoise3",
    "Musical" = "maroon3", "Ficção Científica" = "royalblue"))



graf_genero_p <- tab_genero %>%
  ggplot() + theme_bw() + xlab("genero") + ylab("Proporção") +
  geom_bar(aes(x= Gênero, fill= Gênero, y=FreqRel), stat="identity") +
  scale_fill_manual("genero", values = c("Aventura" = "deeppink",
```

```

"Comédia" = "magenta", "Ação" = "coral2",
"Esporte" = "seagreen1", "Drama" = "turquoise3",
"Musical" = "maroon3", "Ficção Científica" = "royalblue"))

# ggpubr::ggarrange(graf_genero_f, graf_genero_p, legend="none")
ggpubr::ggarrange(graf_genero_f, graf_genero_p, legend = "none", ncol = 1)

```




- **Exemplo 2: Variável Quantitativa** (duração do filme)

Faixa_duracao	Freq	FreqRel
[81,86]	1	0.0434783
(91,96]	7	0.3043478
(96,101]	5	0.2173913
(101,106]	6	0.2608696
(106,111]	1	0.0434783
(111,116]	1	0.0434783
NA	2	0.0869565

```

tab_duracao %>%
  ggplot() + theme_bw() + xlab("Duração do filme") + ylab("Proporção") +
  geom_bar(aes(x= Faixa_duracao, y= FreqRel), fill="royalblue", stat="identity")

```

6.2 Gráfico de Setores (Pizza)


- Pode ser utilizado para variáveis qualitativas.

```

pizza_genero <- tab_genero %>%
  mutate(Porc = scales::percent(FreqRel)) %>%
  ggplot(aes(x = "", y = FreqRel, fill = Gênero)) +
  geom_col(color = "white") +
  geom_label(aes(label = Porc), #color = c(1, "white", "white"),
    position = position_stack(vjust = 0.5),
    show.legend = FALSE) + guides(fill = guide_legend(title = "")) +
  scale_fill_manual("Gênero dos filmes", values =c("Aventura" = "deeppink",
    "Comédia" = "magenta", "Ação" = "coral2",
    "Esporte" = "seagreen1", "Drama" = "turquoise3",
    "Musical" = "maroon3", "Ficção Científica" = "royalblue1")) +
  coord_polar(theta = "y") + ggtitle("Gênero dos filmes") +
  theme_void() + theme(legend.position="bottom",
    plot.title = element_text(hjust = 0.5))

ggpubr::ggarrange(pizza_genero)

```




- Por que deve ser evitado?
 - Quando as frequências são muito pequenas (abaixo de 5%, por exemplo), as fatias se tornam de difícil visualização.
 - Dependem do uso de cores. Isso pode dificultar a escolha de cores que sejam suficientemente contrastantes para uma melhor visualização. Isso pode ser ainda mais prejudicado dependendo do dispositivo que for visualizar o gráfico (se a impressão ou o monitor for de baixa qualidade, por exemplo). Por fim, isso pode dificultar a visualização por pessoas que tem dificuldades em enxergar cores (cerca de 8% da população masculina é daltônica, por exemplo).
 - A comparação direta entre dois gráficos de pizza é bem mais difícil que em gráficos de barras. No segundo é bem mais fácil visualizar diferenças, se esse for seu objetivo.
 - Ainda assim, podem ser utilizados em casos específicos onde os problemas anteriores não ocorrem (quando há poucas categorias, nenhuma delas com frequências muito baixas e as diferenças são muito evidentes ou o objetivo não é fazer comparações).
-

6.3 Histograma

- Adequado para variáveis quantitativas (contínuas).
- Apesar de ser parecido com o gráfico de barras, no histograma as bases dos retângulos são proporcionais aos intervalos das classes e as áreas de cada retângulo devem ser proporcionais às frequências de cada classe.

Bilheteria_Mundial	Freq	FreqRel
1.1 bilhão – 1.3 bilhão	1	0.0434783
300 milhões – 500 milhões	8	0.3478261
500 milhões – 700 milhões	6	0.2608696
700 milhões – 900 milhões	5	0.2173913
900 milhões – 1.1 bilhão	3	0.1304348

```
filmes_pixar %>% ggplot() + theme_bw() +
  geom_histogram(aes(bilheteria_mundial), color="black", fill="royalblue",
    breaks= c(300000000, 500000000, 700000000, 900000000,
      1100000000, 1300000000))
```




- Quando as faixas tem tamanhos diferentes, não é adequado usar as frequências absolutas ou relativas no eixo y pois a área do gráfico

correspondente pode dar a impressão de que as frequências são maiores do que efetivamente foi observado. É possível ver isso no gráfico a seguir.

- Neste caso, o ideal é utilizar a *densidade de frequência* no eixo y, dada por $d_i = \frac{f_i}{\delta_i}$, onde δ_i é o comprimento da faixa.


Bilheteria_Mundial	Freq	FreqRel	delta	Dens
1.1 bilhão – 1.3 bilhão	1	0.0434783	0.2	0.2173913
300 milhões – 500 milhões	8	0.3478261	0.1	3.4782609
500 milhões – 700 milhões	6	0.2608696	0.1	2.6086957
700 milhões – 900 milhões	5	0.2173913	0.1	2.1739130
900 milhões – 1.1 bilhão	3	0.1304348	0.1	1.3043478

```
#hist_bilheteria_c <-
filmes_pixar %>% ggplot() + theme_bw() +
  geom_histogram(aes(bilheteria_mundial), color="black", fill="royalblue",
    breaks= c(300000000, 500000000, 700000000, 900000000,
      1100000000, 1300000000))
```



```
#hist_bilheteria_m <-
filmes_pixar %>% ggplot() + theme_bw() +
  geom_histogram(aes(bilheteria_mundial, after_stat(density)),
    color="black", fill="royalblue",
```

```
breaks= c(300000000, 500000000, 700000000, 900000000,
          1100000000, 1300000000))
```



```
#ggpubr::ggarrange(hist_bilheteria_c, hist_bilheteria_m, ncol=1)
```

- Note que desta forma, a área total do histograma é igual a 1.

6.3.1 Números de faixas e largura

Para construir um histograma, não existe um número correto de faixas, e diferentes larguras podem revelar diferentes aspectos dos dados. Faixas mais largas ajudam a reduzir o ruído onde há poucos dados, enquanto faixas mais estreitas aumentam a precisão onde há muitos dados. Existem diferentes métodos para fazer essa escolha, alguns exemplos são:

Fórmula de Sturges:

Uma opção simples é usar a *Fórmula de Sturges*, que calcula o número de faixas a partir do tamanho da amostra:

$$k = \lceil \log_2 n \rceil + 1$$

Esse é o método padrão usado pelo R base. Como esse método calcula o número de faixas com base no tamanho da amostra n , ela pode ter um desempenho

ruim quando $n < 30$, pois gera poucas faixas, o que dificulta a visualização de tendências. Para grandes conjunto de dados, ela pode superestimar a largura das faixas, gerando um histogramas excessivamente suavizado. Além disso, pode não funcionar bem para dados que não seguem uma distribuição simétrica.

Regra de Referência Normal de Scott:

Outra método é a *Regra de Referência Normal de Scott*, que busca minimizar o erro na estimativa da densidade. Ela define a largura h das faixas como:

$$h = \frac{3,49 \cdot \text{desvio padrão}}{\sqrt[3]{n}}$$

Essa abordagem é melhor para dados com variabilidade semelhante à de uma distribuição simétrica.

Regra de Freedman-Diaconis:

Outro exemplo é a regra de Freedman–Diaconis, que é mais robusta a dados assimétricos ou com outliers, usando o intervalo interquartil (IQR) no lugar do desvio padrão, ele define a largura h das faixas como:

$$h = 2 \cdot \frac{\text{IQR}(x)}{\sqrt[3]{n}}$$

Ela se adapta melhor a distribuições que não são tão bem comportadas.

Exemplo no R:

Para criar um histograma no R usando o número de faixas (ou largura das faixas) usando a fórmula desejada, é possível calcular o valor manualmente e depois passá-lo para o argumento `breaks` da função `hist()`.

```
# Exemplo usando a fórmula de Sturges:
n <- length(dados) # Tamanho da amostra
k_sturges <- 1 + log2(n) # Fórmula de Sturges

hist(dados, breaks = k_sturges)
```

Além disso, também é possível usar um número de faixas diretamente, colocando o valor de `breaks` como um número inteiro.

Assim, dependendo do tipo de dado e do objetivo da análise, podemos escolher o método mais adequado para definir o número de faixas no histograma. Para encontrar outros métodos e fórmulas, basta acessar o site [aqui](#).

6.4 Ramos e Folhas

- Similar a um histograma mas com menos perda de informação.

duracao
81
92
92
93
93
95
95
96
97
98
100
100
100
102
102
103
104
105
106
111
115
117
118

```
stem(filmes_pixar$duracao)
```

```
##
## The decimal point is 1 digit(s) to the right of the |
##
## 8 | 1
## 9 | 223355678
## 10 | 000223456
## 11 | 1578
```

```
stem(filmes_pixar$bilheteria_mundial / 1e9)
```

```
##
## The decimal point is at the |
##
```

Bilheteria_Mundial	Freq	FreqRel	delta	Dens
1.1 bilhão – 1.3 bilhão	1	0.0434783	0.1	0.4347826
300 milhões – 500 milhões	8	0.3478261	0.1	3.4782609
500 milhões – 700 milhões	6	0.2608696	0.1	2.6086957
700 milhões – 900 milhões	5	0.2173913	0.1	2.1739130
900 milhões – 1.1 bilhão	3	0.1304348	0.1	1.3043478


```
## 0 | 113444
## 0 | 5555666677899
## 1 | 0112
```

- Não é adequado quando temos grandes bancos de dados e não tem o mesmo efeito visual de um boxplot.

6.5 Box-Plot


- Utilizado para representar graficamente os quartis, além dos valores mínimo e máximo.

```
filmes_pixar %>% ggplot() + theme_bw() +
  geom_boxplot(aes(y=duracao), color="black", fill="royalblue")
```



- No retângulo estão representados os quartis q_1 , q_2 e q_3 .
- A reta acima do retângulo se estende até o valor máximo observado, desde que esse não seja maior que $q_3 + 1.5 \cdot d_q$.
- Do mesmo modo, a reta abaixo do retângulo se estende até o mínimo, desde que esse não seja menor que $q_1 - 1.5 \cdot d_q$.
- Se houver valores que excedam os limites acima propostos, a reta acima (abaixo) do retângulo vai até o maior (menor) valor menor (maior) que $q_3 + 1.5 \cdot d_q$ ($q_1 - 1.5 \cdot d_q$).
- Os valores fora destes limites serão representados por asteriscos e são chamados de *outliers* (ou *valores atípicos*)
- É possível incluir os pontos observados no boxplot para não ter perda de informação.

```
filmes_pixar %>% ggplot(aes(x="",y=duracao)) + theme_bw() +
  geom_boxplot(color="black", fill="royalblue") +
  ggbeeswarm::geom_beeswarm(cex=3,size=3,method = "center")
```



```
#geom_dotplot(binaxis= "y",stackdir = "center",fill = 1,dotsize = 0.8,stackratio=2)
#geom_jitter(color="black", size=1, alpha=0.9)
```

6.6 Gráficos e simetria


```
set.seed(13)

simul <- tibble(y = rnorm(150,2.5,1))
lim = c(min(simul$y),max(simul$y))

hist <- simul %>% ggplot() + theme_classic() + xlab("") + xlim(lim[1],lim[2]) +
  ggtitle("Simetria") +
  geom_histogram(aes(y,after_stat(density)),
    color="black", fill="royalblue", bins=8)

box <- simul %>% ggplot(aes(x="",y=y)) +
  theme_classic() + coord_flip() + xlab("") + ylab("") + ylim(lim[1],lim[2]) +
  geom_boxplot(color="black", fill="royalblue")
  #ggbeeswarm::geom_beeswarm(cew=1,size=1,method = "center")

ggpubr::ggarrange(hist, box, heights = c(2, 1), nrow=2, align = "v")
```




```
set.seed(13)

simul <- tibble(y = rgamma(150,2.5,1))
lim = c(min(simul$y),max(simul$y))

hist <- simul %>% ggplot() + theme_classic() + xlab("") + xlim(lim[1],lim[2]) +
  ggtitle("Assimetria à Direita") +
  geom_histogram(aes(y,after_stat(density)),
    color="black", fill="royalblue", bins=10)

box <- simul %>% ggplot(aes(x="",y=y)) +
  theme_classic() + coord_flip() + xlab("") + ylab("") + ylim(lim[1],lim[2]) +
  geom_boxplot(color="black", fill="royalblue")
  #ggbeeswarm::geom_beeswarm(cex=1,size=1,method = "center")

ggpubr::ggarrange(hist, box, heights = c(2, 1), nrow=2, align = "v")
```



```


simul <- lim[2]-simul+lim[1]
lim = c(min(simul$y),max(simul$y))

hist <- simul %>% ggplot() + theme_classic() + xlab("") + xlim(lim[1],lim[2]) +
  ggtitle("Assimetria à Esquerda") +
  geom_histogram(aes(y,after_stat(density)),
    color="black", fill="royalblue", bins=10)

box <- simul %>% ggplot(aes(x="",y=y)) +
  theme_classic() + coord_flip() + xlab("") + ylab("") + ylim(lim[1],lim[2]) +
  geom_boxplot(color="black", fill="royalblue")
  #ggbeeswarm::geom_beeswarm(cew=1,size=1,method = "center")

ggpubr::ggarrange(hist, box, heights = c(2, 1), nrow=2, align = "v")

```



- Os quartis são medidas de posição que auxiliam na avaliação da simetria dos dados. Para uma distribuição aproximadamente **simétrica**, espera-se que

$$- q_2 - x(1) \approx x(n) - q_2 ,$$

$$- q_2 - q_1 \approx q_3 - q_2 ,$$

$$- q_1 - x(1) \approx x(n) - q_3 .$$


- A distribuição dos dados é dita **assimétrica à direita** se as diferenças entre os quantis situados a direita da mediana e a mediana são maiores que as diferenças entre a mediana e os quantis situados à esquerda da mediana. Se o contrário ocorre, dizemos que a distribuição é **assimétrica à esquerda**.
- Além disso, se uma distribuição é aproximadamente simétrica,
 - $q_2 - x_{(i)} \approx x_{(n+1-i)} - q_2$, $i = 1, \dots, \lfloor (n+1)/2 \rfloor$, em que $\lfloor y \rfloor$ é o maior inteiro menor ou igual a y .
- Assim, defina $u_i = q_2 - x_{(i)}$ e $v_i = x_{(n+1-i)} - q_2$, para $i = 1, \dots, \lfloor (n+1)/2 \rfloor$. Então,

$$- \text{Se a distribuição é simétrica, espera-se que } u_i \approx v_i ;$$

$$- \text{Se a distribuição é assimétrica à direita, espera-se que } u_i \leq v_i ;$$

- Se a distribuição é assimétrica à esquerda, espera-se que $u_i \geq v_i$.
- Uma forma de fazer essa avaliação é fazer um gráfico dos pares (u_i, v_i) .

```
tibble(u = 100.6522 - sort(filmes_pixar$duracao)[1:5],
       v = sort(filmes_pixar$duracao,decreasing=TRUE)[1:5] - 100.6522) %>%
  ggplot() + theme_bw() +
  geom_point(aes(x=u,y=v)) +
  geom_line(aes(x=u,y=u))
```



6.7 Medidas de assimetria

Outra forma de avaliar e descrever a simetria (ou a falta dela) são com medidas específicas de assimetria, que descrevem a inclinação ou formato da distribuição.

6.7.1 Coeficiente de Assimetria de Bowley

O coeficiente de assimetria de Bowley usa os quartis para medir a assimetria.

$$B = \frac{(q_3 - q_2) - (q_2 - q_1)}{q_3 - q_1} = \frac{(q_3 - q_2) - (q_2 - q_1)}{(q_3 - q_2) + (q_2 - q_1)} = \frac{q_3 + q_1 - 2q_2}{q_3 - q_1}$$

Onde: - q_1 : primeiro quartil - q_2 : mediana - q_3 : terceiro quartil

Se o resultado for um valor próximo de 0, a distribuição é simétrica; se for maior que zero, a distribuição é assimétrica à direita; e, se for menor que zero, é assimétrica à esquerda.

6.7.2 Coeficiente de Assimetria de Pearson 1

O coeficiente de assimetria de Pearson 1 compara a média com a moda e é útil quando a moda é bem definida.

$$Sk_1 = \frac{\bar{x} - moda(x)}{\sqrt{\frac{n}{n-1}} dp(x)}$$

Onde: - \bar{x} é a média amostral - $moda(x)$ é a moda da amostra - n : tamanho da amostra - $dp(x)$: desvio padrão

Se o resultado for um valor próximo de 0, a distribuição é simétrica; se for maior que zero, a distribuição é assimétrica à direita; e, se for menor que zero, é assimétrica à esquerda.

6.7.3 Coeficiente de Assimetria de Pearson 2

O coeficiente de Assimetria de Pearson 2 é mais estável que o 1, uma vez que compara a média com a mediana ($md(x)$).

$$Sk_2 = 3 \cdot \frac{\bar{x} - md(x)}{\sqrt{\frac{n}{n-1}} dp(x)}$$

Se o resultado for um valor próximo de 0, a distribuição é simétrica; se for maior que zero, a distribuição é assimétrica à direita; e, se for menor que zero, é assimétrica à esquerda.

6.7.4 Coeficiente de Assimetria de Fisher-Pearson

- Considere o **k -ésimo momento (central) amostral**, definido por

$$m_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^k$$

A fórmula do coeficiente de Assimetria de Fisher-Pearson é:

$$g_1 = \frac{m_3}{m_2^{3/2}}$$

Onde: - m_3 : terceiro momento central - m_2 : segundo momento central (variância)

Se o resultado for um valor próximo de 0, a distribuição é simétrica; se for maior que zero, a distribuição é assimétrica à direita; e, se for menor que zero, é assimétrica à esquerda.

6.7.5 Coeficiente de Assimetria de Fisher-Pearson ajustado

O coeficiente de Assimetria de Fisher-Pearson ajustado tenta corrigir o viés do estimador de Fisher-Pearson em amostras pequenas.

$$g_2 = \frac{n\sqrt{n(n-1)}}{n-1}g_1$$

Se o resultado for um valor próximo de 0, a distribuição é simétrica; se for maior que zero, a distribuição é assimétrica à direita; e, se for menor que zero, é assimétrica à esquerda.

6.8 Função de distribuição empírica (FDE)

Seja x_1, x_2, \dots, x_n valores observados de uma amostra. A função de distribuição empírica é definida como:

$$\tilde{F}(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{I}(x_i \leq x)$$

Onde,

$$\mathbb{I}_A(x) = I(x \in A) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \in A \\ 0, & \text{se } x \notin A \end{cases}$$

Ou seja, para qualquer valor de x , $\tilde{F}(x)$ nos diz a proporção de dados que é menor ou igual a x , obtendo uma estimativa empírica da função de distribuição acumulada verdadeira $F(x)$.

Exemplo:

Suponha a amostra $\{3, 5, 2, 4, 3, 2, 5, 1, 4, 2\}$, para calcular a sua função empírica vamos primeiro reordenar os valores: $\{1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5\}$

Calculando a FDE:


x	FDE
1	0.1
2	0.4
3	0.6
4	0.8
5	1.0

Representação gráfica

```
amostra <- c(3, 5, 2, 4, 3, 2, 5, 1, 4, 2)

# Criar a função de distribuição empírica
fde <- ecdf(amostra)

# Plotar a FDE
plot(fde, verticals = TRUE, do.points = TRUE, pch = 16,
     main = "Função de Distribuição Empírica",
     xlab = "x", ylab = "F_n(x)",
     col = "black")
```



6.9 Exercícios

1. Quinze pacientes de uma clínica de ortopedia foram entrevistados quanto ao *número de meses previstos de fisioterapia*, se há *expectativa de sequelas* (S) ou não (N) após o tratamento e o *graus de complexidade da cirurgia* realizada: alto (A), médio (M), ou baixo (B). Os dados estão apresentados na tabela a seguir.

Paciente	Fisioterapia (em meses)	Sequelas	Cirurgia
1	7	S	A
2	8	S	M
3	5	N	A
4	6	N	M
5	4	N	M
6	5	S	B
7	7	S	A
8	7	N	M
9	6	N	B
10	8	S	M
11	6	S	B
12	5	N	B
13	5	S	M
14	4	N	M
15	5	N	A

- (a) Classifique cada uma das variáveis.
- (b) Para cada variável, construa a tabela de frequência e faça uma representação gráfica.
- (c) Para o grupo de pacientes que não ficaram com sequelas, faça um gráfico de barras para a variável Fisioterapia. Você acha que essa variável se comporta de modo diferente nesse grupo quando comparado com a amostra total?

Obs.: Para o item (b) e (c) faça à mão e depois repita o exercício no R.

2. Usando o banco de dados do R *mtcars*, analise as características dos carros com motor de 6 cilindros versus os de motor de 8 cilindros. Para isso, calcule a média e o desvio padrão da potência do motor (hp) para os carros onde a variável vs (motor V/S) é igual a 0 (motor de 6 cilindros) e igual a 1 (motor de 8 cilindros). A partir disso, crie um histograma.
3. Usando os dados e os calculos feitos no *exercício 2* do *capítulo 5*, construa a mão um boxplot.

4. Considere a amostra $\{3, 7, 4, 2, 7\}$
 - a) Organize os dados em ordem crescente.
 - b) Construa a tabela da FDE $\tilde{F}(x)$, para todos os valores de x da amostra.
 - c) Faça o gráfico da FDE calculada acima.

Chapter 7

Medidas de duas variáveis

Considere que o interesse agora é estudar a relação entre variáveis. Se não há associação entre duas ou mais variáveis, dizemos que elas são independentes.

Exemplo: suponha que deseja-se estudar se a cor da roupa (1: clara, 0: escura) está associado com gostar de basquete (1: sim, 0: não). Perguntei para 10 alunos da turma e os dados estão apresentados abaixo

```
dados_cap7 <- tibble(Camisa=c(1,1,1,1,1,0,0,0,0,0),  
                     Basquete=c(1,0,1,0,1,0,0,0,1,0))
```

7.1 Tabela de Contingência (de Frequências)

- Para variáveis categóricas, vamos primeiramente considerar tabelas de frequências.

```
# R base  
tab1 <- table(dados_cap7$Camisa,dados_cap7$Basquete)  
tab1
```

```
##  
##      0 1  
##      0 4 1  
##      1 2 3
```

- Lembre-se que podemos pensar em independência com relação à distribuição conjunta ou à distribuição condicional.

	Basquete		Total
	0	1	
Camisa			
0	4 (40%)	1 (10%)	5 (50%)
1	2 (20%)	3 (30%)	5 (50%)
Total	6 (60%)	4 (40%)	10 (100%)

	Basquete		Total
	0	1	
Camisa			
0	4 (80%)	1 (20%)	5 (100%)
1	2 (40%)	3 (60%)	5 (100%)
Total	6 (60%)	4 (40%)	10 (100%)

- Se o objetivo é estudar a distribuição conjunta, podemos considerar as frequências relativas ao tamanho total da amostra observada.

```
# Tidyverse
require(gtsummary)
dados_cap7 %>% tbl_cross(Camisa,Basquete,percent = "cell") %>%
  bold_labels()
```

- Se o objetivo é estudar a distribuição condicional, podemos considerar as frequências relativas ao total das linhas ou das colunas. Pelo desenho de nosso estudo, eu fixei o total de cada cor da camisa, então a tabela abaixo é construída com relação ao total das linhas.

```
# Tidyverse com porcentagens das linhas
dados_cap7 %>% tbl_cross(Camisa,Basquete,percent = "row") %>%
  bold_labels()
```

7.2 Correlação amostral

- Podemos estimar a $E[xY]$ como $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i$.

- Assim, a $COV(X, Y)$ pode ser estimada por $cov = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i - \bar{x} \bar{y}$.
- Analogamente, a correção amostral é

$$cor = \frac{cov}{\sqrt{var(x)var(y)}} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{j=1}^n (y_j - \bar{y})^2}} .$$

- No exemplo:

```
cor(dados_cap7$Camisa, dados_cap7$Basquete)
```

```
## [1] 0.4082483
```

7.3 Qui-Quadrado de Pearson

- Sejam o_{ij} as frequências observadas na i -ésima linha e j -ésima coluna da tabela, $o_{i.}$ o total observado na linha i e $o_{.j}$ o total observado na coluna j . Sob a hipótese de independência, espera que o valor observado em cada casela da tabela seja $e_{ij} = \frac{o_{i.} o_{.j}}{n}$.
- A estatística de Qui-Quadrado é dada por:

$$Q^2 = \sum_i \sum_j \frac{(o_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}} .$$

- No exemplo:

```
chi2 = chisq.test(tab1)$statistic
chi2
```

```
## X-squared
## 0.4166667
```

	Basquete		Total
	0	1	
Camisa			
0	4 (40%)	1 (10%)	5 (50%)
1	2 (20%)	3 (30%)	5 (50%)
Total	6 (60%)	4 (40%)	10 (100%)

7.4 Medidas de Associação baseadas no Qui-Quadrado

```
require(gtsummary)
dados_cap7 %>% tbl_cross(Camisa, Basquete, percent = "cell") %>%
  bold_labels()
```

7.4.1 Coeficiente de Contingência de Pearson

$$C = \sqrt{\frac{Q^2}{Q^2 + n}} \quad 0 \leq C \leq 1$$

No exemplo:

$$C = \sqrt{\frac{\frac{10}{6}}{\frac{10}{6} + 10}} = 0.791$$

O Coeficiente de Contingência de Pearson é muito influenciado pelo número de linhas (l) e número de colunas (c).

7.4.2 Coeficiente de Tschupov

$$T = \sqrt{\frac{Q^2/n}{(l-1)(c-1)}} \quad 0 \leq T \leq 1$$

No exemplo:

$$T = \sqrt{\frac{\frac{1.66}{10}}{(2-1)(2-1)}} = 0.41$$

7.5 Outras Medidas de Associação

- Considere um contexto em que deseja-se avaliar a presença de um desfecho (ter um determinado câncer, gostar de basquete, etc) na presença de um fator de risco (fumar, usar roupa clara).

```
require(kableExtra)
tibble('Fator de Risco' = c("Não", "Sim"),
       'Sem o Desfecho' = c("(1-q)", "(1-p)"),
       'Com o Desfecho' = c("q", "p")) %>%
  kbl(align = 'c', format = "html", booktabs = TRUE)%>%
  kable_styling(
    bootstrap_options = c("striped", "hover", "bordered", "condensed"),
    latex_options = c("striped"))
```

Fator de Risco

Sem o Desfecho

Com o Desfecho

Não

(1-q)

q

Sim

(1-p)

p

7.5.1 Risco Atribuível

- $RA = p - q$: é a diferença entre as probabilidades de ter a doença dado a presença do fator de risco e de ter a doença sem fator de risco.
- No exemplo:

$$RA = \frac{3}{5} - \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$$

7.5.2 Risco Relativo

- $RR = p/q$: é quantas vezes é mais provável ter a doença tendo o fator de risco em relação a quem não tem.

- No exemplo:

$$RR = \frac{3/5}{1/5} = 3$$

7.5.3 Razão de Chances (“Odds Ratio”)

- Os termos probabilidade e chance são sinônimos mas, por convenção, usaremos a notação $3 : 2$ “=” $\frac{3}{5}$, sendo que $3 : 2 = \frac{3/5}{2/5}$ denotará a chance e $\frac{3}{5}$ a probabilidade.

$$OR = \frac{p}{(1-p)} \div \frac{q}{(1-q)} = \frac{p(1-q)}{q(1-p)}$$

- No exemplo:

$$OR = \frac{3/5}{2/5} \div \frac{1/5}{4/5} = \frac{3}{2} \div \frac{1}{4} = \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{1} = 6$$

7.6 Medidas para Testes de Diagnóstico

Considere um teste para uma determinada doença, de modo que o resultado do teste pode ser 1: *Positivo* e 0: *Negativo* e o indivíduos podem estar 1: *Doente* ou 0: *Não Doente*.

```
require(gtsummary)

dados <- tibble(Teste = c(1,1,1,1,1,0,0,0,0,0),
                 Doente = c(1,0,1,0,1,0,0,0,1,0))

dados %>% tbl_cross(Teste, Doente, percent = "cell") %>%
  bold_labels()
```

As medidas a seguir são bastante utilizadas no contexto de testes de diagnósticos:

	Doente		Total
	0	1	
Teste			
0	4 (40%)	1 (10%)	5 (50%)
1	2 (20%)	3 (30%)	5 (50%)
Total	6 (60%)	4 (40%)	10 (100%)

7.6.1 Sensibilidade

$$S = P(\text{Teste} = 1 \mid \text{Doente} = 1)$$

$$\text{* estimativa: } s = \frac{o_{22}}{o_{\bullet 2}}$$

$$\text{* no exemplo: } s = \frac{3}{4}$$

7.6.2 Especificidade

$$E = P(\text{Teste} = 0 \mid \text{Doente} = 0)$$

$$\text{- estimativa: } e = \frac{o_{11}}{o_{\bullet 1}}$$

$$\text{- no exemplo: } e = \frac{4}{6}$$

7.6.3 Falso Positivo

$$FP = P(\text{Teste} = 1 \mid \text{Doente} = 0)$$

$$\text{- estimativa: } fp = \frac{o_{21}}{o_{\bullet 1}}$$

$$\text{- no exemplo: } fp = \frac{2}{6}$$

7.6.4 Falso Negativo

$$FN = P(\text{Teste} = 0 \mid \text{Doente} = 1)$$

$$\text{- estimativa: } fn = \frac{o_{12}}{o_{\bullet 2}}$$

$$\text{- no exemplo: } fn = \frac{1}{4}$$

7.6.5 Valor Preditivo Positivo

$$VPP = P(\text{Doente} = 1 \mid \text{Teste} = 1)$$

$$\text{- estimativa: } vpp = \frac{o_{22}}{o_{2\bullet}}$$

$$\text{- no exemplo: } vpp = \frac{3}{5}$$

7.6.6 Valor Preditivo Negativo

$$VPN = P(\text{Doente} = 0 \mid \text{Teste} = 0)$$

$$\text{- estimativa: } vpn = \frac{o_{11}}{o_{1\bullet}}$$

$$\text{- no exemplo: } vpn = \frac{4}{5}$$

7.6.7 Acurácia

$$AC = P[(\text{Teste} = 0, \text{Doente} = 0) \cup (\text{Teste} = 1, \text{Doente} = 1)] \text{ - estimativa: } ac = \frac{o_{11} + o_{22}}{n}$$

$$\text{- no exemplo: } ac = \frac{3 + 4}{10} = \frac{7}{10}$$

7.7 Exercícios

1. Um novo teste está sendo desenvolvido para a identificação do HIV. Das 200 pessoas estudadas, metade tem HIV e a outra metade não tem. O teste deu positivo para 75 pessoas e negativo para 125, sendo 25 falsos-positivos e 50 falsos-negativos.
 - (a) Construa uma tabela de dupla entrada com as informações do enunciado
 - (b) Encontre as medidas de sensibilidade e especificidade do teste.
 - (c) Calcule os valores preditivos positivo e negativo.
 - (d) Qual é a acurácia do teste?

Chapter 8

Respostas dos exercícios

8.1 Capítulo 3

- Exercício 1

```
vetor1 <- c(10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)
vetor2 <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

soma <- vetor1 + vetor2
subtracao <- vetor1 - vetor2
multiplicacao <- vetor1 * vetor2
```

- Exercício 2

```
matriz1 <- matrix(1:4, nrow = 2, ncol = 2)
matriz2 <- matrix(5:8, nrow = 2, ncol = 2)

soma <- matriz1 + matriz2
subtracao <- matriz1 - matriz2
multiplicacao <- matriz1 %% matriz2
```

- Exercício 3

```
alunos <- data.frame(
  Nome = c("Letícia", "Mariana", "Ana", "Otávio", "Ricardo"),
  Idade = c(17, 18, 16, 17, 19),
  Nota = c(8.5, 6.2, 4.3, 2.0, 5.5)
)

alunos$Aprovado <- alunos$Nota >= 6
print(alunos)
```

```
##      Nome Idade Nota Aprovado
## 1 Letícia    17  8.5      TRUE
## 2 Mariana    18  6.2      TRUE
## 3      Ana    16  4.3     FALSE
## 4 Otávio     17  2.0     FALSE
## 5 Ricardo    19  5.5     FALSE
```

• Exercício 4

```
exponencial <- function(M, b=exp(1)) {
  lc <- dim(M) # vetor com número de linhas e colunas de M
  E <- M # inicializa a matriz E que será retornada pela função
  i <- 1 # Inicializa i que irá percorrer as linhas
  while(i<=lc[1]){
    j <- 1 # inicializa j que irá percorrer as colunas
    while(j<=lc[2]){
      E[i,j] <- b^M[i,j] # calcula os elementos da matriz E
      j <- j + 1 # atualiza j
    }
    i <- i + 1 # atualiza i
  }
  return(E)
}

# Testa a função 'exponencial'
M
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]    1    2    3
## [2,]    0    1    4
## [3,]    0    0    1
```

```
exponencial(M,2)
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]    2    4    8
## [2,]    1    2   16
## [3,]    1    1    2
```

```
exponencial(M)
```

```
##      [,1]      [,2]      [,3]
## [1,] 2.718282 7.389056 20.085537
## [2,] 1.000000 2.718282 54.598150
## [3,] 1.000000 1.000000  2.718282
```

- Exercício 5

```
calcula_area <- function(base, altura) {
  return((base * altura) / 2)
}
```

```
# Testa a função 'calcula_area'
calcula_area(15, 3)
```

```
## [1] 22.5
```

- Exercício 6

```
conta_pos_neg <- function(vetor) {
  pos <- sum(vetor > 0)
  neg <- sum(vetor < 0)
  return(list(positivos = pos, negativos = neg))
}
```

```
# Testa a função 'conta_pos_neg'
vetor <- c(-10, 7, 4, -8, -15, 3, -5, 7, 0, 1, -2)
resultado <- conta_pos_neg(vetor)
print(resultado)
```

```
## $positivos
## [1] 5
##
## $negativos
## [1] 5
```

8.2 Capítulo 4

- Exercício 1

```
library(tidyverse) # Carregue o pacote

mtcars %>%
  filter(cyl == 6) %>% # Item a
  select(mpg, hp, wt) %>% # Item b
  arrange(desc(mpg)) # Item c
```

```
##           mpg  hp   wt
## Hornet 4 Drive 21.4 110 3.215
## Mazda RX4     21.0 110 2.620
## Mazda RX4 Wag 21.0 110 2.875
## Ferrari Dino  19.7 175 2.770
## Merc 280      19.2 123 3.440
## Valiant       18.1 105 3.460
## Merc 280C     17.8 123 3.440
```

- Exercício 2

```
library(stringr)

nomes <- c("Mariana Silva", "Mateus Souza", "Letícia Dias", "Guilherme Almeida",
           "Yasmin Santos")

# Separando o nome e sobrenome
nomes_sobrenomes <- str_split(nomes, " ")

print(nomes_sobrenomes)
```

```
## [[1]]
## [1] "Mariana" "Silva"
##
## [[2]]
## [1] "Mateus" "Souza"
##
## [[3]]
## [1] "Letícia" "Dias"
##
## [[4]]
## [1] "Guilherme" "Almeida"
##
```



```
## [[5]]
## [1] "Yasmin" "Santos"
```

- Exercício 3:

```
library(forcats)

# Criando o fator
cores <- factor(c("rosa", "vermelho", "azul", "amarelo", "rosa", "verde", "azul", "rosa"))

# (a) Reordenar os níveis para que a cor mais frequente venha primeiro
cores_reordenadas <- fct_infreq(cores)
levels(cores_reordenadas)

## [1] "rosa"      "azul"      "amarelo"   "verde"     "vermelho"

# (b) Agrupar todas as cores menos frequentes que "azul" em "Outro"
cores_agrupadas <- fct_lump(cores, n = 2, other_level = "Outro")
table(cores_agrupadas)

## cores_agrupadas
## azul  rosa Outro
##    2    3    3
```

8.3 Capítulo 5

- Exercício 1:

Dada uma amostra de tamanho n , x_1, \dots, x_n , queremos mostrar que

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = 0$$

Onde \bar{x} é a *média amostral*, dada por

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Primeiro, vamos expandir a soma

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = \sum_{i=1}^n x_i - \sum_{i=1}^n \bar{x}$$

Como \bar{x} é uma constante, ou seja, não depende de i , podemos reescrever:

$$\sum_{i=1}^n \bar{x} = n\bar{x}$$

Mas pela definição de média amostral:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \Rightarrow n\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n nx_i = \sum_{i=1}^n x_i$$

Logo,

$$\sum_{i=1}^n x_i - \sum_{i=1}^n x_i = 0 \blacksquare$$

- **Exercício 2**
- Média:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\bar{x} = \frac{(1 \times 3) + (2 \times 11) + (3 \times 16) + (4 \times 9) + (5 \times 6) + (6 \times 1) + (7 \times 2) + (8 \times 1) + (15 \times 1)}{50}$$

$$\bar{x} = \frac{182}{50} = 3,64$$

- Moda: 3
- Mediana:

$$\frac{x_{25} + x_{26}}{2} = \frac{3 + 3}{2} = 3$$

- Quartis $q(0, 25) = x_{13} = 2$ e $q(0, 75) = x_{38} = 4$

8.4 Capítulo 6

- Exercício 1:

Item (a)

- Fisioterapia: variável qualitativa discreta.
- Sequelas: variável qualitativa nominal.
- Cirurgia: variável qualitativa ordinal.

Item (b)

```
tab_fisio <- read.csv("tab_fisio.csv")
```


- Para *Fisioterapia (em meses)*:

```
freq_fisio <- tab_fisio %>%
  count(`Fisioterapia (em meses)`) %>%
  mutate(
    FreqRel = round(n / sum(n), 2)
  ) %>%
  rename(Frequencia = n)

print(freq_fisio)
```

```
## # A tibble: 5 x 3
##   'Fisioterapia (em meses)' Frequencia FreqRel
##               <dbl>         <int>    <dbl>
## 1                   4             2    0.13
## 2                   5             5    0.33
## 3                   6             3    0.2
## 4                   7             3    0.2
## 5                   8             2    0.13
```

```
ggplot(tab_fisio, aes(x = factor(`Fisioterapia (em meses)`))) +
  geom_bar(fill = "deeppink", color = "black") +
  labs(x = "Meses de Fisioterapia", y = "Frequência") +
  theme_minimal()
```




- Para *Sequelas*:

```
freq_sequelas <- tab_fisio %>%
  count(Sequelas) %>%
  mutate(
    FreqRel = round(n / sum(n), 2)
  ) %>%
  rename(Frequencia = n)

print(freq_sequelas)
```

```
## # A tibble: 2 x 3
##   Sequelas Frequencia FreqRel
##   <chr>      <int>     <dbl>
## 1 N          8      0.53
## 2 S          7      0.47
```

```
ggplot(tab_fisio, aes(x = Sequelas)) +
  geom_bar(fill = "deeppink", color = "black") +
  labs(x = "Expectativa de Sequelas", y = "Frequência") +
  theme_minimal()
```




- Para *Cirurgia*:

```
freq_cirurgia <- tab_fisio %>%
  count(Cirurgia) %>%
  mutate(
    FreqRel = round(n / sum(n), 2)
  ) %>%
  rename(Frequencia = n)

print(freq_cirurgia)
```


```
## # A tibble: 3 x 3
##   Cirurgia Frequencia FreqRel
##   <chr>      <int>    <dbl>
## 1 A         4      0.27
## 2 B         4      0.27
## 3 M         7      0.47
```

```
ggplot(tab_fisio, aes(x = Cirurgia)) +
  geom_bar(fill = "deeppink", color = "black") +
  labs(x = "Grau de Complexidade da Cirurgia", y = "Frequência") +
  theme_minimal()
```



Item (c)

```
n_sequelas <- tab_fisio %>%  
  filter(Sequelas == "N")  
  
ggplot(n_sequelas, aes(x = factor(`Fisioterapia (em meses)`))) +  
  geom_bar(fill = "deeppink", color = "black") +  
  labs(  
    title = "Distribuição dos Meses de Fisioterapia (Pacientes sem Sequelas)",  
    x = "Meses de Fisioterapia",  
    y = "Frequência"  
  ) +  
  theme_minimal()
```



- Exercício 2:


```
mtcars %>% filter(vs==0) %>% summarise(media = mean(hp), dp = sd(hp))
```

```
##      media      dp  
## 1 189.7222 60.2815
```


```
mtcars %>% filter(vs==1) %>% summarise(media = mean(hp), dp = sd(hp))
```

```
##      media      dp  
## 1 91.35714 24.42447
```


```
hist(  
  mtcars$hp[mtcars$vs == 0],  
  main = "Histograma de HP (vs == 0)",  
  xlab = "HP",  
  col = "pink",  
  border = "white"  
)
```



```
hist(  
  mtcars$hp[mtcars$vs == 1],  
  main = "Histograma de HP (vs == 1)",  
  xlab = "HP",  
  col = "pink",  
  border = "white"  
)
```

• Exercício 3



• Exercício 4

item (a)
 $\{2, 3, 4, 7, 7\}$

item (b)


x	FDE
2	0.2
3	0.4
4	0.6
7	1.0

item (c)

```
dados <- c(3, 7, 4, 2, 7)

fde <- ecdf(dados)

plot(fde, main = "Função de Distribuição Empírica (FDE)",
     xlab = "x", ylab = "F_n(x)", verticals = TRUE, do.points = TRUE, pch = 19)
```



	Doença		Total
	Doente	Não Doente	
Teste			
Negativo	50 (25%)	75 (38%)	125 (63%)
Positivo	50 (25%)	25 (13%)	75 (38%)
Total	100 (50%)	100 (50%)	200 (100%)

8.5 Capítulo 7

- Exercício 1

Primeiro, interpretando o exercício:

Das 200 pessoas estudadas, 100 pacientes são doentes e 100 não são doentes. No teste, dos 75 resultados positivos, 25 são falsos-positivos, ou seja, temos 50 pacientes *positivados e com HIV*. Já dos 125 resultados negativos, 50 são falsos-negativos, ou seja, temos 75 pacientes *negativados e sem HIV*.

item (a)

```
library(dplyr)
library(gtsummary)

# Criar os dados com data.frame()
dados_hiv <- data.frame(
  Teste = c(rep("Positivo", 75), rep("Negativo", 125)),
  Doenca = c(
    rep("Doente", 50),      # verdadeiros positivos
    rep("Não Doente", 25),  # falsos positivos
    rep("Doente", 50),      # falsos negativos
    rep("Não Doente", 75)   # verdadeiros negativos
  )
)

dados_hiv %>%
  tbl_cross(
    row = Teste,
    col = Doenca,
    percent = "cell"
  ) %>%
  bold_labels()
```

item (b)

Seja: *vp*: verdadeiro positivo (tem HIV e teste foi positivo) *fp*: falso positivo (não tem HIV, mas teste deu positivo) *fn*: falso negativo (tem HIV, mas teste deu negativo) *vn*: verdadeiro negativo (não tem HIV e teste deu negativo)

Sensibilidade: a probabilidade do teste dar positivo, dado que a pessoa está doente.

$$S = \frac{vp}{vp + fn} = \frac{50}{50 + 50} = 0,5$$

Especificidade: a probabilidade do teste dar negativo, dado que a pessoa não está doente.

$$E = \frac{vn}{vn + fp} = \frac{75}{75 + 25} = 0,75$$

Item (c)

Valor Preditivo Positivo: a probabilidade da pessoa estar doente, dado que o teste deu positivo.

$$VPP = \frac{vp}{vp + fp} = \frac{50}{50 + 25} \approx 0,67$$

Valor Preditivo Negativo: a probabilidade da ausência de doença quando o teste deu negativo.

$$VPN = \frac{vn}{vn + fn} = \frac{75}{75 + 50} = 0,6$$

item (d)

A *acúracia* é a probabilidade do teste fornecer resultados corretos, ou seja, ser positivo nos doentes e negativo nos não doentes.

$$AC = \frac{vp + vn}{\text{total}} = \frac{50 + 75}{200} = 0,625$$

Chapter 9

Regressão linear (incompleto)

A regressão linear modela a relação entre duas variáveis quantitativas, onde uma variável é considerada dependente e a outra é independente. O objetivo principal é estabelecer uma equação linear que descreva como a variável dependente (Y) se comporta em função da variável independente.


A equação da regressão linear simples é $Y = a + bX + \varepsilon$.

Onde: - Y é a variável resposta (dependente) - X é a variável explicativa (independente) - a é o intercepto (valor de Y quando $X = 0$) - b é o coeficiente angular (indica a variação de Y para cada unidade de X) - ε é um erro aleatório.

Suponha que temos interesse em estudar o valor esperado do peso de uma pessoa (Y , em kg), com base em sua altura (X , em cm). Para isso, coletamos dados de várias pessoas e ajustamos um modelo de regressão linear.

```
## Warning: Using 'size' aesthetic for lines was deprecated in ggplot2 3.4.0.  
## i Please use 'linewidth' instead.  
## This warning is displayed once every 8 hours.  
## Call 'lifecycle::last_lifecycle_warnings()' to see where this warning was  
## generated.
```

```
## 'geom_smooth()' using formula = 'y ~ x'
```



Y : Variável resposta (dependente) X : Variável explicativa (independente)

Com isso, temos que,

$$E[Y | X = x] = a + bx$$

Agora, para conseguir estimar esse valor esperado do peso de uma pessoa, com base em sua altura, precisamos obter o valor a e b .

9.1 Estimar a e b

Para estimar os coeficientes usamos o método dos mínimos quadrados

$$S = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - (a + bx_i))^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - a - bx_i)^2$$

$$\begin{cases} \frac{\partial S(a,b)}{\partial a} = 0 \\ \frac{\partial S(a,b)}{\partial b} = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \frac{\partial S(a,b)}{\partial a} = -\sum_{i=1}^n 2(y_i - a - bx_i) = 0 \\ \frac{\partial S(a,b)}{\partial b} = -\sum_{i=1}^n x_i \cdot 2(y_i - a - bx_i) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow -\sum_{i=1}^n y_i + na + b \sum_{i=1}^n x_i &= 0 \Rightarrow a = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} - b \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \\ &\Rightarrow a = \bar{y} - b\bar{x}\end{aligned}$$