

mizhtam

Thời gian phiên:

23 thg 3 – 7 thg 4, 2026 (15 ngày)

Thông tin người dùng

Tên người dùng: mizhtam

Giới tính: Nữ

Tuổi: 19

Chiều cao: 158 cm

Cân nặng: 45 kg

Thông tin thiết bị

Sử dụng thiết bị: 100%

SN: B4893120C1C0

Mẫu thiết bị: M8

Tóm tắt

Trung bình:

(Mục tiêu: <8.5 mmol/L)

7.9 mmol/L

CV:

(Mục tiêu: <33%)

36.7 %

eHbA1c:

(Mục tiêu: <7.0%)

6.6 %

T1TR:

(3.9 – 7.8 mmol/L)

53.8 %

TAR:

(Mục tiêu: <25%)

21.9 %

TIR:

(Mục tiêu: >70%)


75.2 %

TBR:

(Mục tiêu: <4%)

2.9 %

Thời gian trong phạm vi



Rất cao: 15 giờ 40 phút (>13.9 mmol/L)

Cao: 2 ngày 14 giờ 55 phút (10.1 – 13.9 mmol/L)

Phạm vi mục tiêu: 11 ngày 7 giờ 5 phút (3.9 – 10 mmol/L)

Thấp: 9 giờ 15 phút (3 – 3.8 mmol/L)

Rất thấp: 1 giờ 5 phút (<3 mmol/L)

Trung bình – Đường huyết trung bình – hiển thị đường huyết trung bình cho khoảng thời gian được chọn.

Sự kiện hạ/tăng đường huyết – Hiển thị phân bố các sự kiện đường huyết thấp (đỏ) và cao (vàng) theo nhiều khoảng thời gian, bao gồm số lượng sự kiện và thời gian trung bình của chúng như thể hiện trong biểu đồ.

CV – Hệ số biến thiên – tỷ lệ giữa độ lệch chuẩn của đường huyết và trung bình, giá trị càng thấp thì dao động càng ít.

eHbA1c – eHbA1c ước tính – Ước tính mức đường huyết trung bình của bạn theo thời gian, được tính từ dữ liệu CGM. Mục đề nghị: dưới 7%.

T1TR – Thời gian trong phạm vi chặt hẹp (T1TR) – là thời gian trong ngày khi đường huyết nằm trong phạm vi 3.9 đến 7.8 mmol/L. Đây là phạm vi thời gian chặt hơn so với T1R và phản ánh tốt hơn sinh lý học đường huyết ở một dân số gần như tiêu chuẩn hoặc khỏe mạnh. Có thể sử dụng như một nhóm đối chứng của T1R để tối ưu hóa các chiến lược kiểm soát đường huyết, chẳng hạn như dự đoán chỉ số nguy cơ biến chứng tương lai và đánh giá hiệu quả của các thuốc giảm đường huyết.

Tóm tắt Glucose theo bữa ăn

	Bữa sáng	Bữa trưa
Trước bữa ăn (Mục tiêu:<6.1 mmol/L)	6.7	6.9
Đỉnh sau ăn (Mục tiêu:<7.8 mmol/L)	11.1	10.3
Biên độ dao động đường huyết sau bữa ăn (Mục tiêu:<2.2 mmol/L)	2.1	1.3
1 giờ sau ăn (mmol/L)	8	8.1
2 giờ sau ăn (mmol/L)	8.8	8.2
3 giờ sau ăn (mmol/L)	8.7	8.2

	Bữa tối	Bữa ăn nhẹ
Trước bữa ăn (Mục tiêu:<6.1 mmol/L)	7.4	4.8
Đỉnh sau ăn (Mục tiêu:<7.8 mmol/L)	11	10
Biên độ dao động đường huyết sau bữa ăn (Mục tiêu:<2.2 mmol/L)	1.4	2.2
1 giờ sau ăn (mmol/L)	8.5	6
2 giờ sau ăn (mmol/L)	8.8	7
3 giờ sau ăn (mmol/L)	8.2	7.5

Trước bữa ăn – Hiển thị các chỉ số đường huyết khi một hồ sơ trước bữa ăn đã được ghi lại.

Đỉnh sau ăn – Hiển thị các chỉ số đường huyết đỉnh ba giờ sau bữa ăn.

Biên độ dao động đường huyết sau bữa ăn – Biên độ dao động đường huyết sau bữa ăn là sự chênh lệch giữa giá trị đường huyết 2 giờ sau bữa ăn và giá trị đường huyết trước bữa ăn.

Glucose theo bữa ăn hàng ngày

	Bữa sáng	Bữa trưa
Trung bình	7.0	6.9
23 Th03	--	--
24 Th03	7.3	5.9
25 Th03	12.1	7.7
26 Th03	4.2	6.5
27 Th03	6.7	6.6
28 Th03	6.8	8.6
29 Th03	6.7	3.7
30 Th03	--	8.5
31 Th03	4.5	9.6
01 Th04	8.1	6.8
02 Th04	--	10.0
03 Th04	4.5	7.6
04 Th04	7.5	3.1
05 Th04	--	5.0
06 Th04	8.9	6.3

	Bữa tối	Bữa ăn nhẹ
Trung bình	7.4	4.7
23 Th03	7.5	4.0
24 Th03	10.0	6.3
25 Th03	9.0	4.5
26 Th03	5.3	3.5
27 Th03	9.7	3.8
28 Th03	9.9	4.8
29 Th03	--	5.0
30 Th03	6.0	3.7
31 Th03	7.7	4.4
01 Th04	9.3	--
02 Th04	4.2	--
03 Th04	8.7	5.1
04 Th04	5.1	4.1
05 Th04	3.3	6.4
06 Th04	--	5.0

Trung bình – Hiển thị trung bình của các hồ sơ bữa ăn và insulin cho mỗi khoảng thời gian trong một ngày điển hình.

Trước bữa ăn – Hiển thị các chỉ số đường huyết khi một hồ sơ trước bữa ăn đã được ghi lại.

Đỉnh sau ăn – Hiển thị các chỉ số đường huyết đỉnh ba giờ sau bữa ăn.

Nhật ký hàng ngày

