Álgebra II - Capítulo 1: Espacios Vectoriales - Listado 3

Solución para ejercicios varios

Problema 7. (P) Suponga que $S = \{v_1, \dots, v_n\}$ es un conjunto l.i. de vectores en un \mathbb{K} espacio vectorial V. Decida si los siguientes conjuntos son l.i. Justifique sus respuestas

7.1) $\{v_1-v_2,v_2-v_3,\ldots,v_{n-1}-v_n,v_n-v_1\}$

<u>Solución</u>: El conjunto no es l.i. Esto se puede deducir al escoger escalares todos iguales a 1 en la combinación lineal, obteniéndose una estructura telescópica en la suma.

$$\sum_{i=1}^{n} 1 \cdot (v_i - v_{i+1}) = (v_1 - v_2) + (v_2 - v_3) + \dots + (v_{n-1} - v_n) + (v_n - v_1) = 0$$

7.2) $\{v_1, v_1 + v_2, v_1 + v_2 + v_3, \dots, v_1 + v_2 + \dots + v_{n-1}, v_1 + v_2 + \dots + v_n\}$

<u>Solución</u>: Sí es un conjunto l.i. Siendo $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, se tiene

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 (v_1 + v_2) + \alpha_3 (v_1 + v_2 + v_3) + \dots + \alpha_{n-1} (v_1 + v_2 + \dots + v_{n-1}) + \alpha_n (v_1 + v_2 + \dots + v_n) = 0$$

$$\iff \sum_{i=1}^n \alpha_i v_1 + \sum_{i=2}^n \alpha_i v_2 + \dots + \sum_{i=n-1}^n \alpha_i v_{n-1} + \alpha_n v_n = 0$$

Así, por la lineal independencia de los vectores de S, cada factor escalar en la última ecuación debe ser nulo, y por lo anterior, de manera recursiva, todos los escalares α_i son nulos.

7.3) $S - \{v_i\}$, siendo v_i un elemento cualquiera de S.

Solución: Es un conjunto l.i. En efecto, inicialmente se sabe que, si

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_i v_i + \dots + \alpha_n v_n = 0,$$

entonces cada escalar a_i es nulo. Así, como

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{i-1} v_{i-1} + \alpha_{i+1} v_{i+1} + \dots + \alpha_n v_n = 0$$

$$\iff \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{i-1} v_{i-1} + 0 \cdot v_i + \alpha_{i+1} v_{i+1} + \dots + \alpha_n v_n = 0,$$

se debe cumplir que los restantes escalares α_i son nulos.

Problema 11. Sean U_0, U_1, U_2, \ldots los siguientes subconjuntos del espacio vectorial $\mathcal{F}(\mathbb{R})$,

$$U_0 = \{1\}, \quad \forall j \in \mathbb{N}, \ U_j = \{\sin(2j\pi x), \cos(2j\pi x)\}.$$

11.1) Pruebe que los conjuntos definidos son l.i.

 $\underline{Soluci\'on}$: U_0 es obviamente l.i. Para los restantes, si

$$\alpha \sin(2j\pi x) + \beta \cos(2j\pi x) = 0,$$

evaluando en x=0 se obtiene $\beta=0$, y evaluando en $x=\frac{1}{4j}$ se obtiene $\alpha=0$.

11.2) Demostrar que, dados $h, k \in \mathbb{N}$, el conjunto $U_0 \cup U_h \cup U_k$ es también l.i.

Solución: Para mostrar esto y lo indicado en 11.3 se utilizan los siguientes resultados:

$$\int_0^{2\pi} \sin(mx)\sin(mx)dx = \begin{cases} \pi & \text{si } m = n \\ 0 & \text{si } m \neq n \end{cases}$$
 (1)

$$\int_0^{2\pi} \cos(mx)\cos(nx)dx = \begin{cases} \pi & \text{si } m = n \\ 0 & \text{si } m \neq n \end{cases}$$
 (2)

$$\int_0^{2\pi} \sin(mx)\cos(nx)dx = 0 \tag{3}$$

Para verificar estas integrales, se pueden utilizan las igualdades trigonométricas

$$\cos(mt - nt) - \cos(mt + nt) = 2\sin(mt)\sin(nt),$$

$$\cos(mt - nt) + \cos(mt + nt) = 2\cos(mt)\cos(nt),$$

$$\sin(mt + nt) + \sin(mt - nt) = 2\sin(mt)\cos(nt).$$

Ahora, dados $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5 \in \mathbb{R}$ tales que

$$\alpha_1 + \alpha_2 \sin(2h\pi x) + \alpha_3 \cos(2h\pi x) + \alpha_4 \sin(2k\pi x) + \alpha_5 \sin(2k\pi x) = 0, \tag{4}$$

se puede observar que, al integral la ecuación anterior entre 0 y 2π ,

$$\int_0^{2\pi} \alpha_1 dx = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 2\pi \ \alpha_1 = 0 \Rightarrow \alpha_1 = 0$$

También, multiplicando la ecuación (4) por $\sin(2h\pi x)$ e integrando entre 0 y 2π queda

$$\int_0^{2\pi} \alpha_2 \sin^2(2h\pi x) dx = 0 \iff \pi\alpha_2 = 0 \implies \alpha_2 = 0$$

Replicando esta idea para cada término en (4) se concluye que todos los escalares α_i son nulos.

11.3) Demuestre que para cada $n \in \mathbb{N}$ el conjunto $W_n := \bigcup_{j=0}^n U_j$ es también l.i.

<u>Solución</u>: El mismo argumento utilizado en la parte 11.2) sirve para mostrar esto.

Víctor Burgos Villanueva.

Concepción, 8 de abril de 2017.