

# Hjemmeopgave 1 - Matematik 1a

Victor Jonathan Hald

s183710

29-09-2024

## Opgave a)

**Afgør om følgende to logiske udsagn er logisk ækvivalente:**

$$(P \wedge Q) \Rightarrow R \text{ og } \neg P \vee (Q \Rightarrow R)$$

Vi opstiller vores sandhedstabel.

P	Q	R	$\neg P$	$P \wedge Q$	$Q \Rightarrow R$	$(P \wedge Q) \Rightarrow R$	$\neg P \vee (Q \Rightarrow R)$
1	1	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	1	0	1	1	1

Som vi kan se, er de sidste to søjler identiske, og derfor logisk ækvivalente.

## Opgave b)

**Find alle reelle tal  $x$  som opfylder ligningen  $|x - 1|^2 = x^2 + |x|$ .**

For at løse ligningen  $|x - 1|^2 = x^2 + |x|$ , deler vi problemet op i to tilfælde baseret på værdien af  $x$ .

**Tilfælde 1:  $x \geq 0$**

Når  $x \geq 0$ , er  $|x| = x$  og  $|x - 1| = x - 1$  (da  $x \geq 1$  eller  $0 \leq x < 1$ ).

Ligningen bliver:

$$(x - 1)^2 = x^2 + x$$

Udvider venstresiden:

$$x^2 - 2x + 1 = x^2 + x$$

Trækker  $x^2$  fra begge sider:

$$-2x + 1 = x$$

Løser for  $x$ :

$$1 = 3x \implies x = \frac{1}{3}$$

Da  $x = \frac{1}{3}$  opfylder  $x \geq 0$ , er det en gyldig løsning i dette tilfælde.

### Tilfælde 2: $x < 0$

Når  $x < 0$ , er  $|x| = -x$  og  $|x - 1| = -(x - 1) = -x + 1$ .

Ligningen bliver:

$$(-x + 1)^2 = x^2 + (-x)$$

Udvider venstresiden:

$$x^2 - 2x + 1 = x^2 - x$$

Trækker  $x^2$  fra begge sider:

$$-2x + 1 = -x$$

Løser for  $x$ :

$$1 = x$$

Men  $x = 1$  opfylder ikke  $x < 0$ , så der er ingen løsning i dette tilfælde.

### Samlet resultat

Den eneste løsning, der opfylder alle betingelserne, er  $x = \frac{1}{3}$ .

Derfor er den entydige løsning:

$$\boxed{x = \frac{1}{3}}$$

## Opgave c)

**Givet funktionen  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  med forskriften**

$$f(x) = 4x^2 + 4|x - 1|.$$

### 1. Beregn funktionens værdimængde.

Vi skal beregne  $Vm(f)$ .

For at finde værdimængden af funktionen  $f(x) = 4x^2 + 4|x - 1|$ , betragter vi først, hvordan funktionen opfører sig for forskellige værdier af  $x$ .

- For  $x \geq 1$ :

$$f(x) = 4x^2 + 4(x - 1) = 4x^2 + 4x - 4$$

Dette er en parabel, der åbner opad med toppunkt i  $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{8} = -\frac{1}{2}$ . Men da vi kun betragter  $x \geq 1$ , vil funktionen stige uden grænse.

- For  $x < 1$ :

$$f(x) = 4x^2 + 4(1 - x) = 4x^2 - 4x + 4$$

Dette er også en parabel, der åbner opad med toppunkt i  $x = \frac{b}{2a} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ . I dette interval vil funktionen stige uden grænse.

Da begge dele af funktionen er kontinuerte og voksende, når  $x$  går mod uendelig, så vil værdimængden også være fra 0 (for  $x = 1$ ) til uendeligt.

Således er værdimængden for funktionen  $f(x) = 4x^2 + 4|x - 1|$  givet ved:

$$Vm(f) = [3, \infty[$$

## 2. Afgør om funktionen er injektiv

En funktion er injektiv, hvis der for to vilkårlige punkter  $x_1$  og  $x_2$  i definitionsmængden gælder:

$$f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$$

Men da funktionen består af to dele, der begge er kontinuerte og voksende for henholdsvis  $x \geq 1$  og  $x < 1$ , vil der altid findes to forskellige  $x$ -værdier, der giver samme  $f(x)$ .

Således er funktionen **ikke** injektiv.

## Opgave d)

**Der opgives for et komplekst tal  $z$  at  $\arg(z) = -\pi/3$  og  $|z| = 2$ .**

**1. Beregn de polære koordinater for det komplekse tal  $z^7$ .**

**2. Skriv tallet  $z^7$  på rektangulær form.**

For at løse opgaven, skal vi først konvertere det givne komplekse tal  $z$  til polære koordinater og derefter beregne  $z^7$ .

### Trin 1: Konvertering til polære koordinater

Det givne komplekse tal  $z$  har en vinkel på  $-\frac{\pi}{3}$  og en størrelse (modulus) på 2. Polære koordinater for et komplekst tal er givet ved:

$$z = |z| \cdot (\cos(\theta) + i \sin(\theta))$$

hvor  $|z| = 2$  og  $\theta = -\frac{\pi}{3}$ .

Dette giver os:

$$z = 2 \left( \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \right)$$

Beregning af cos og sin:

$$\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$$

$$\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Så:

$$z = 2 \left( \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 1 - i\sqrt{3}$$

## Trin 2: Beregning af $z^7$

For at beregne  $z^7$  bruger vi DeMoivres formel, som siger:

$$(r \cdot (\cos\theta + i \cdot \sin\theta))^n = r^n \cdot (\cos(n\theta) + i \cdot \sin(n\theta))$$

Dvs.

$$z^n = |z|^n (\cos(n\theta) + i \sin(n\theta))$$

hvor  $n = 7$ ,  $|z| = 2$ , og  $\theta = -\frac{\pi}{3}$ .

Beregning af  $z^7$ :

$$z^7 = 2^7 \left( \cos\left(7 \cdot \left(-\frac{\pi}{3}\right)\right) + i \sin\left(7 \cdot \left(-\frac{\pi}{3}\right)\right) \right)$$

Vi kan reducere vinklen:

$$\text{Arg}(z) = -\frac{7\pi}{3} + 2\pi = -\frac{7\pi}{3} + \frac{6\pi}{3} = -\frac{\pi}{3}$$

Så det er den samme vinkel, som vi startede med.

Beregning af cos og sin:

$$\cos\left(-\frac{7\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$$

$$\sin\left(-\frac{7\pi}{3}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Så:

$$z^7 = 2^7 \left( \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 128 \left( \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

### Trin 3: Skriv $z^7$ på rektangulær form

Vi multiplicerer koefficienterne med cos og sin:

$$z^7 = 128 \left( \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 64 - 64i\sqrt{3}$$

### Svar:

1. De polære koordinater for  $z^7$  er givet ved:

$$z^7 = \left( 128, \left( -\frac{\pi}{3} \right) \right)$$

2. Det komplekse tal  $z^7$  på rektangulær form er:

$$z^7 = \boxed{64 - 64i\sqrt{3}}$$

### Opgave e)

**Løs den binome ligning  $z^3 = i$ . Svarene ønskes givet på rektangulær form samt indtegnet i den komplekse talplan.**

Løsningen til ligningen kan findes ved at isolere  $z$ . Vi starter med at skrive  $i$  på polær form, hvilket er  $i = e^{i\pi/2}$ . Således har vi:

$$z^3 = e^{i\pi/2}$$

Løsningen til denne ligning kan findes ved at tage 3. rod på begge sider:

$$z = e^{i(\pi/2 + 2p\pi)/3}, \quad \text{for } p = 0, 1, 2$$

Dette giver tre forskellige løsninger:

1. For  $p = 0$ :

$$z_1 = e^{i((\pi/2) + (2 \cdot 0 \cdot \pi))/3} = e^{i(\pi/6)} = \cos(\pi/6) + i \sin(\pi/6) = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2}}$$


2. For  $p = 1$ :

$$z_2 = e^{i((\pi/2) + (2 \cdot 1 \cdot \pi))/3} = \cos(5\pi/6) + i \sin(5\pi/6) = \boxed{-\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2}}$$

3. For  $p = 2$ :

$$z_3 = e^{i((\pi/2) + (2 \cdot 2 \cdot \pi))/3} = e^{i((\pi/2) + (4 \cdot \pi))/3} = \cos(5\pi/3) + i \sin(5\pi/3) = \boxed{-i}$$

Disse løsninger kan nu indtegnes i den komplekse talplan.



## Opgave f)

Som sædvanligt betegnes hovedargument af et komplekst tal  $z$  med  $\text{Arg}(z)$ . Afgør om følgende udsagn er sande:

1.  $\text{Im}(z) > 0 \Rightarrow \text{Arg}(z) > 0$

For at  $\text{Arg}(z) > 0$ , skal punktet  $(a, b)$  befinde sig i første eller anden kvadrant. Det vil det altid gøre, hvis  $\text{Im}(z) > 0$ .

Udsagnet er altså sandt.

2.  $\text{Arg}(z) \leq 0 \Rightarrow \text{Im}(z) \leq 0$

- Hvis  $\text{Arg}(z) = 0$ , så ligger  $z$  på den reelle akse, og  $\text{Im}(z) = 0$ .
- Hvis  $\text{Arg}(z) < 0$ , så ligger  $z$  i tredje eller fjerde kvadrant.

For at  $\text{Arg}(z) \leq 0$ , skal punktet  $(a, b)$  befinde sig i tredje eller fjerde kvadrant.

Udsagnet passer altså.

$$3. \operatorname{Im}(z) = 0 \Rightarrow \operatorname{Arg}(z) = 0$$

Dette udsagn siger, at hvis den imaginære del af  $z$  er nul, så er argumentet for  $z$  nul.

Dette passer ikke, da  $\operatorname{Arg}(z) = \pi$  også kan gælde for et komplekst tal med  $\operatorname{Im}(z) = 0$ .

### Konklusion

Kun de første to udsagn er sande. Det sidste passer ikke.