

Alle ugens test spørgsmål

Uge 1: Komplekse tal

Spørgsmål 1: (1)

Givet to komplekse tal $w_1 = 4 + 6 \cdot I$ og $w_2 = 2 - 4 \cdot I$

Udregn længden af nedenstående kvotient.

$$\left| \frac{w_1}{w_2 + 1} \right|$$

Svar:

Længden af et komplekst tal udregnes således:

$$|z| = \sqrt{(Re(z))^2 + (Im(z))^2}$$

Svaret udregnes:

$$\begin{aligned} \left| \frac{w_1}{w_2 + 1} \right| &= \left| \frac{4 + 6 \cdot I}{2 - 4 \cdot I + 1} \right| = \left| \frac{4 + 6 \cdot I}{3 - 4 \cdot I} \right| = \left| \frac{(4 + 6 \cdot I) \cdot (3 + 4 \cdot I)}{(3 - 4 \cdot I) \cdot (3 + 4 \cdot I)} \right| = \left| \frac{12 + 34 \cdot I + 24 \cdot I^2}{9 - 16 \cdot I^2} \right| \\ \left| \frac{-12 + 34 \cdot I}{25} \right| &= \left| -\frac{12}{25} + \frac{34}{25} \cdot I \right| = \sqrt{\left(\frac{12}{25}\right)^2 + \left(\frac{34}{25}\right)^2} = \sqrt{\frac{12^2}{25^2} + \frac{34^2}{25^2}} = \frac{2 \cdot \sqrt{13}}{5} \end{aligned}$$

Spørgsmål 2: (2)

Udregn absolutværdien af det komplekse tal.

$$|2 + 3 \cdot I|$$

Svar:

$$|z| = \sqrt{(Re(z))^2 + (Im(z))^2}$$

$$|2 + 3 \cdot I| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$$

Spørgsmål 3: (3)

Udregn nedenstående brøk mellem to komplekse tal, og angiv svaret på rektangulær form.

$$\frac{4 - 4 \cdot I}{1 - 3 \cdot I}$$

Svar:

Man skal forlænge med nævnerens konjugerede.

$$\frac{4 - 4 \cdot I}{1 - 3 \cdot I} = \frac{(4 - 4 \cdot I) \cdot (1 + 3 \cdot I)}{(1 - 3 \cdot I) \cdot (1 + 3 \cdot I)} = \frac{4 + 8 \cdot I - 12 \cdot I^2}{1 - 9 \cdot I^2} = \frac{16 + 8 \cdot I}{10} = \frac{8 + 4 \cdot I}{5} = \frac{8}{5} + \frac{4}{5} \cdot I$$

Spørgsmål 4: (4)

Løs ligningen $(1 + I) \cdot z = 3$, og angiv svaret på rektangulær form.

Svar:

$$(1 + I) \cdot z = 3 \Leftrightarrow z = \frac{3}{1 + I} = \frac{3 \cdot (1 - I)}{(1 + I) \cdot (1 - I)} = \frac{3 - 3 \cdot I}{1 - I^2} = \frac{3 - 3 \cdot I}{2} = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} \cdot I$$

Spørgsmål 5: (5)

Reducer nedenstående potens af den imaginære enhed i:

$$I^4$$

Svar:

$$I^4 = I^2 \cdot I^2 = -1 \cdot (-1) = 1$$

Spørgsmål 6: (6)

Konjuger tallet $3 + 5 \cdot I$, og angiv svaret på rektangulær form.

Svar:

Fortegnet ændres:

$$\overline{3 + 5 \cdot I} = 3 - 5 \cdot I$$

Spørgsmål 7: (7)

Udregn produktet af de to komplekse tal, og angiv svaret på rektangulær form.

$$(3 \cdot I + 3) \cdot (2 - 4 \cdot I)$$

Svar:

Parenteserne ganges sammen.

$$(3 \cdot I + 3) \cdot (2 - 4 \cdot I) = 6 - 12 \cdot I + 6 \cdot I - 12 \cdot I^2 = 18 - 6 \cdot I$$

Spørgsmål 8: (8)

Udregn summen af de to komplekse tal, og angiv svaret på rektangulær form.

$$(3 \cdot I + 3) + (6 - 2 \cdot I)$$

Svar:

Man kan helt simpelt ophæve parenteserne.

$$(3 \cdot I + 3) + (6 - 2 \cdot I) = 3 \cdot I + 3 + 6 - 2 \cdot I = 9 + I$$

Spørgsmål 9: (9)

Givet to komplekse tal $z_1 = 9 + 1 \cdot I$ og $z_2 = 5 - 3 \cdot I$

Udregn nedenstående differens af de to komplekse tal, og angiv svaret på rektangulær form.

$$z_1 - z_2$$

Svar:

$$z_1 - z_2 = (9 + 1 \cdot I) - (5 - 3 \cdot I) = 9 + I - 5 + 3 \cdot I = 4 + 4 \cdot I$$

Spørgsmål 10: (10)

Lad $z = 1 + 2 \cdot I$ være et komplekst tal.

Løs ligningen $|z|^2 \cdot w + \bar{z} = \operatorname{Re}(z)$, og angiv svaret på rektangulær form.

$$w =$$

Svar:

$$|z|^2 = a^2 + b^2 = 1^2 + 2^2 = 1 + 4 = 5$$

$$\bar{z} = 1 - 2 \cdot I$$

$$\operatorname{Re}(z) = 1$$

$$|z|^2 \cdot w + \bar{z} = \operatorname{Re}(z) \Leftrightarrow 5 \cdot w + 1 - 2 \cdot I = 1 \Leftrightarrow 5 \cdot w = 1 - (1 - 2 \cdot I)$$

$$\Leftrightarrow 5 \cdot w = 2 \cdot I \Leftrightarrow w = \frac{2 \cdot I}{5}$$

Uge 2: Komplekse tal

Spørgsmål 1: (11)

Angiv værdien af n som gør nedenstående ligning sand:

$$\frac{9^6 \cdot \sqrt{9} \cdot 9^{-n}}{9^5} = 9^6$$

Svar:

Forkort brøken.

$$\frac{9^6 \cdot \sqrt{9} \cdot 9^{-n}}{9^5} = 9^6 \Leftrightarrow 9^6 \cdot \sqrt{9} \cdot 9^{-n} = 9^{11} \Leftrightarrow \sqrt{9} \cdot 9^{-n} = 9^5 \Leftrightarrow 9^{-n} = \frac{9^5}{\sqrt{9}} = \frac{9^5}{9^{\frac{1}{2}}} = 9^{5-\frac{1}{2}} = 9^{\frac{9}{2}}$$

$$\Leftrightarrow n = -\frac{9}{2}$$

Spørgsmål 2: (12)

Et komplekst tal z er givet ved nedenstående udtryk:

$$z = 5 \cdot \exp(-2 \cdot \ln(3) + 2 \cdot I)$$

Angiv nedenfor absolutværdien af tallet z :

$$|z| =$$

Svar:

Et tals eksponentielle form ser således ud:

$$z = |z| \cdot e^{iv}$$

Der foretages en omskrivning:

$$z = 5 \cdot \exp(-2 \cdot \ln(3) + 2 \cdot I) = 5 \cdot e^{-2 \cdot \ln(3)} \cdot e^{2 \cdot I}$$

$$5 \cdot e^{-2 \cdot \ln(3)} = 5 \cdot (e^{\ln(3)})^{-2} = 5 \cdot 3^{-2} = 5 \cdot \frac{1}{9} = \frac{5}{9}$$

Spørgsmål 3: (13)

To komplekse tal er givet ved deres eksponentielle form således: $z_1 = 5 \cdot \exp\left(\frac{\pi}{4} \cdot I\right)$ og

$z_2 = 3 \cdot \exp\left(\frac{\pi}{3} \cdot I\right)$. Find den polære form af produktet $z_1 \cdot z_2$, og angiv svaret i de to bokse nedenfor:

$$|z_1 \cdot z_2| =$$

$$\text{Arg}(z_1 \cdot z_2) =$$

Angiv den rektangulære form af tallet:

$$z_1 \cdot z_2 =$$

Svar:

Brug reglerne:

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2| \quad \text{og} \quad \arg(z_1 \cdot z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$$

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2| = 5 \cdot 3 = 15$$

$$\arg(z_1 \cdot z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2) = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3} = \frac{3\pi}{12} + \frac{4\pi}{12} = \frac{7\pi}{12}$$

$$z_1 \cdot z_2 = 15 \cdot \exp\left(\frac{7\pi}{12} \cdot I\right) = 15 \cdot \left(\cos \frac{7\pi}{12} + I \cdot \sin \frac{7\pi}{12}\right)$$

Her er der ikke nogen mere eksakt værdi af $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$.

Spørgsmål 4: (14)

Bestem følgende værdi af sinus:

$$\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)$$

Svar:

Her er det nødvendigt at kunne enhedscirklen i hovedet. Sinus aflæses på y-aksen.

$$\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Spørgsmål 5: (15)

Nedenstående komplekse tal er givet ved deres polære koordinater, eksponentiel og rektangulær form, match de tal der er ens.

$$\boxed{\text{--} \updownarrow 5 \cdot \exp\left(I \cdot \frac{\pi}{3}\right)} \quad \boxed{\text{--} \updownarrow \exp\left(I \cdot \frac{\pi}{2}\right)} \quad \boxed{\text{--} \updownarrow \sqrt{2} + I \cdot \sqrt{2}}$$

$$\boxed{\text{--} \updownarrow -1} \quad \boxed{\text{--} \updownarrow 1+I}$$

1. $\left(5, \frac{7}{3}\pi\right)$

2. $2 \cdot \exp\left(I \cdot \frac{\pi}{4}\right)$

3. $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$

4. $(1, 5\pi)$

5. I

Svar:

Polære koordinater:

$z = (|z|, \nu)$ hvor ν er argumentet $\nu = \arg(z)$

Eksponentiel form:

$$z = |z| \cdot e^{i\nu}$$

Fra rektangulær form til polære koordinater:

$$z = 1 + I$$

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$\cos(\nu) = \frac{a}{|z|} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$v = \frac{\pi}{4} \quad \text{eller} \quad v = -\frac{\pi}{4}$$

$$\sin(v) = \frac{b}{|z|} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$v = \frac{\pi}{4} \quad \text{eller} \quad v = \frac{3\pi}{4}$$

$$z = 1 + I = \left(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}\right)$$

Fra eksponentiel form til rektangulær form:

$$e^{iv} = \cos(v) + i \cdot \sin(v)$$

$$\exp\left(\frac{\pi}{2} \cdot I\right) = \cos \frac{\pi}{2} + I \cdot \sin \frac{\pi}{2} = 0 + I \cdot 1 = I$$

Fra eksponentiel form til polære koordinater:

$$5 \cdot \exp\left(\frac{\pi}{3} \cdot I\right) = \left(5, \frac{\pi}{3}\right) = \left(5, \frac{7\pi}{3}\right)$$

De andre udregnes:

$$\sqrt{2} + I \cdot \sqrt{2}$$

$$z = \sqrt{\sqrt{2}^2 + \sqrt{2}^2} = \sqrt{4} = 2$$

$$\cos(v) = \frac{a}{|z|} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$v = \frac{\pi}{4} \quad \text{eller} \quad v = -\frac{\pi}{4}$$

$$\sin(v) = \frac{b}{|z|} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$v = \frac{\pi}{4} \quad \text{eller} \quad v = \frac{3\pi}{4}$$

$$z = \sqrt{2} + I \cdot \sqrt{2} = \left(2, \frac{\pi}{4}\right) = 2 \cdot \exp\left(\frac{\pi}{4} \cdot I\right)$$

Spørgsmål 6: (16)

Et komplekst tal er givet på eksponentiel form $z = 6 \cdot \exp\left(\frac{\pi}{3} \cdot I\right)$.

Angiv imaginærværdien af tallet z :

$$\operatorname{Im}(z) =$$

Svar:

Tallet omskrives til rektangulær form:

$$e^{iv} = \cos(v) + I \cdot \sin(v) = 6 \cdot \left(\cos \frac{\pi}{3} + I \cdot \sin \frac{\pi}{3} \right) = 6 \cdot \left(\frac{1}{2} + I \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 3 + 3\sqrt{3} \cdot I$$

$$\operatorname{Im}(z) = 3\sqrt{3}$$

Spørgsmål 7: (17)

Et komplekst tals polære koordinater er givet ved $z = \left(3, \frac{\pi}{6}\right)$.

Angiv tallet på rektangulær form.

$z =$

Svar:

$$z = \left(3, \frac{\pi}{6}\right) = 3 \cdot \exp\left(\frac{\pi}{6} \cdot I\right) = 3 \cdot \left(\cos \frac{\pi}{6} + I \cdot \sin \frac{\pi}{6}\right) = 3 \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + I \cdot \frac{1}{2}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2} \cdot I$$

Spørgsmål 8: (18)

Givet et komplekst tal $z = 4 \cdot \sqrt{3} - 4 \cdot I$.

Find absolutværdien af $|z|$ og hovedargumentet $\operatorname{Arg}(z)$ for tallet z .

$|z| =$

$\operatorname{Arg}(z) =$

Svar:

Hovedargumentet ligger i intervallet $[-\pi; \pi]$.

$$|z| = \sqrt{(4\sqrt{3})^2 + (-4)^2} = \sqrt{48 + 16} = \sqrt{64} = 8$$

$$\cos(v) = \frac{a}{|z|} = \frac{4\sqrt{3}}{8} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$v = \frac{\pi}{6} \quad \text{eller} \quad v = -\frac{\pi}{6}$$

$$\sin(v) = \frac{b}{|z|} = \frac{-4}{8} = -\frac{1}{2}$$

$$v = -\frac{\pi}{6} \quad \text{eller} \quad v = \frac{7\pi}{6}$$

$$\operatorname{Arg}(z) = -\frac{\pi}{6}$$

Spørgsmål 9: (19)

Marker de udsagn som er sande:

Tallet 2 er et komplekst tal

Det komplekse tal $z = 2 + 3 \cdot I$, har imaginærdelen $Im(z) = 3 \cdot I$

Nulreglen gælder ikke for komplekse tal

Ligningen $\sin(2x) = \frac{2}{3}$ har fire løsninger i intervallet $x \in [0, 2\pi]$

Lad a være et komplekst tal: Hvis z_0 er en løsning til den binome ligning $z^n = a$, så er \bar{z}_0 (komplekst konjugeret z_0) også en løsning for alle værdier af a .

Lad a være et reelt tal: Hvis z_0 er en løsning til den binome ligning $z^n = a$, så er \bar{z}_0 (komplekst konjugeret z_0) også en løsning for alle værdier af a .

Ligningen $z^5 = 1$ har fem forskellige komplekse løsninger.

Svar:

Tallet 2 er et komplekst tal

Ligningen $\sin(2x) = \frac{2}{3}$ har fire løsninger i intervallet $x \in [0, 2\pi]$

Lad a være et reelt tal: Hvis z_0 er en løsning til den binome ligning $z^n = a$, så er \bar{z}_0 (komplekst konjugeret z_0) også en løsning for alle værdier af a .

Ligningen $z^5 = 1$ har fem forskellige komplekse løsninger.

Spørgsmål 10: (20)

Følgende værdi af arcuscosinus, kan skrives som et rationelt tal k , multipliceret med π :

$$\arccos\left(\frac{1}{2}\sqrt{3}\right) = k \cdot \pi$$

Hvad er værdien af k ?

Svar:

$$\arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\pi}{6} = \frac{1}{6} \cdot \pi$$
$$k = \frac{1}{6}$$

Uge 3: Komplekse tal

Spørgsmål 1: (21)

Lad P være et komplekst polynomium af en reel variabel med forskrift:

$$P(t) = (5 \cdot I - t) \cdot (2 + 6 \cdot I - t)$$

Bestem nedenstående differentialkvotient:

$$P'(1) =$$

Svar:

De to parenteser ganges sammen, og der udføres helt almindelig differentiation.

$$\begin{aligned} P(t) &= (5 \cdot I - t) \cdot (2 + 6 \cdot I - t) = 10 \cdot I + 30 \cdot I^2 - 5 \cdot I \cdot t - 2t - 6 \cdot I \cdot t + t^2 \\ &= t^2 - 11 \cdot I \cdot t - 2t - 30 + 10 \cdot I \\ P'(t) &= 2t - 11 \cdot I - 2 \\ P'(1) &= 2 \cdot 1 - 11 \cdot I - 2 = -11 \cdot I \end{aligned}$$

Spørgsmål 2: (22)

Løs andengradsligningen:

$$2z^2 - 8z + 16 = 0$$

Angiv den løsning z_0 som har positiv imaginærværdi.

Svar:

Løses som en almindelig andengradsligning, men hvor man får en negativ diskriminant, som kan omskrives til et komplekst tal:

$$\begin{aligned} D &= b^2 - 4ac = (-8)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 16 = 64 - 128 = -64 = (8i)^2 \\ z &= \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{8 \pm \sqrt{(8i)^2}}{2 \cdot 2} = \frac{8 \pm 8i}{4} = 2 \pm 2i \\ z_0 &= 2 + 2i \end{aligned}$$

Spørgsmål 3: (23)

Den reelle funktion f er givet ved forskriften:

$$f(x) = x \cdot \sin(4x + 4)$$

Bestem den afledede funktion:

$$f'(x) =$$

Svar:

Løses vha. produktreglen:

$$\begin{aligned} f'(x) &= g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x) \\ g(x) &= x \quad g'(x) = 1 \\ h(x) &= \sin(4x + 4) \end{aligned}$$

$h(x)$ differentieres som en sammensat funktion:

$$h'(x) = p'(q(x)) \cdot q'(x)$$

$$p(x) = \sin(x) \quad p'(x) = \cos(x)$$

$$q(x) = 4x + 4 \quad q'(x) = 4$$

$$h'(x) = \cos(4x + 4) \cdot 4$$

Det vil sige, at svaret er:

$$f'(x) = 1 \cdot \sin(4x + 4) + x \cdot 4 \cdot \cos(4x + 4)$$

$$\Leftrightarrow f'(x) = \sin(4x + 4) + 4x \cdot \cos(4x + 4)$$

Spørgsmål 4: (24)

En monoton funktion er givet ved:

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$$

Bestem nedenstående differentialkvotient af den omvendte funktion f^{-1} :

$$(f^{-1})'(10) =$$

Vink: hvad bliver $f(1)$?

Svar:

$$f(1) = 1^3 - 6 \cdot 1^2 + 15 \cdot 1 = 1 - 6 + 15 = 10$$

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 15$$

$$f'(1) = 3 \cdot 1^2 - 12 \cdot 1 + 15 = 6$$

$$(f^{-1})'(10) = (f^{-1})'(f(1)) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{6}$$

Spørgsmål 5: (25)

Lad $P(z)$ være et førstegradspolynomium med forskriften:

$$P(z) = (4 - 2 \cdot I) \cdot z + 4$$

Angiv nedenstående funktionsværdi på rektangulær form:

$$P(5 \cdot I) =$$

Svar:

$$P(5 \cdot I) = (4 - 2 \cdot I) \cdot 5 \cdot I + 4 = 20 \cdot I - 10 \cdot I^2 + 4 = 14 + 20 \cdot I$$

Spørgsmål 6: (26)

Lad f være en kompleks funktion af en reel variabel t .

$$f(t) = I \cdot e^{(4+3 \cdot I) \cdot t} + t \cdot (3 - 2 \cdot I)$$

Bestem nedenstående differentialkvotient:

$$f'(0) =$$

Svar:

$f(t)$ omskrives:

$$f(t) = I \cdot e^{(4+3 \cdot I) \cdot t} + t \cdot (3 - 2 \cdot I) = I \cdot e^{(4+3 \cdot I) \cdot t} + 3t - 2 \cdot I \cdot t$$

$f(t)$ differentieres led vist:

$$(I \cdot e^{(4+3 \cdot I) \cdot t})' = I \cdot e^{(4+3 \cdot I) \cdot t} \cdot (4 + 3 \cdot I)$$

$$(3t - 2 \cdot I \cdot t)' = 3 - 2 \cdot I$$

$$f'(t) = I \cdot e^{(4+3 \cdot I) \cdot t} \cdot (4 + 3 \cdot I) + 3 - 2 \cdot I$$

$f'(0)$ udregnes:

$$\begin{aligned} f'(0) &= I \cdot e^{(4+3 \cdot I) \cdot 0} \cdot (4 + 3 \cdot I) + 3 - 2 \cdot I = I \cdot (4 + 3 \cdot I) + 3 - 2 \cdot I \\ &= 4 \cdot I + 3 \cdot I^2 + 3 - 2 \cdot I = 2 \cdot I \end{aligned}$$

Spørgsmål 7: (27)

Lad $P(z)$ være et førstegradspolynomium med forskriften:

$$P(z) = -4 \cdot I \cdot z$$

En kompleks førstegradsligning er givet ved:

$$P(z) = 16 + 24 \cdot I$$

Angiv på rektangulær form løsningen til ligningen z_0 :

$$z_0 =$$

Svar:

$$\begin{aligned} -4 \cdot I \cdot z &= 16 + 24 \cdot I \Leftrightarrow z = \frac{16 + 24 \cdot I}{-4 \cdot I} = \frac{(16 + 24 \cdot I) \cdot 4 \cdot I}{-4 \cdot I \cdot 4 \cdot I} = \frac{64 \cdot I - 96}{-16 \cdot I^2} \\ &= -\frac{96}{16} + \frac{64}{16} \cdot I = -6 + 4 \cdot I \end{aligned}$$

Spørgsmål 8: (28)

Lad a betegne et vilkårligt komplekst tal.

Lad $z^n = a$ være en binom ligning af grad n .

Hvilke af nedenstående udsagn er sande (Der er eventuelt flere korrekte svar)?

Lad $n = 4$: De 4 løsninger til den binome ligning udgør hjørnerne i et kvadrat.

Lad $n = 7$: Den binome ligning kunne have 2 forskellige reelle løsninger.

Hvis z_0 er en løsning til den binome ligning, er den konjugerede værdi af z_0 også altid en løsning.
Hvis a er reel og z_0 er en løsning til den binome ligning, er den konjugerede værdi af z_0 også altid en løsning.

Lad $n = 3$: Hvis der findes en reel løsning til den binome ligning, så er de to øvrige løsninger hinandens komplekst konjugerede.

En binom ligning kan have 3 forskellige løsninger.

Svar:

Der er 3 sande udsagn:

Lad $n = 4$: De 4 løsninger til den binome ligning udgør hjørnerne i et kvadrat.

Hvis a er reel og z_0 er en løsning til den binome ligning, er den konjugerede værdi af z_0 også altid en løsning.

Lad $n = 3$: Hvis der findes en reel løsning til den binome ligning, så er de to øvrige løsninger hinandens komplekst konjugerede.

Spørgsmål 9: (29)

Et polynomium har forskriften:

$$P(z) = 3z^3 - 8z^2 - 13z - 12$$

Det oplyses at $z_0 = 4$ er rod i $P(z)$.

Bestem et andengradspolynomium $Q(z) = az^2 + bz + c$ således $P(z) = (z - 4) \cdot Q(z)$.

Angiv nedenfor værdierne af a , b og c .

$a =$

$b =$

$c =$

Svar:

Fra polynomiets forskrift har vi:

$$a_3 = 3$$

$$a_2 = -8$$

$$a_1 = -13$$

$$a_0 = -12$$

Dermed har vi:

$$b_2 = a_3 = 3$$

$$b_1 = a_2 + z_0 \cdot b_2 = -8 + 4 \cdot 3 = 4$$

$$b_0 = a_1 + z_0 \cdot b_1 = -13 + 4 \cdot 4 = 3$$

Det vil sige, at forskriften for $Q(z)$ er:

$$Q(z) = 3z^2 + 4z + 3$$

Altså er svarene:

$$a = 3, \quad b = 4 \quad \text{og} \quad c = 3$$

Spørgsmål 10: (30)

Et reelt polynomium af grad 2 er givet ved udtrykket:

$$P(z) = z^2 + az + b$$

Det oplyses at $z_1 = 8 + 8 \cdot I$ er rod i $P(z)$.

Angiv nedenfor værdierne af a og b :

$$a =$$

$$b =$$

Svar:

Man skal regne baglæns.

$$z = 8 \pm 8 \cdot I = \frac{16 \pm 16 \cdot I}{2} = \frac{16 \pm \sqrt{(16 \cdot I)^2}}{2}$$

$$b = -16$$

$$D = (-16)^2 - 4 \cdot 1 \cdot c = (16 \cdot I)^2 \Leftrightarrow 256 - 4c = -256 \Leftrightarrow 4c = 512 \Leftrightarrow c = 128$$

Man kan også udregne følgende:

$$(z - (8 + 8 \cdot I)) \cdot (z - (8 - 8 \cdot I))$$

Uge 4: Komplekse tal (Tema 1)

Uge 5: Lineære ligninger og matricer

Spørgsmål 1: (31)

Løs nedenstående matrixligning:

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 9 & 5 \end{bmatrix}$$

$$x_1 =$$

$$x_2 =$$

$$x_3 =$$

Svar:

Her står den ubekendte til venstre, og derfor er det nødvendigt at transponere matricerne:

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 5 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 9 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Nu kan man opstille en totalmatrix og udføre GaussJordan-elimination:

$$T = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 & 12 \\ 1 & 2 & 0 & 9 \\ 5 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \text{trap}(T) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 4 \quad \text{og} \quad x_3 = 2$$

Spørgsmål 2: (32)

Løsningsmængden til nogle lineære ligningssystemer er opskrevet på standardparameterform nedenfor. Sæt hak ud for de to standardparameterfremstillinger der angiver den samme løsningsmængde.

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + t \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + t \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + t \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + t \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Svar:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + t \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + t \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Spørgsmål 3: (33)

Find differensen mellem nedenstående 2 matricer.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

Svar:

$$A - B = A + (-1) \cdot B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & -1 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Spørgsmål 4: (34)

En matrix er givet ved:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 5 & 1 \\ 6 & 7 & 2 \\ 2 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

Find den transponerede matrix A^T .

Svar:

$$A^T = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 2 \\ 5 & 7 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Spørgsmål 5: (35)

Et lineært ligningssystem består af 3 ligninger med 2 ubekendte:

$$-x_1 + 8x_2 - 2 = 0$$

$$8x_1 + 5 = 8$$

$$x_1 = x_2 + 1$$

Opskriv ligningssystemets koefficientmatrix A , når det oplyses at højresiden er givet ved:

$$b = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Svar:

Først skal de ubekendte samles på venstre side af ligningerne og resten skal samles på højre side af ligningen:

$$-x_1 + 8x_2 = 2$$

$$8x_1 = 3$$

$$x_1 - x_2 = 1$$

Koefficientmatricen er:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 8 \\ 8 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Spørgsmål 6: (36)

Givet nedenstående matrix A og søjlevektor b .

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 7 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Udregn matrix-vektorproduktet $A \cdot b$

Svar:

$$A \cdot b = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 7 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \cdot 5 + 1 \cdot 1 + 7 \cdot (-4) \\ 1 \cdot 5 + 3 \cdot 1 - 1 \cdot (-4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 + 1 - 28 \\ 5 + 3 + 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 \\ 12 \end{bmatrix}$$

Spørgsmål 7: (37)

En matrix er givet ved:

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Find den inverse matrix A^{-1} .

Svar:

Metode 1:

$$A^{-1} = [A \ E] = \begin{bmatrix} 8 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \text{trap}(T) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -16 \end{bmatrix}$$

Metode 2:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -\frac{1}{2} & 8 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = \det \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = 8 \cdot 0 - \frac{1}{2} \cdot 1 = -\frac{1}{2}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-\frac{1}{2}} \cdot \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -\frac{1}{2} & 8 \end{bmatrix} = -2 \cdot \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -\frac{1}{2} & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -16 \end{bmatrix}$$

Spørgsmål 8: (38)

Bestem løsningen til nedenstående ligningssystem.

$$-2x + 2y - 5z = -6$$

$$2x - y + 6z = 12$$

$$x - y + 3z = 4$$

Svar:

$$T = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -5 & -6 \\ 2 & -1 & 6 & 12 \\ 1 & -1 & 3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \text{trap}(T) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 2 & -5 & -7 \\ 2 & -1 & 6 & 9 \\ 1 & -1 & 3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \text{trap}(T) =$$

Ligningen løses numerisk for T vha. CAS-værktøjet WordMat.

fejlincorrectsyntax: Missing)6 ∨ 3) ≠ (-7@9@4)^()

Der blev fundet løsninger vha. numeriske metoder, men der findes muligvis flere.

Spørgsmål 9: (39)

Find rangen af matricen A.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Svar:

$$T = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \text{trap}(T) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Rangen af matricen er lig antallet af ledende 1-taller i $\text{trap}(T)$, hvilket betyder at:

$$\rho(A) = 3$$

Spørgsmål 10: (40)

Find produktet af nedenstående 2 matricer.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -i & i \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 & i \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Svar:

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -i & i \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & i \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 2 + 1 \cdot 2 & 2 \cdot i + 1 \cdot 0 \\ -i \cdot 2 + i \cdot 2 & -i \cdot i + i \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 2 \cdot i \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Uge 6: Determinanter og vektorer

Spørgsmål 1: (41)

Givet tre geometriske vektorer \vec{a}, \vec{b} og \vec{c} .

Vektorernes koordinater med hensyn til standardbasis er angivet nedenfor:

$$\vec{a} = \begin{bmatrix} 0 \\ 7 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ -7 \end{bmatrix} \quad \text{og} \quad \vec{c} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ x \end{bmatrix}$$

Bestem x så de tre vektorer bliver lineært afhængige.

Svar:

Man skal finde den x -værdi, hvor determinanten bliver lig 0.

$$\det \begin{bmatrix} 0 & 5 & 4 \\ 7 & 5 & 2 \\ 0 & -7 & x \end{bmatrix} = 7 \cdot \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ -7 & x \end{bmatrix} = -7 \cdot (5 \cdot x - (-7) \cdot 4)$$

$$-7 \cdot (5 \cdot x - (-7) \cdot 4) = 0 \Leftrightarrow -35x - 196 = 0 \Leftrightarrow -35x = 196 \Leftrightarrow x = -\frac{196}{35} = -\frac{28}{5}$$

Spørgsmål 2: (42)

En geometrisk vektor \vec{b} kan skrives som en linearkombination af vektorerne \vec{u}, \vec{v} og \vec{w} :

$$\vec{b} = k_1 \cdot \vec{u} + k_2 \cdot \vec{v} + k_3 \cdot \vec{w}$$

De 4 vektorer er med hensyn til standardbasen givet ved:

$$\vec{b} = \begin{bmatrix} 6 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{v} = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{og} \quad \vec{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Bestem konstanterne k_1, k_2 og k_3 .

Svar:

$$\begin{bmatrix} 6 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = k_1 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_3 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Hvis man ganger konstanterne sammen med vektorerne får man et lineært ligningssystem af 3 ligninger med 3 ubekendte:

$$2k_1 - 2k_2 + k_3 = 6$$

$$-k_2 + k_3 = -1$$

$$k_3 = 2$$

$$T = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \text{trap}(T) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Det vil sige at:

$$k_1 = 5, \quad k_2 = 3 \quad \text{og} \quad k_3 = 2$$

Spørgsmål 3: (43)

Lad A være en matrix af typen $n \times n$.

Det oplyses at $\text{trap}(A) = E$ hvor E er en enhedsmatrix.

Hvilke påstande er sande?

(Der er flere rigtige svar)

$$\text{rang}(A) < n$$

A er singular

$$\det(A) = 0$$

$$\text{rang}(A) = n$$

A er ikke invertibel

$$\det(A) \neq 0$$

Det homogene ligningssystem som har A som koefficientmatrix, har kun en løsning.

A er invertibel

A er regulær

Svar:

$$\text{rang}(A) = n$$

$$\det(A) \neq 0$$

Det homogene ligningssystem som har A som koefficientmatrix, har kun en løsning.

A er invertibel

A er regulær

Spørgsmål 4: (44)

To geometriske vektorer i rummet \vec{a} og \vec{b} , har koordinaterne med hensyn til standardbasen:

$$\vec{a} = \begin{bmatrix} 10 \\ 1 \\ 8 \end{bmatrix}, \vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

a) Find skalarproduktet:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} =$$

b) Find længden af vektor \vec{b} :

$$|\vec{b}| =$$

c) Find projektionen af \vec{a} på \vec{b} :

$$\text{proj}(\vec{a}, \vec{b}) =$$

Svar:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \begin{bmatrix} 10 \\ 1 \\ 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = 10 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 8 \cdot (-1) = 10 + 2 - 8 = 4$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{1 + 4 + 1} = \sqrt{6}$$

$$\text{proj}(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{b}|^2} \cdot \vec{b} = \frac{4}{\sqrt{6}^2} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{4}{6} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{4}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

Spørgsmål 5: (45)

To matricer A og B er givet ved:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{og} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Find determinanten af produktet af de to matricer $A \cdot B$:

$$\det(A \cdot B) =$$

Svar:

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 - 2 \cdot 1 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 - 2 \cdot 1 & 1 \cdot 2 - 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\det(A \cdot B) = \det \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} = 1 \cdot 2 - (-2) \cdot 5 = 2 + 10 = 12$$

Spørgsmål 6: (46)

Vi betragter vektorer i rummet afsat ud fra Origo.

Nedenstående 3 vektorer, udtrykt ved deres koordinater med hensyn til standardbasis, udspænder en plan i rummet som går gennem Origo.

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{og} \quad \vec{w} = \begin{pmatrix} -15 \\ 17 \\ 0 \end{pmatrix}$$

En basis for vektorerne der ligger i denne plan er givet ved: $b = (\vec{u}, \vec{v})$

Angiv nedenfor koordinaterne for \vec{u} med hensyn til basis b :

$$\vec{u}_b =$$

Angiv nedenfor koordinaterne for \vec{w} med hensyn til basis b :

$$\vec{w}_b =$$

Svar:

$$k_1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix} + k_2 \cdot \begin{bmatrix} -4 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix}$$

$$k_1 = 1 \quad \text{og} \quad k_2 = 0$$

$$\vec{u}_b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$k_1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix} + k_2 \cdot \begin{bmatrix} -4 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -15 \\ 17 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$k_1 = 1 \quad \text{og} \quad k_2 = 4$$

$$\vec{w}_b = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Spørgsmål 7: (47)

En matrix A er givet ved:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & -3 \\ -1 & -4 & -3 \end{bmatrix}$$

Angiv de 4 nedenstående determinanter:

$$\det(A) =$$

$$\det(A^3) =$$

$$\det(A^T) =$$

$$\det(A^{-1}) =$$

Svar:

$$\det(A) = \det \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & -3 \\ -1 & -4 & -3 \end{bmatrix} = -1 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 3 & -3 \end{bmatrix} = -1 \cdot (0 \cdot (-3) - 3 \cdot 3) = -1 \cdot (-9) = 9$$

$$\det(A^3) = 9^3 = 81 \cdot 9 = 729$$

$$\det(A^T) = \det(A) = 9$$

$$\det(A^{-1}) = 9^{-1} = \frac{1}{9}$$

Spørgsmål 8: (48)

Givet en 4x4 matrix A:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 0 & 1 \\ -3 & 2 & 5 & 3 \\ 1 & 5 & 3 & 12 \\ 0 & -3 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

Angiv snitmatricen \hat{A}_{23} :


Svar:

Man opløser 2. række og 3. søjle.

$$\hat{A}_{23} = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 1 \\ 1 & 5 & 12 \\ 0 & -3 & 5 \end{bmatrix}$$

Spørgsmål 9: (49)

Betragt nedenstående 4 geometriske vektorer.



Lad en stedvektor \overrightarrow{OP} ende i det punkt, som i det givne koordinatsystem har koordinaterne (3,1).

a) Angiv nedenfor koordinaterne for vektoren \overrightarrow{OP} med hensyn til basis (i, j) .

b) Angiv nedenfor koordinaterne for vektoren \overrightarrow{OP} med hensyn til basis (u, v) (det er den basis der er angivet med blå pile på figuren).

Svar:

Koordinaterne for vektoren \overrightarrow{OP} med hensyn til standardbasis er:

$$(3,1)$$

Koordinaterne for vektoren \overrightarrow{OP} med hensyn til basis (u, v) er:

$$k_1 \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix} + k_2 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$-k_1 + 2k_2 = 3 \Leftrightarrow k_1 = 2k_2 - 3$$

$$-k_1 + k_2 = 1 \Leftrightarrow k_2 = 1 + k_1 \Leftrightarrow k_2 = 1 + 2k_2 - 3 \Leftrightarrow k_2 = 2$$

$$k_1 = 2k_2 - 3 = 2 \cdot 2 - 3 = 4 - 3 = 1$$

$$(1,2)$$

Spørgsmål 10: (50)

Find determinanten af nedenstående matrix:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) =$$

Svar:

Jeg opløser efter 2. række:

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & -3 \end{bmatrix} = -1 \cdot \det \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & -3 \end{bmatrix} + 2 \cdot \det \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \\ &= -1 \cdot (3 \cdot (-3) - (-1) \cdot 1) + 2 \cdot (3 \cdot (-1) - 1 \cdot 3) = -1 \cdot (-9 + 1) + 2 \cdot (-3 - 3) \\ &= 8 - 12 = -4 \end{aligned}$$

Uge 7: Vektorrum (Tema 2)

Uge 8: Lineære afbildninger

Spørgsmål 1: (51)

En lineær afbildning $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ har en afbildningsmatrix med hensyn til standardbasis givet ved:

$$eFe = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 5 \\ 2 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

Match vektorerne med udsagnene.

$$\begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

1. Tilhører hverken kernen eller billedrummet for f .
2. Tilhører kernen for f .
3. Tilhører billedrummet for f .

Svar:

En vektor tilhører kernen, hvis vektoren og matrixens prikprodukt giver 0-vektoren. Det er højst sandsynligt den vektor med flere negative tal.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 5 \\ 2 & 0 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot (-3) + 3 \cdot 1 \\ 1 \cdot (-3) - 2 \cdot 1 + 5 \cdot 1 \\ 2 \cdot (-3) + 6 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 + 3 \\ -3 - 2 + 5 \\ -6 + 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ tilhører kernen for } f$$

Den tredje vektor tilhører billedrummet, da den følger betingelsen for tredje søjle i afbildningsmatricen, hvor 3. koordinaten er dobbelt så stor som 1. koordinaten, det samme gælder for vektoren:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} \text{ tilhører billedrummet for } f$$

Dermed betyder, at det er den anden vektor, der hverken tilhører kernen eller billedrummet.

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ tilhører hverken kernen eller billedrummet for } f$$

Spørgsmål 2: (52)

Lad V være et vektorrum med basis (b_1, b_2, \dots, b_6) , og lad W være et vektorrum med basis (c_1, c_2, \dots, c_8) .

En lineær afbildning $f: V \rightarrow W$ har med hensyn til ovenstående baser afbildningsmatricen F .

Det oplyses at rangen af F er 2.

$$\dim(V) =$$

$$\dim(f(V)) =$$

Angiv nedenfor antallet af vektorer i en basis for kernen til f .

Svar:

Da V har en basis bestående af 6 basisvektorer betyder det at:

$$\dim(V) = 6$$

Da dimensionen af billedrummet er lig rangen af afbildningsmatricen betyder det at:

$$\dim(f(V)) = \rho(F) = 2$$

Antallet af vektorer i en basis for kernen til f bestemmes vha. dimensionssætningen:

$$\begin{aligned} \dim(V) &= \dim(\ker f) + \dim(f(V)) \\ \Leftrightarrow \dim(\ker f) &= \dim(V) - \dim(f(V)) = 6 - 2 = 4 \end{aligned}$$

Spørgsmål 3: (53)

En lineær afbildning mellem polynomiumsrum $f: P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R})$ er givet ved:

$$f(p(x)) = 3 \cdot p(1) - x^2 \cdot p(0) + (x - 1) \cdot p'(1)$$

Angiv afbildningsmatricen med hensyn til monomiebasen $(1, x, x^2)$:

Svaret indskrives som en matrix.

$mFm =$

Svar:

Afbildningsmatricens søjler er billederne af basisvektorerne. Først indsættes $p(x) = 1$:

$$\begin{aligned} p(1) &= 1, \quad p(0) = 1, \quad p'(1) = 0 \\ f(p(x)) &= 3 \cdot 1 - x^2 \cdot 1 + (x - 1) \cdot 0 = 3 - x^2 \end{aligned}$$

Det vil sige, at det første basisvektor-billede mht. monomiebasen er: $\langle 3, 0, -1 \rangle$

Nu indsættes $p(x) = x$:

$$\begin{aligned} p(1) &= 1, \quad p(0) = 0, \quad p'(1) = 1 \\ f(p(x)) &= 3 \cdot 1 - x^2 \cdot 0 + (x - 1) \cdot 1 = 3 + x - 1 = 2 + x \end{aligned}$$

Det vil sige, at det andet basisvektor-billede mht. monomiebasen er: $\langle 2, 1, 0 \rangle$

Til sidst indsættes $p(x) = x^2$:

$$\begin{aligned} p(1) &= 1, \quad p(0) = 0, \quad p'(1) = 2 \\ f(p(x)) &= 3 \cdot 1 - x^2 \cdot 0 + (x - 1) \cdot 2 = 3 + 2x - 2 = 1 + 2x \end{aligned}$$

Det vil sige, at det sidste basisvektor-billede mht. monomiebasen er: $\langle 1, 2, 0 \rangle$

Altså er afbildningsmatricen med hensyn til monomiebasen $(1, x, x^2)$:

$$mFm = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Spørgsmål 4: (54)

Lad v_1 og v_2 være 2 forskellige vektorer i et n -dimensionelt vektorrum V .

Om en lineær afbildning $f: V \rightarrow V$ vides følgende:

$$f(v_1) = f(v_2)$$

Hvilke af nedenstående udsagn er sande?

Lad F betegne en afbildningsmatrix for f . Determinanten for F er forskellig fra nul.

Afbildningsmatricen for f er kvadratisk.

Billedrummet for f er hele V .

Hvis $\dim(V)$ er ulige, kan billedrum og kernen have samme dimension.

Kernen for f består kun af nulvektoren.

$$f(v_1 - v_2) = 0$$

Hvis ligningen $f(x) = b$ for et $b \in V$ har en løsning, så har den altid mere end en løsning.

Svar:

Afbildningsmatricen for f er kvadratisk.

$$f(v_1 - v_2) = 0$$

Hvis ligningen $f(x) = b$ for et $b \in V$ har en løsning, så har den altid mere end en løsning.

Spørgsmål 5: (55)

En lineær afbildning f mellem to vektorrum V og W udstyret med baser a og c , har afbildningsmatricen:

$$cFa = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 4 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$$

En vektor $x \in V$ har med hensyn til basis a koordinaterne:

$$a^x = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Angiv koordinaterne for vektoren $f(x)$ med hensyn til basis c :

Løsningen indskrives som vektor.

$$cf(x) =$$

Svar:

$$cf(x) = cFa \cdot a^x = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 4 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 5 + 6 \cdot 4 \\ 4 \cdot 5 + 3 \cdot 4 \\ -1 \cdot 5 - 2 \cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 + 24 \\ 20 + 12 \\ -5 - 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 29 \\ 32 \\ -13 \end{bmatrix}$$

Spørgsmål 6: (56)

Afgør hvilke af nedenstående afbildninger der er lineære.

$$f_1: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}, f_1\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = a + d \quad (\text{Denne afbildning kaldes sporet af matricen})$$

$$f_2: V_g^2 \rightarrow \mathbb{R}, (\text{Hvor } V_g^2 \text{ er mængden af geometriske vektorer i planen}), f_2(v) = |v|.$$

$$f_3: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_3(x) = 2x + 3$$

$$f_4: P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R}), f_4(p(x)) = x \cdot p'(x) + p(1) + x$$

$$f_5: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, f_5\left(\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix}$$

Svar:

Følgende er lineære:

$$f_1 \quad \text{og} \quad f_5$$

Spørgsmål 7: (57)

En lineær afbildning $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, har afbildningsmatricen:

$$eFe = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

En vektor $b \in \mathbb{R}^3$ har med hensyn til standardbasis koordinaterne:

$$e^b = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Angiv koordinaterne med hensyn til standardbasis for vektoren x i ligningen $f(x) = b$:

Løsningen indskrives som en vektor.

$$e^x =$$

Svar:

Afbildningsmatricen skal prikkes sammen med en vektor for at give e^x . Altså ses det, at dette vil give et lineært ligningssystem, hvormed man kan opstille en totalmatrix.

$$T = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \text{trap}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Vektoren x i e -koordinater kan nu aflæses i trappematrixen:

$$e^x = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Spørgsmål 8: (58)

En basis for \mathbb{R}^2 er givet ved $a = (a_1, a_2)$ hvor:

$$a_1 = (1, -1) \text{ og } a_2 = (0, 1)$$

Om en lineær afbildning $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ vides:

$$f(a_1) = -3 \cdot a_1$$

$$f(a_2) = 8 \cdot a_2$$

Angiv nedenfor afbildningsmatricen for f men hensyn til e -standardbasen for \mathbb{R}^2 .

Svar:

Man skal benytte følgende formel:

$$eFe = eMa \cdot aFa \cdot aMe$$

Hvoraf:

$$eMa = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$aFa = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$$

$$aMe = (eMa)^{-1} = \frac{1}{\det \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{1} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Matricerne ganges sammen:

$$eFe = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 11 & 8 \end{bmatrix}$$

Spørgsmål 9: (59)

Lad en basis a for \mathbb{R}^2 være givet ved $a = (a_1, a_2)$:

$$a_1 = (4, 5)$$

$$a_2 = (0, 3)$$

Angiv nedenfor de to basisskifte matricer eMa og aMe der skifter mellem e -standardbasis og a -basis.

$$eMa =$$

$$aMe =$$

Svar:

${}_eM_a$ er a -vektorenes e -koordinater. Denne er givet direkte i angivelsen af vektorerne til a -basis, og matricen er derfor som følgende:

$${}_eM_a = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$$

${}_aM_e$ er den inverse af denne:

$${}_aM_e = ({}_eM_a)^{-1} = \frac{1}{\det \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -5 & 4 \end{bmatrix} = \frac{1}{12} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ -\frac{5}{12} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

Spørgsmål 10: (60)

Om en lineær afbildning $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ vides:

$$f(v_1 + v_2) = (10, 2)$$

$$f(v_1 - v_2) = (0, 10)$$

Angiv nedenfor værdierne af vektorerne $f(v_1)$ og $f(v_2)$:

Svar:

$$f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2) = (10, 2)$$

$$f(v_1 - v_2) = f(v_1) - f(v_2) = (0, 10)$$

$$\begin{aligned} v_1 + v_2 &= \begin{bmatrix} 10 \\ 2 \end{bmatrix} \Leftrightarrow v_1 = \begin{bmatrix} 10 \\ 2 \end{bmatrix} - v_2 \\ v_1 - v_2 &= \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 10 \\ 2 \end{bmatrix} - 2v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \end{bmatrix} \Leftrightarrow 2v_2 = \begin{bmatrix} 10 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ -8 \end{bmatrix} \Leftrightarrow v_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ -4 \end{bmatrix} \\ v_1 &= \begin{bmatrix} 10 \\ 2 \end{bmatrix} - v_2 = \begin{bmatrix} 10 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Svaret er altså:

$$f(v_1) = (5, 6)$$

$$f(v_2) = (5, -4)$$

Uge 9: Differentialligninger (Tema 3)

Uge 10: Egenværdi-problemet

Spørgsmål 1:

En matrix A er givet ved:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{2} \\ 6 & 1 \end{bmatrix}$$

Find de to egenverdier λ_1 og λ_2 for matrix A (vi antager at $\lambda_1 \leq \lambda_2$).

Svar:

Først bestemmes det karakteristiske polynomium:

$$\det \begin{bmatrix} 1 - \lambda & \frac{3}{2} \\ 6 & 1 - \lambda \end{bmatrix} = (1 - \lambda)(1 - \lambda) - 9 = \lambda^2 - 2\lambda - 8$$

$$D = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-8) = 4 + 32 = 36$$

$$\lambda = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{2 \pm \sqrt{36}}{2 \cdot 1} = \frac{2 \pm 6}{2} = 1 \pm 3 = \begin{cases} -2 \\ 4 \end{cases}$$

$$\lambda_1 = -2 \quad \text{og} \quad \lambda_2 = 4$$

Spørgsmål 2:

En lineær afbildning $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ har mht. standardbasis, afbildningsmatricen A :

$$A = \begin{bmatrix} -27 & 8 \\ -112 & 33 \end{bmatrix}$$

Desuden oplyses at $\lambda = 5$ er egenverdi for f :

Angiv en egentlig egenvektor hørende til denne egenverdi:

$v =$

Svar:

$$\begin{bmatrix} -27 - 5 & 8 & 0 \\ -112 & 33 - 5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -32 & 8 & 0 \\ -112 & 28 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \text{trap} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$v_1 = \frac{1}{4} \cdot v_2$$

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = t \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Spørgsmål 3:

En 3x3 matrix A er givet ved:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \\ -4 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

Angiv nedenfor koefficienterne til det karakteristiske polynomium p :

$$p(\lambda) = -\lambda^3 + a \cdot \lambda^2 + b \cdot \lambda + c$$

$$a =$$

$$b =$$

$$c =$$

Svar:

$$\begin{aligned} \det \begin{bmatrix} 5-\lambda & 0 & 0 \\ 6 & 2-\lambda & 0 \\ -4 & 0 & 6-\lambda \end{bmatrix} &= (5-\lambda)(2-\lambda)(6-\lambda) = (\lambda^2 - 7\lambda + 10)(6-\lambda) \\ &= -\lambda^3 + 6\lambda^2 + 7\lambda^2 - 42\lambda - 10\lambda + 60 = -\lambda^3 + 13\lambda^2 - 52\lambda + 60 \\ a &= 13, \quad b = -52 \quad \text{og} \quad c = 60 \end{aligned}$$

Spørgsmål 4:

En matrix A er givet nedenfor:

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$$

Hvilken er de 2 nedenstående matricer B og C er similær med A ?

$$B = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 8 & 5 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 10 & 8 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Svar:

Her skal man sammenligne matricernes diagonaler. Hvis summen af tallene i diagonalen giver det samme, så er matricerne similære. Det vil sige, at C er similær med A , da de begge har summen 12 i diagonalen.

Spørgsmål 5:

Om en lineær afbildning $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ oplyses følgende:

$$f(v_1) = v_2 \quad \text{og} \quad f(v_2) = 4 \cdot v_1$$

Marker nedenfor den vektor som er en egenvektor for f .

$$4 \cdot v_1 + 3 \cdot v_2$$

$$4 \cdot v_1 + 2 \cdot v_2$$

Angiv den tilhørende egen værdi nedenfor:

$\lambda =$

Svar:

Først opstilles en matrix med vektorernes billeder:

$$[f(v_1) \ f(v_2)] = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

De to vektorer ganges enkeltvist med matrixen, og man undersøger, om der findes et tal, λ , der kan ganges med egenvektoren således at: $f(v) = \lambda \cdot v$. En anden måde at sige det på: givet en $n \times n$

matrix A findes der λ og v således at: $A \cdot v = \lambda \cdot v$

$$\begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 4 \end{bmatrix}$$
$$\lambda \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 12 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Der undersøges for den anden vektor:

$$\begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \end{bmatrix} = 2 \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Dette er altså en egenvektor med den tilhørende egen værdi $\lambda = 2$

Spørgsmål 6:

Lad A være en vilkårlig singulær 2×2 matrix.

Hvilke af nedenstående påstande er sande?

- A er similær med en invertibel matrix.
- En af egen værdierne for A er lig med nul.
- Det homogene lineære ligningssystem som har A som koefficientmatrix har kun en løsning.
- Determinanten af A er lig nul ($\det(A) = 0$).

Svar:

- En af egen værdierne for A er lig med nul.
- Determinanten af A er lig nul ($\det(A) = 0$).

Spørgsmål 7:

Om en kvadratisk matrix oplyses at den har 3 forskellige egen værdier ($\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$) og en karakterligning som er givet ved:

$$\lambda^8 \cdot (\lambda - 7)^4 \cdot (\lambda + 7)^6 = 0$$

Angiv nedenfor egen værdierne samt deres algebraiske multipliciteter (am).

$$\lambda_1 = \quad \text{og} \quad am(\lambda_1) =$$

$$\lambda_2 = \quad \text{og} \quad am(\lambda_2) =$$

$$\lambda_3 = \quad \text{og} \quad am(\lambda_3) =$$

Svar:

Man bruger nul-reglen og potensen angiver algebraisk multiplicitet:

$$\lambda_1 = -7 \quad \text{og} \quad am(\lambda_1) = 6$$

$$\lambda_2 = 0 \quad \text{og} \quad am(\lambda_2) = 8$$

$$\lambda_3 = 7 \quad \text{og} \quad am(\lambda_3) = 4$$

Spørgsmål 8:

En lineær afbildning $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ har mht. Standardbasis, afbildningsmatricen A :

$$A = \begin{bmatrix} 11 & -3 \\ 18 & -4 \end{bmatrix}$$

Desuden at nedenstående vektorer er egenvektorer for f :

$$v_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 9 \end{pmatrix} \quad \text{og} \quad v_2 = \begin{pmatrix} 10 \\ 20 \end{pmatrix}$$

Lad v_1 og v_2 være første og anden søjle i en matrix V .

Angiv en diagonalmatrix D således: $V^{-1} \cdot A \cdot V = D$

$$D =$$

Svar:

Diagonalmatricen har egenverdierne i diagonalen, derfor findes egenverdierne ved at gange de to vektorer på A :

$$\begin{bmatrix} 11 & -3 \\ 18 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 33 - 27 \\ 54 - 36 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 18 \end{bmatrix} = 2 \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 9 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \lambda_1 = 2$$

$$\begin{bmatrix} 11 & -3 \\ 18 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 110 - 60 \\ 180 - 80 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \\ 100 \end{bmatrix} = 5 \cdot \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \lambda_2 = 5$$

Diagonalmatricen er dermed:

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Spørgsmål 9:

Givet en matrix A og en diagonalmatrix D :

$$A = \begin{bmatrix} 7 & -10 \\ 0 & 9 \end{bmatrix} \quad \text{og} \quad D = \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}$$

Angiv en invertibel matrix V således: $V^{-1} \cdot A \cdot V = D$

$V =$

Svar:

Søjlerne i V består af egenvektorerne, som findes ved at trække egenverdierne fra i diagonalen i A , og derefter udføre GaussJordan-elimination. Egenverdierne kan aflæses i diagonalmatricen D .

$$\lambda_1 = 7 \quad \text{og} \quad \lambda_2 = 9$$

$$\begin{bmatrix} 7-7 & -10 \\ 0 & 9-7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -10 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{1}{5} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad x_2 = 0$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = t \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7-9 & -10 \\ 0 & 9-9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -10 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad x_1 = -5x_2$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} -5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Det vil sige, at den invertible matrix V er:

$$V = \begin{bmatrix} 1 & -5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Spørgsmål 10:

Lad $C^\infty(\mathbb{R})$ betegne mængden af glatte funktioner.

Vi betragter den lineære afbildning $f: C^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R})$, som er givet ved:

$$f(x(t)) = x''(t)$$

Match nedenstående egenfunktioner med tilhørende egenverdi?

$$\exp(2x), \quad \exp(-x), \quad \exp(2i \cdot x), \quad x^4, \quad 5x + 1, \quad \cos(x)$$

1. 4
2. Er ikke egenfunktion for f
3. -4
4. 1
5. 0
6. -1

Svar:

Hver af funktionerne differentieres to gange:

$$(\exp(2x))' = 2 \cdot \exp(2x) \Rightarrow (2 \cdot \exp(2x))' = 4 \cdot \exp(2x) \Leftrightarrow \lambda = 4$$

$$(\exp(-x))' = \exp(-x) \Rightarrow (\exp(-x))' = \exp(-x) \Leftrightarrow \lambda = 1$$

$$(\exp(2i \cdot x))' = 2i \cdot \exp(2i \cdot x) \Rightarrow (2i \cdot \exp(2i \cdot x))' = -4 \cdot \exp(2i \cdot x) \Leftrightarrow \lambda = -4$$

$$(x^4)' = 4x^3 \Rightarrow (4x^3)' = 12x^2 \Leftrightarrow \text{er ikke en egenfunktion}$$

$$(5x + 1)' = 5 \Rightarrow (5)' = 0 \Leftrightarrow \lambda = 0$$

$$(\cos(x))' = -\sin(x) \Rightarrow (-\sin(x))' = -\cos(x) \Leftrightarrow \lambda = -1$$

Uge 11: Symmetriske matricer

Spørgsmål 1:

Lad $v_1 = (9, 1, -2, 0)$ og $v_2 = (-1, 2, 5, 12)$ være to vektorer i \mathbb{R}^4 .

Angiv skalarproduktet af de to vektorer:

$$v_1 \cdot v_2 =$$

Svar:

$$v_1 \cdot v_2 = \begin{bmatrix} 9 \\ 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 5 \\ 12 \end{bmatrix} = 9 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 + (-2) \cdot 5 + 0 \cdot 12 = -9 + 2 - 10 = -17$$

Spørgsmål 2:

Lad A være en symmetrisk matrix.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 6 & a & 8 \\ d & 2 & b & 6 \\ 4 & 2 & 3 & 6 \\ 8 & 6 & c & 4 \end{bmatrix}$$

Angiv nedenfor værdierne af konstanterne a , b , c og d :

Svar:

I en symmetrisk matrix er diagonalen et spejl.

$$a = 4, \quad b = 2, \quad c = 6, \quad d = 6$$

Spørgsmål 3:

$$\text{Lad } v_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \end{bmatrix} \text{ og } v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ være to ortonormale vektorer i } \mathbb{R}^3.$$

Bestem den ukendte vektor v_3 i nedenstående krydsprodukt

$$v_1 \times v_3 = v_2$$

Svar:

$$v_1 \times v_3 = v_2 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \det \begin{bmatrix} 0 & x_2 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & x_3 \end{bmatrix} \\ \det \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & x_3 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & x_1 \end{bmatrix} \\ \det \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & x_1 \\ 0 & x_2 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 0 \cdot x_3 - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot x_2 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot x_1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot x_3 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot x_2 - 0 \cdot x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Man har altså tre ligninger med tre ubekendte:

$$\begin{aligned} -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot x_2 &= 0 \Leftrightarrow x_2 = 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot x_1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot x_3 &= 1 \Leftrightarrow x_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{og} \quad x_3 = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot x_2 &= 0 \Leftrightarrow x_2 = 0 \end{aligned}$$

Altså ser v_3 således ud:

$$v_3 = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

(Det er det rigtige svar, men testen vil ikke acceptere det).

Spørgsmål 4:

Lad Q betegne en ortogonal $n \times n$ matrix.

Hvilke af nedenstående matricer er ortogonale?

- $\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$
- $Q + Q$
- $Q \cdot Q^T$

- Q^2

Svar:

- $\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$
- $Q \cdot Q^T$
- Q^2

Spørgsmål 5:

Lad $v_1 = (-5, 4, 27, 1)$, $v_2 = (5, 0, 1, -1)$ og $v_3 = (-1, 1, -1, 1)$ være tre vektorer i \mathbb{R}^4 .

Bestem længden af $v_2 + v_3$:

$$|v_2 + v_3| =$$

Bestem projektionen af vektor v_1 på v_2 :

$$\text{proj}(v_1, v_2) =$$

Svar:

Længden bestemmes:

$$v_2 + v_3 = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$|v_2 + v_3| = \sqrt{4^2 + 1^2} = \sqrt{17}$$

Herefter udregnes projektionen:

$$\text{proj}(v_1, v_2) = \frac{v_1 \cdot v_2}{|v_2|^2} \cdot v_2 = \frac{\begin{bmatrix} -5 \\ 4 \\ 27 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}}{\sqrt{5^2 + 1^2 + (-1)^2}^2} \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{27} \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{27} \\ 0 \\ \frac{1}{27} \\ -\frac{1}{27} \end{bmatrix}$$

Spørgsmål 6:

Givet en symmetrisk matrix A og en diagonalmatrix D :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -\frac{1}{2}\sqrt{3} \\ -\frac{1}{2}\sqrt{3} & 1 \end{bmatrix} \quad \text{og} \quad D = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} \end{bmatrix}$$

Angiv en ortogonal matrix Q således: $Q^T \cdot A \cdot Q = D$

Svar:

Søjlerne i den ortogonale matrix Q består af egenvektorerne, og de skal derfor findes:

$$\begin{bmatrix} 2 - \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & 1 - \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \text{trap} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{\sqrt{3}}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad x_1 = \frac{\sqrt{3}}{3} x_2$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 - \frac{5}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & 1 - \frac{5}{2} & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \text{trap} = \begin{bmatrix} 1 & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad x_1 = -\sqrt{3} x_2$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} -\sqrt{3} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Det vil sige, at den ortogonale matrix er:

$$Q = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} & -\sqrt{3} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Spørgsmål 7:

Lad u_1 og u_2 være to vektorer i \mathbb{R}^4 .

$$u_1 = (6, 0, 1, 1), \quad u_2 = (1, 1, 0, 4)$$

Angiv nedenfor en egentlig vektor v som både er ortogonal på u_1 og u_2 .

Svar:

Hvis vektorer er ortogonale, skal deres prikprodukt være lig nul.

$$u_1 \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = 0 \Leftrightarrow 6x_1 + x_3 + x_4 = 0$$

$$u_2 \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = 0 \Leftrightarrow x_1 + x_2 + 4x_4 = 0$$

Man kan nu opstille en totalmatrix med de to ligninger (bemærk at de to rækker består af de to vektorer):

$$\begin{bmatrix} 6 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 4 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \text{trap} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{6} & \frac{23}{6} & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} x_1 &= -\frac{1}{6}x_3 - \frac{1}{6}x_4 \\ x_2 &= \frac{1}{6}x_3 - \frac{23}{6}x_4 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -\frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -\frac{1}{6} \\ -\frac{23}{6} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Nu kan man bare vælge én af de to vektorer.

Spørgsmål 8:

Lad A være en symmetrisk 2×2 matrix.

Det oplyses at for to egentlige enhedsvektorer v_1 og v_2 gælder følgende:

$$A \cdot v_1 = 9 \cdot v_1 \quad \text{og} \quad A \cdot v_2 = -v_2$$

Hvilket tal kan nedenstående skalarprodukt reduceres til:

$$(6 \cdot v_1 - 7 \cdot v_2) \cdot (A \cdot v_1 - A \cdot v_2) =$$

Svar:

Ud fra de to enhedsvektorer får man at vide, at A i forhold til v_1 er 9, og at A ift. v_2 er -1. Dermed kan man udregne skalarproduktet:

$$\begin{bmatrix} 6 \\ -7 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 9 \\ -(-1) \end{bmatrix} = 6 \cdot 9 - 7 \cdot 1 = 54 - 7 = 47$$

Spørgsmål 9:

Lad v være vektoren

$$v = (5, 3)$$

Lad Q være nedenstående ortogonale matrix:

$$Q = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) & -\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) & \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \end{bmatrix}$$

Desuden er der givet en diagonalmatrix:

$$\Lambda = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Bestem nedenstående vektor:

$$Q \cdot \Lambda \cdot Q^T \cdot v =$$

Svar:

$$Q = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) & -\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) & \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q \cdot \Lambda \cdot Q^T \cdot v = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ 15 \end{bmatrix}$$

Hurtig: byt om på tallene i diagonalen i Λ og gang med v .

Spørgsmål 10:

Lad $v_1 = (2,2,1)$ og $v_2 = (5,3,0)$ være vektorer i \mathbb{R}^3 .

Hvilke af nedenstående vektorer ligger i det ortogonale komplement til $\text{span}(v_1, v_2)$?

- $\begin{bmatrix} -3 \\ 5 \\ -4 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} -8 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 4 \\ 10 \\ -3 \end{bmatrix}$

Svar:

Vi skal løse:

$$x \cdot v_1 = 0 \quad \text{og} \quad x \cdot v_2 = 0$$

Vi opstiller en totalmatrix, hvor rækkerne består af de to vektorer, og udfører GaussJordan-elimination:

$$T = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \text{trap}(T) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{3}{4} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{4} & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} x_1 = \frac{3}{4}x_3 \\ x_2 = -\frac{5}{4}x_3 \end{matrix}$$

Det ortogonale komplement er:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} \frac{3}{4} \\ -\frac{5}{4} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Det vil sige, at svaret er $\begin{bmatrix} -3 \\ 5 \\ -4 \end{bmatrix}$, da man får denne vektor for $t = -4$. Man kan også hurtigt se det på fortegnene.

Uge 12: Differentialligninger (Tema 4)

Uge 13: 2. ordens differentialligninger, repetition

Spørgsmål 1:

Givet nedenstående homogene andenordens differentialligning:

$$x''(t) - 9 \cdot x'(t) + 20 \cdot x(t) = 0$$

Den fuldstændige reelle løsning er på formen:

$$x(t) = k_1 \cdot e^{a \cdot t} + k_2 \cdot e^{b \cdot t}$$

Angiv konstanterne a og b når det oplyses $a < b$.

Svar:

Man opstiller karakterligningen:

$$\lambda^2 - 9\lambda + 20 = 0$$

$$D = 9^2 - 4 \cdot 20 = 81 - 80 = 1$$

$$\lambda = \frac{9 \pm \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = \frac{9 \pm 1}{2} = 4 \vee 5$$

Spørgsmål 2:

Givet nedenstående homogene andenordens differentialligning:

$$x''(t) - 8 \cdot x'(t) + 20 \cdot x(t) = 0$$

Den fuldstændige reelle løsning er på formen:

$$x(t) = k_1 \cdot e^{a \cdot t} \cdot \cos(b \cdot t) + k_2 \cdot e^{a \cdot t} \cdot \sin(b \cdot t)$$

Angiv konstanterne a og b når det oplyses $b > 0$.

Svar:

Løsningen står på formen:

$$x(t) = k_1 \cdot e^{\alpha \cdot t} \cdot \cos(\beta \cdot t) + k_2 \cdot e^{\alpha \cdot t} \cdot \sin(\beta \cdot t)$$

Det vil sige, at $\alpha = a$ og $\beta = b$.

Jeg opstiller karakterligningen:

$$\lambda^2 - 8\lambda + 20 = 0$$

$$D = 8^2 - 4 \cdot 20 = 64 - 80 = -16 = (4i)^2$$

$$\lambda = \frac{8 \pm 4i}{2} = 4 \pm 2i$$

$$a = 4 \quad \text{og} \quad b = 2$$

Spørgsmål 3:

Om en homogen lineær andenordens differentialligning med konstante koefficienter oplyses at den fuldstændige reelle løsning er:

$$x(t) = k_1 \cdot e^t \cdot \cos(t) + k_2 \cdot e^t \cdot \sin(t)$$

Angiv konstanterne k_1 og k_2 i den partikulære løsning som opfylder:

$$x(0) = 5 \quad \text{og} \quad x'(0) = 3$$

Svar:

Først udregnes $x(0) = 5$.

$$x(0) = k_1 \cdot 1 \cdot 1 + k_2 \cdot 1 \cdot 0 = k_1 = 5$$

Nu skal den differentieres:

$$x'(t) = k_1 \cdot (e^t \cdot \cos(t) - e^t \cdot \sin(t)) + k_2 \cdot (e^t \cdot \sin(t) + e^t \cdot \cos(t))$$

Nu udregnes $x'(0) = 3$.

$$x'(0) = k_1 \cdot (1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) + k_2 \cdot (1 \cdot 0 + 1 \cdot 1) = k_1 + k_2 = 3$$

$$\Leftrightarrow 5 + k_2 = 3 \Leftrightarrow k_2 = -2$$

Spørgsmål 4:

Givet nedenstående inhomogene andenordens differentialligning:

$$x''(t) + x'(t) - 2 \cdot x(t) = 4 \cdot t + 3$$

Det oplyses at en partikulær løsning er på formen:

$$x_0 = a \cdot t + b$$

Angiv konstanterne a og b .

Svar:

Den partikulære løsning indsættes i differentialligningen:

$$(a \cdot t + b)'' + (a \cdot t + b)' - 2 \cdot (a \cdot t + b) = a - 2at - 2b = -2at + (a - 2b) = 4t + 3$$

Det vil sige at:

$$-2a = 4 \Leftrightarrow a = -2$$

$$a - 2b = 3 \Leftrightarrow -2 - 2b = 3 \Leftrightarrow -2b = 5 \Leftrightarrow b = -\frac{5}{2}$$

Spørgsmål 5:

Givet nedenstående homogene andenordens differentialligning med konstante koefficienter:

$$x''(t) + a \cdot x'(t) + b \cdot x(t) = 0$$

Det oplyses at den fuldstændige løsning er:

$$x(t) = k_1 \cdot e^{4t} \cdot \cos(6t) + k_2 \cdot e^{4t} \cdot \sin(6t)$$

Angiv konstanterne a og b :

Svar:

Det aflæses af løsningen, at egenverdierne er:

$$\lambda = 4 \pm 6 \cdot i$$

Det vil sige at:

$$\begin{aligned} (\lambda - 4 + 6i) \cdot (\lambda - 4 - 6i) &= \lambda^2 - 4\lambda - 6i\lambda - 4\lambda + 16 + 24i + 6i\lambda - 24i + 36 \\ &= \lambda^2 - 8\lambda + 52 \end{aligned}$$

Altså er:

$$a = -8 \text{ og } b = 52$$

Spørgsmål 6:

Vi betragter en homogen andenordens differentialligning med konstante koefficienter.

Karakterligningen for differentialligningen er givet ved:

$$\lambda^2 + a \cdot \lambda + b = 0$$

Det oplyses at den fuldstændige løsning er:

$$x(t) = k_1 \cdot e^{4t} + k_2 \cdot t \cdot e^{4t}$$

Angiv konstanterne a og b .

Svar:

Det aflæses af løsningen, at 4 er dobbeltrod i karakterligningen. Det vil sige at:

$$\begin{aligned} (\lambda - 4)(\lambda - 4) &= \lambda^2 - 8\lambda + 16 \\ a &= -8 \text{ og } b = 16 \end{aligned}$$

Spørgsmål 7:

Givet nedenstående homogene andenordens differentialligning.

$$x''(t) - 6 \cdot x'(t) + 9 \cdot x(t) = 0$$

Angiv den partikulære løsning $x_0(t)$, som tilfredsstiller $x(0) = 3$ og $x'(0) = 1$.

$$x_0(t) =$$

Svar:

$$\lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0$$

$$D = 6^2 - 4 \cdot 9 = 36 - 36 = 0$$

$$\lambda = \frac{6}{2} = 3 \text{ (dobbeltrap)}$$

Den fuldstændige løsning er:

$$x(t) = k_1 \cdot e^{3t} + k_2 \cdot t \cdot e^{3t}$$

Den differentieres:

$$x'(t) = k_1 \cdot 3e^{3t} + k_2 \cdot (e^{3t} + t \cdot 3e^{3t})$$

Begyndelsesbetingelserne indsættes:

$$x(0) = k_1 \cdot 1 + k_2 \cdot 0 = k_1 = 3$$

$$x'(0) = k_1 \cdot 3 + k_2 \cdot (1 + 0) = 3k_1 + k_2 = 1$$

$$\Leftrightarrow 3 \cdot 3 + k_2 = 1 \Leftrightarrow 9 + k_2 = 1 \Leftrightarrow k_2 = -8$$

Den partikulære løsning er:

$$x_0(t) = 3 \cdot e^{3t} - 8t \cdot e^{3t}$$

Spørgsmål 8:

Givet nedenstående inhomogene komplekse differentialligning med reelle koefficienter:

$$z''(t) + a \cdot z'(t) + b \cdot z(t) = e^{(t+i \cdot t)} \quad (*)$$

Det oplyses at en partikulær løsning til (*) er:

$$z_0 = (3 + 4i) \cdot e^{(t+i \cdot t)}$$

Vi betragter nu en reel differentialligning med de samme koefficienter som ovenfor:

$$x''(t) + a \cdot x'(t) + b \cdot x(t) = e^t \cdot \sin(t) \quad (**)$$

Bestem en partikulær løsning til (**) på formen:

$$x_0(t) = k_1 \cdot e^t \cdot \cos(t) + k_2 \cdot e^t \cdot \sin(t)$$

Angiv konstanterne k_1 og k_2 .

Svar:

$$k_1 = \text{Im}(3 + 4i) = 4 \text{ og } k_2 = \text{Re}(3 + 4i) = 3$$

Spørgsmål 9:

Givet differentialligningen:

$$x''(t) + x(t) = 0$$

For hvilke af nedenstående begyndelsesværdier findes der løsninger:

$$x(0) = 1 \text{ og } x''(0) = -1$$

$$x(0) = 1 \text{ og } x(2\pi) = 2$$

$$x(0) = 1 \text{ og } x'(0) = 3$$

$$x(0) = 1 \text{ og } x''(0) = 1$$

Svar:

$$x(0) = 1 \text{ og } x''(0) = -1$$

$$x(0) = 1 \text{ og } x'(0) = 3$$

Spørgsmål 10:

Givet den homogene differentialligning:

$$x''(t) + 4 \cdot x'(t) + 5 \cdot x(t) = 0$$

Desuden oplyses:

$$x(0) = 1 \text{ og } x''(0) = -2$$

Angiv $x'(0)$.

Svar:

De kendte oplysninger indsættes i differentialligningen og ligningen løses:

$$-2 + 4 \cdot x'(0) + 5 \cdot 1 = 0 \Leftrightarrow 4 \cdot x'(0) = -3 \Leftrightarrow x'(0) = -\frac{3}{4}$$