

$H = 0.13$
$r_n = |c_n|^2/|c_n|^2_{\text{fit}}$
t (frames)
$n = 1$ (median 2.2)
$n = 2$ (median 2.5)
$n = 3$ (median 0.8)
$n = 4$ (median 0.3)
$n = 5$ (median 0.5)
$n = 6$ (median 0.6)
$H = 0.14$
$r_n = |c_n|^2/|c_n|^2_{\text{fit}}$
t (frames)
$n = 1$ (median 1.6)
$n = 2$ (median 0.7)
$n = 3$ (median 1.4)
$n = 4$ (median 1.5)
$n = 5$ (median 0.6)
$n = 6$ (median 0.5)
$H = 0.15$
$r_n = |c_n|^2/|c_n|^2_{\text{fit}}$
t (frames)
$n = 1$ (median 0.3)
$n = 2$ (median 2.3)
$n = 3$ (median 2.6)
$n = 4$ (median 1.2)
$n = 5$ (median 0.6)
$n = 6$ (median 0.7)
$H = 0.16$
$r_n = |c_n|^2/|c_n|^2_{\text{fit}}$
t (frames)
$n = 1$ (median 0.7)
$n = 2$ (median 3.1)
$n = 3$ (median 0.6)
$n = 4$ (median 1.6)
$n = 5$ (median 0.8)
$n = 6$ (median 0.6)