

复旦大学技术科学大类《数学分析》  
2022-2023 学年第二学期期中考试试卷

姓 名: \_\_\_\_\_

学 号: \_\_\_\_\_

我已知悉学校与考试相关的纪律以及违反纪律的后果，并将严守纪律，不作弊，不抄袭，独立答题。

学生（签名）：

年 月 日

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一. 严格叙述定义和定理（每题 4 分，共 16 分）。

1. “光滑曲面”的定义。
2. “二元函数  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  处可微”的定义。
3. 隐函数定理（写出任意一种情形即可）。
4. Stokes 公式。

二.

计算题. 请写出计算与推导过程 (每题 8 分, 共 40 分)

1. 已知方程  $z^3 - 3xyz = 1$  在  $(x_0, y_0) = (1, 0)$  的某个邻域上确定了  $z$  关于  $(x, y)$  的隐函数. 请计算  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$  在  $(1, 0)$  处的值.

2. 设  $D = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ . 计算函数

$$f(x, y, z) = x^2 - 6xy + 12y^2 - 2yz + z^2$$

在  $D$  上的最大值和最小值.

3. 设  $D = \{(x, y, z) \mid 0 \leq z \leq x^2 + y^2 \leq 1\}$ . 计算反常重积分

$$\iiint_D \frac{dxdydz}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

4. 计算第一类曲线积分:

$$\int_L |x| \, ds,$$

其中  $L$  是双纽线  $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$ .

5. 计算第二类曲面积分:

$$\iint_S \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}},$$

其中  $S$  为椭球面  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16} = 1$ .

三. 判断题. 请判断以下说法是否正确, 并说明理由 (每题 5 分, 共 20 分, 每题判断正确得 1 分).

1. 设  $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^3$  是一个可微的向量值函数, 那么对任意两点  $(x_0, y_0)$  和  $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ , 都存在至少一个  $\theta \in (0,1)$ , 使得

$$\begin{aligned} & f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= f_x(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \Delta x + f_y(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \Delta y. \end{aligned}$$

2. 设曲面  $S$  的方程为  $z = xf\left(\frac{y}{x}\right)$  ( $x \neq 0$ ), 其中函数  $f$  具有连续的导数. 那么  $S$  上任一点处的切平面都经过一个定点.

3. 设

$$f(x, y) = \frac{x - y}{(x + y)^3},$$

那么累次积分  $\int_0^1 \left( \int_0^1 f(x, y) dx \right) dy$  和  $\int_0^1 \left( \int_0^1 f(x, y) dy \right) dx$  相等.

4. 设

$$P(x, y) = x^2 + 4y - \cos x, \quad Q(x, y) = 3x - 6y^2 + \sin y.$$

那么不存在  $\mathbf{R}^2$  上的可微函数  $R(x, y)$ , 使得  $\nabla R = (P, Q)$ .

四. 证明题 (每题 12 分. 无论是否做出某一小题, 在做后面的小题时均可直接使用之前小题的结果. 本大题共 24 分.)

1. (每小题 6 分) 设  $D \subset \mathbf{R}^2$  为开集.

- (1) 举例说明: 存在定义在  $D$  上的函数  $f(x, y)$  处处可偏导, 但并非处处可微.
- (2) 证明: 如果定义在  $D$  上的函数  $f(x, y)$  处处可偏导并且偏导数处处连续, 那么  $f(x, y)$  处处可微.

2. (每小题 3 分) 设  $D = \{(x, y) \mid 1 < \sqrt{x^2 + y^2} < 4\}$ .

(1) 证明:

$$\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = 42\pi.$$

(2) 考虑映射  $T(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$ , 其中

$$x(u, v) = u^2 - v^2, \quad y(u, v) = 2uv.$$

设  $E = \{(u, v) \mid 1 < \sqrt{u^2 + v^2} < 2\}$ , 证明  $T(E) = D$ .

(3) 证明:

$$\iint_E \sqrt{x(u, v)^2 + y(u, v)^2} \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv = 84\pi.$$

(4) 如果重积分的变量代换公式对于映射  $T$  成立, 那么 (1) 和 (3) 中的重积分应该相等, 但实际上并非如此. 请说明这两个重积分的关系并给出解释.