

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

一、严格表述题（每题 3 分，共 4 题，共 12 分）

1. 函数极限 “ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ ” 不成立。

2. 函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 可微分。

3. 函数 $y = f(x)$ 在有限闭区间 $[a, b]$ 上 Riemann 可积。

4. 关于反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 的柯西收敛原理

二、填空题（每题 4 分，共 6 题，共 24 分）

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sin \sin \cdots \sin}_n x = \underline{\hspace{2cm}}$, 其中 x 是给定的任意实数。
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^8 + 1) \ln(1 + 5x \sin(2x^2))}{(e^{2x} - 1) \cos 8x \tan^2 x} = \underline{\hspace{2cm}}.$
3. 假设隐函数方程 $e^{xy} - y \sin(x-1) = \cos 2(x-1)$ 所确定的函数是 $y = y(x)$, 则其导函数在点 $x = 1$ 的值 $y'(1) = \underline{\hspace{2cm}}.$
4. $y = \frac{1}{x^2 - 2x - 8}$, $y^{(n)} = \underline{\hspace{4cm}}.$
5. 设 $f(x) = \int_{x^2}^{e^x} \sin(u^2) du$, 则 $f'(x) = \underline{\hspace{4cm}}.$
6. 设 n 是自然数, 则 $\int_0^1 \left(\ln \frac{1}{x}\right)^n dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、判断简答题（判断下列命题是否正确，如果正确的，请回答“是”，并给予简要证明；如果错误的，请回答“否”，并给出反例与简单的说明。答“是或否”2分，证明或举反例并说明4分）（每题6分，共4题，共24分）

1. 假设 $a_1 < a_2 < \cdots < a_n < \cdots$ ，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ ，若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n}$ 不存在，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n}$ 也不存在。

2. 有限开区间 (a, b) 上的两个一致连续函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的乘积必是此区间上的一致连续函数。

3. 若 $f'_-(x_0) < 0$, $f'_+(x_0) > 0$, 则存在 x_0 的一个 δ -邻域 $O(x_0, \delta) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 使得 $f(x) \leq f(x_0)$, 对于 $\forall x \in O(x_0, \delta)$ 成立。

4. 假设 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f^2(x)dx$ 也收敛。

四、计算题（共 6 题，每题 5 分，共 30 分）

1. 求: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (\sqrt{1+\frac{1}{n}} + \sqrt{1+\frac{2}{n}} + \cdots + \sqrt{1+\frac{n-1}{n}} + \sqrt{1+\frac{n}{n}})$

2. 求: $\lim_{x \rightarrow +\infty} ((x^3 - x^2 + \frac{x}{2})e^{\frac{1}{x}} - \sqrt{x^6 + 1})$

3. 假设 $y = (x+1)^4 + e^x$, 请计算保凸区间（上凸或者下凸区间）及拐点。

4. 已知隐函数方程 $\tan(x+y)-y=0$, 求 dy , d^2y 。

5. $\int_0^1 \frac{\arcsin x}{x} dx$

6. 对于实参数 p , 讨论反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 的敛散性 (绝对收敛、条件收敛、发散)。

五、证明题（共两题，10分）

1. 假设函数 f 在有限闭区间 $[a, b]$ 上黎曼可积，且在点 x_0 连续，其中 $x_0 \in (a, b)$ ，令

$F(x) = \int_a^x f(u)du$ ，证明： $F(x)$ 在点 x_0 处可导，且 $F'(x_0) = f(x_0)$ 。（5分）

2. 假设 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 上具有三阶连续导数, $f(x+h) = f(x) + hf'(x+\theta h)$, $0 < \theta < 1$, $x, x+h \in (a,b)$, 且 θ 与 h 无关, 证明: 在开区间 (a,b) 上 $f'''(x) \equiv 0$ 。(5分)