

Programare logică și funcțională - examen scris -

Notă

1. Subiectele se notează astfel: of - 1p; A - 1.5p; B - 2.5p; C - 2.5p; D - 2.5p.
2. Problemele Prolog vor fi rezolvate în SWI Prolog. Se cere: (1) explicarea codului și a raționamentului; (2) modelul recursiv de rezolvare, pentru fiecare predicat folosit; (3) specificarea fiecărui predicat (semnificația parametrilor, model de flux, tipul predicatului - determinist/nedeterminist).
3. Problemele Lisp vor fi rezolvate în Common Lisp. Se cere: (1) explicarea codului și a raționamentului; (2) modelul recursiv de rezolvare, pentru fiecare funcție folosită; (3) specificarea fiecărei funcții (semnificația parametrilor).

A. Fie următoarea definiție de funcție LISP

```
(DEFUN Fct(F L)
  (COND
    ((NULL L) NIL)
    (((FUNCALL F (CAR L)) (CONS (FUNCALL F (CAR L)) (Fct F (CDR L)))))
    (T NIL)
  )
)
```

Rescrieți această definiție pentru a evita dublul apel recursiv (**FUNCALL F (CAR L)**). Nu redefiniți funcția. Nu folosiți SET, SETQ, SETF. Justificați răspunsul.

- B.** Dându-se o listă eterogenă formată din numere și liste liniare nevide de numere, se cere un program SWI-PROLOG care inversează acele subliste în care cel mai mic multiplu comun al elementelor este mai mare decât pătratul primului element al sublistei. **De exemplu,** pentru lista `[[4, 1, 18], 7, 2, -3, [6, 9, 11, 3], 4, [9, 4, 3]]`, rezultatul corect este: `[[18, 1, 4], 7, 2, -3, [3, 11, 9, 6], 4, [9, 4, 3]]`.

- C. Să se scrie un program PROLOG care generează lista submulțimilor cu valori din intervalul $[a, b]$, având număr par de elemente pare și număr impar de elemente impare. Se vor scrie modelele matematice și modelele de flux pentru predicatele folosite.

Exemplu- pentru $a=2$ și $b=4 \Rightarrow [[2,3,4]]$

D. Un arbore n-ar se reprezintă în LISP astfel (nod subarbore1 subarbore2)

Se cere să se înlocuiască nodurile de pe nivelul **k** din arbore cu o valoare **e** dată. Nivelul rădăcinii se consideră a fi 0.

Se va folosi o funcție MAP.

Exemplu pentru arborele (a (b (g)) (c (d (e)) (f))) și **e=h**

- a) $k=2 \Rightarrow (a (b (h)) (c (h (e)) (h)))$
- b) $k=4 \Rightarrow (a (b (g)) (c (d (e)) (f)))$