

Programare logică și funcțională

- examen scris -

Notă

1. Subiectele se notează astfel: of - 1p; A - 1.5p; B - 2.5p; C - 2.5p; D - 2.5p.
2. Problemele Prolog vor fi rezolvate în SWI Prolog. Se cere: (1) explicarea codului și a raționamentului; (2) modelul recursiv de rezolvare, pentru fiecare predicat folosit; (3) specificarea fiecărui predicat (semnificația parametrilor, model de flux, tipul predicatului - determinist/nedeterminist).
3. Problemele Lisp vor fi rezolvate în Common Lisp. Se cere: (1) explicarea codului și a raționamentului; (2) modelul recursiv de rezolvare, pentru fiecare funcție folosită; (3) specificarea fiecărei funcții (semnificația parametrilor).

A. Fie următoarea definiție de predicat PROLOG **f(integer, integer)**, având modelul de flux (i, o):

$f(0, -1):-!$.

$f(I,Y):-J \text{ is } I-1, \underline{f(J,V)}, V>0, !, K \text{ is } J, Y \text{ is } K+V.$

$f(I,Y):-J \text{ is } I-1, \underline{f(J,V)}, Y \text{ is } V+I.$

Rescrieți această definiție pentru a evita apelul recursiv **f(J,V)** în ambele clauze. Nu redefiniți predicatul. Justificați răspunsul.

- B.** Dându-se o listă neliniară conținând atât atomi numerici cât și nenumeriți, să se scrie un program LISP care construiește o listă conținând ca subliste atomii nenumeriți de pe fiecare nivel al listei inițiale (prima sublistă a rezultatului conține atomii nenumeriți de la primul nivel, a doua sublistă atomii nenumeriți de la nivelul al doilea etc.). **De exemplu,** pentru lista (A B 12 (5 D (A F (10 B) D (5 F) 1)) C 9 (F 4 (D) 9 (F (H 7) K) (P 4)) X) rezultatul va fi ((A B C X) (D F) (A F D D F K P) (B F H)).

C. Să se scrie un program PROLOG care generează lista submulțimilor de sumă **S** dată, cu elementele unei liste, astfel încât numărul elementelor pare din submulțime să fie par. **Exemplu** pentru lista [1, 2, 3, 4, 5, 6, 10] și **S**=10 \Rightarrow [[1,2,3,4], [4,6]].

D. Se dă o listă neliniară și se cere înlocuirea valorilor numerice pare cu numărul natural succesor. **Se va folosi o funcție MAP.**

Exemplu pentru lista (1 s 4 (2 f (7))) va rezulta (1 s 5 (3 f (7))).