

# Contagem

## Lista

**1.**

Temos 5 sabores de sorvete, 3 acompanhamentos e 2 coberturas.

Pelo princípio multiplicativo, o total de combinações é  $5 \cdot 3 \cdot 2 = 30$ .

**2.**

Excluindo das possibilidades os sorvetes de morango e chocolate e as raspas de chocolate, temos 3 sabores, 2 acompanhamentos e 2 coberturas.

Pelo princípio multiplicativo, o total de combinações é  $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$ .

**3.**

Para o número ser menor que 600, o primeiro dígito só pode ser 2 ou 4. Os demais dígitos podem ser qualquer um dos 4 algarismos.

Pelo princípio multiplicativo, temos  $2 \cdot 4 \cdot 4 = 32$  números.

**4.**

Os conectivos lógicos binários relacionam duas proposições, dependendo do valor lógico de cada uma. A tabela-verdade de um conectivo binário pode ser representada da seguinte maneira:

$p$	$q$	$p \bullet q$
V	V	X
V	F	X
F	V	X
F	F	X

em que  $\bullet$  representa o conectivo e X é o valor lógico, que pode ser V ou F.

Temos, então, 2 possibilidade (V ou F) para cada X. Assim, a quantidade de tabelas verdades distintas que podemos montar é, pelo princípio multiplicativo,  $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$ . Como cada tabela representa 1 conectivo, temos 16 conectivos.

## 5.

### a)

O primeiro dígito do número só não pode ser 0, logo, temos 9 possibilidades para ele. Não ha restrições para o segundo dígito, então temos 10 possibilidades. Já o último dígito só pode ser 0 ou 5, para que o número seja divisível por 5.

Portanto, temos  $9 \cdot 10 \cdot 2 = 180$  números.

### b)

O total de números com 3 dígitos é  $9 \cdot 10 \cdot 10 = 900$ .

Portanto, como 180 destes números são divisíveis por 5, o total de números não divisíveis por 5 é  $900 - 180 = 720$ .

### c)

Para um número ser divisível por 4, se o dígito das dezenas for par, o dígito das unidades deve ser 0, 4 ou 8. Se o dígito das dezenas for ímpar, o dígito das unidades deve ser 2 ou 6.

Caso dígito das dezenas par:

Temos 5 possibilidades de dígitos pares para as dezenas e 3 possibilidades para as unidades. Logo, temos  $9 \cdot 5 \cdot 3 = 135$  números.

Caso dígito das dezenas ímpar:

Temos 5 possibilidades de dígitos ímpares para as dezenas e 2 possibilidades para as unidades. Logo, temos  $9 \cdot 5 \cdot 2 = 90$  números.

Portanto, no total temos  $135 + 90 = 225$  números.

**d)**

Pelo princípio da inclusão e exclusão a cardinalidade do conjunto  $4 \cup 5$  (números divisíveis por 4 ou 5) é dada por  $|4|$  (quantidade de números divisíveis por 4) +  $|5|$  (quantidade de números divisíveis por 5) -  $|4 \cap 5|$  (quantidade de números divisíveis por 4 e 5).

Um número só é divisível por 4 e 5 se for terminado em 0, pois nenhum número terminado em 5 é divisível por 4. E, para ser divisível por 4, o número terminado em 0 deve ter o dígito das dezenas par.

Então, o valor de  $|4 \cap 5|$  é  $9 \cdot 5 \cdot 1 = 45$ .

$$\text{Então, } |4 \cup 5| = |4| + |5| - |4 \cap 5| = 180 + 225 - 45 = 360.$$

**e)**

Conforme calculado no item d, temos 45 números divisíveis por 4 e 5.

**f)**

Como temos 900 números com 3 dígitos e, destes, 360 são divisíveis por 4 ou 5, a quantidade de não números não divisíveis por nenhum dos dois é  $900 - 360 = 540$ .

**6.**

**a)**

Cada bit tem 2 possibilidades de valores (0 ou 1). Logo, o total de sequências de 8 bits é  $2^8 = 256$ .

**b)**

O primeiro e o último bit só têm uma possibilidade de valor, logo, o total de sequências é  $1 \cdot 2^6 \cdot 1 = 64$ .

**c)**

A quantidade de sequências que começam ou terminam em 0 é dada pela quantidade que começa com 0 + quantidade que termina com 0 - quantidade que começa e termina com 0.

Total de sequências que começam com 0:  $1 \cdot 2^7 = 128$ .

Total de sequências que terminam com 0:  $2^7 \cdot 1 = 128$ .

Portanto, a quantidade que começa ou termina com 0 é  $128 + 128 - 64 = 192$ .

**d)**

O segundo bit só tem uma possibilidade de valor, logo, o total de sequências é  $2 \cdot 1 \cdot 2^6 = 128$ .

**e)**

Os 3 primeiros bits só têm uma possibilidade de valor, logo, o total de sequências é  $1^3 \cdot 2^5 = 32$ .

**f)**

A quantidade de possíveis lugares para o 0 na sequência é 8, logo, só existem 8 sequências com apenas um 0.

**g)**

Começam com 10:  $1^2 \cdot 2^6 = 64$ .

Têm 0 como terceiro dígito:  $2^2 \cdot 1 \cdot 2^5 = 128$ .

Começam com 100 (satisfazem as duas condições):  $1^3 \cdot 2^5 = 32$ .

Começam com 10 ou têm 0 como terceiro dígito:  $64 + 128 - 32 = 160$ .

**h)**

Para a sequência ser um palíndromo, os últimos 4 bits não podem ser escolhidos aleatoriamente. Definidos os 4 primeiros, os 4 últimos só têm uma possibilidade.

Portanto, o total de sequências é  $2^4 \cdot 1^4 = 16$ .

**7.**

Cada questão de múltipla escolha tem 4 respostas possíveis, logo, o total de possibilidades para as respostas destas questões é  $4^{20}$ .

Cada questão adicional tem 5 respostas possíveis, logo, o total de possibilidades para as respostas destas questões é  $5^{10}$ .

Como a folha de respostas contém as respostas de todas as questões, o total de possibilidades para ela é  $4^{20} \cdot 5^{10} \approx 1,0737418 \cdot 10^{19}$

**8.**

Supondo que o BASIC não diferencie maiúsculas e minúsculas.

Identificadores de 1 letra: 26. Letra + dígito:  $26 \cdot 10 = 260$ .

Total:  $26 + 260 = 286$ .

**9**

**a)**

A quantidade de estudantes que têm apenas bicicleta é dada por  $|B| - |B \cap C| - |B \cap M| + |B \cap C \cap M| = 97 - 53 - 7 + 2 = 39$ .

**b)**

A quantidade de estudantes que não têm nenhum dos três é dada pelo total de alunos menos a quantidade de alunos que possuem algum dos meios de transporte ( $|B \cup M \cup C|$ ).

Pelo princípio da inclusão e exclusão, temos:

$|B \cup M \cup C| = |B| + |M| + |C| - |B \cap M| - |B \cap C| - |M \cap C| + |B \cap M \cap C| = 97 + 28 + 83 - 7 - 53 - 14 + 2 = 136$ .

Logo, o total de estudantes que não têm nenhum dos três é  $150 - 136 = 14$ .

## 10.

a)

O total de produtos é 19, ou seja,  $|H \cup G \cup P| = 19$ .

Pelo princípio da inclusão e exclusão temos:  $|H \cup G \cup P| = |H| + |G| + |P| - |H \cap G| - |H \cap P| - |G \cap P| + |G \cap H \cap P|$ .

Ou seja,  $19 = 12 + 10 + 11 - 5 - 6 - 5 + |G \cap H \cap P|$ .

Com essa conta, obtemos que o número de produtos que anunciam as três propriedades é 2.

b)

Os produtos que anunciam refrescar o hálito, mas não anunciam reduzir a formação de placas incluem aqueles que anunciam somente refrescar o hálito e aqueles que anunciam somente refrescar o hálito e prevenir a gengivite.

O número de produtos que anunciam somente que refrescam o hálito é  $|H| - |H \cap G| - |H \cap P| + |H \cap G \cap P| = 12 - 5 - 6 + 2 = 3$ .

O número de produtos que anunciam somente que refrescam o hálito e previnem a gengivite é  $|H \cap G| - |H \cap G \cap P| = 5 - 2 = 3$ .

O total de produtos que anunciam refrescar o hálito, mas não anunciam reduzir a formação de placas é  $3 + 3 = 6$ .

## 11.

Não, pois utilizando o princípio da inclusão e exclusão a partir dos números apresentados na tabela, a amostra seria de:

$(425 + 397 + 340) - (284 + 315 + 219) + 147 = 491$  consumidores, e não de 450 como a empresa de pesquisa informou.

**12.**

$$|A \cup B \cup C \cup D| = |A| + |B| + |C| + |D| - |A \cap B| - |A \cap C| - |A \cap D| - |B \cap C| - |B \cap D| - |C \cap D| + |A \cap B \cap C| + |A \cap B \cap D| + |A \cap C \cap D| + |B \cap C \cap D| - |A \cap B \cap C \cap D|.$$

**13.**

Existem 4 naipes no baralho, logo, pelo princípio das casas dos pombos, para se obter pelo menos duas do mesmo naipe é necessário tirar 5 cartas.

**14.**

Pelo princípio das casas dos pombos, para se obter ao menos dois nomes de pessoas do mesmo sexo é necessário selecionar 3 nomes.

**15.**

Pares cuja soma resulta em 7:  $\{1, 6\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}$ . Como há 3 pares resultando em 7 sendo que não há repetição de nenhum elemento de  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  em pares diferentes, então podemos utilizar o princípio das casas dos pombos com os 3 conjuntos de pares.

Logo, garante-se que, com 4 elementos, ao menos uma das casas terá dois itens, somando 7, portanto.

**16.**

Utilizando o mesmo raciocínio do exercício anterior, teremos os seguintes pares que somam 22:  $\{2, 20\}, \{4, 18\}, \{6, 16\}, \{8, 14\}, \{10, 12\}$ .

Como há 5 possíveis pares para somar 22, 6 números devem ser extraídos para garantir a soma.