

1. INTRODUÇÃO

1.1. **Sobre o Trabalho.**

1.2. **Notação.**

1.3. **Matrizes.** Explicar o que são matrizes online e offline.

1.4. **Implementações.** Explicar os padrões que estou usando pra implementar os programas. Por exemplo: Funções como argumentos, 0-index (em contraste com o 1-index do pseudo-código) e wrappers.

2. MONOTONICIDADE, CONVEXIDADE E MATRIZES MONGE

Aqui serão apresentados e explorados os conceitos de monotonicidade, convexidade e matrizes Monge, além disso, alguns resultados referentes a estes conceitos serão demonstrados. Estes conceitos são fundamentais para o desenvolvimento do restante do trabalho.

Definição 2.1 (Vetor monótono). *Seja $a \in \mathbb{Q}^n$ um vetor, a é dito monótono quando vale uma das propriedades abaixo.*

- Se para todo $i, j \in [n]$, $i < j \Rightarrow a_i \leq a_j$, a é dito monótono crescente (ou só crescente).
- Se para todo $i, j \in [n]$, $i < j \Rightarrow a_i \geq a_j$, a é dito monótono decrescente (ou só decrescente).

Sabemos que a monotonicidade de vetores pode ser aproveitada para agilizar alguns algoritmos importantes, por exemplo, a busca binária pode ser interpretada como uma otimização da busca linear para vetores monótonos.

Definição 2.2 (Função convexa). *Seja $g : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ uma função,*

- se para todo par de pontos $x, y \in \mathbb{Q}$ e $\lambda \in \mathbb{Q}$ que respeita $0 \leq \lambda \leq 1$, vale $g(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda g(x) + (1 - \lambda)g(y)$, g é dita convexa e
- se para todo par de pontos $x, y \in \mathbb{Q}$ e $\lambda \in \mathbb{Q}$ que respeita $0 \leq \lambda \leq 1$, vale $g(\lambda x + (1 - \lambda)y) \geq \lambda g(x) + (1 - \lambda)g(y)$, g é dita côncava.

Eu uso isso lá no final do capítulo, quis despoluir lá na frente.

Proposição 2.3. *A função $g(x) = x^2$ é convexa.*

Demonstração. Sejam $x, y, \lambda \in \mathbb{Q}$ onde vale $0 \leq \lambda \leq 1$. Queremos provar $(\lambda x + (1 - \lambda)y)^2 \leq \lambda x^2 + (1 - \lambda)y^2$, isso equivale a

$$\begin{aligned} \lambda^2 x^2 + (1 - \lambda)^2 y^2 + 2\lambda(1 - \lambda)xy &\leq \lambda x^2 + (1 - \lambda)y^2, \text{ ou seja} \\ (\lambda^2 - \lambda)(x^2) + ((1 - \lambda)^2 - (1 - \lambda))y^2 + 2(\lambda - \lambda^2)xy &\leq 0, \text{ que é} \\ (\lambda^2 - \lambda)(x^2 + y^2 - 2xy) = (\lambda^2 - \lambda)(x + y)^2 &\leq 0. \end{aligned}$$

□

É interessante definir convexidade também em termos de vetores.

Definição 2.4 (Vetor convexo). *Seja $a \in \mathbb{Q}^n$ um vetor,*

- se para todo $i, j, k \in [n]$, $i < j < k \Rightarrow a_j \leq \frac{(j-k)a_i + (i-j)a_k}{i-k}$, a é dito convexo e
- se para todo $i, j, k \in [n]$, $i < j < k \Rightarrow a_j \geq \frac{(j-k)a_i + (i-j)a_k}{i-k}$, a é dito côncavo.

Assim como a monotonicidade, a convexidade também é usualmente explorada para agilizar algoritmos, por exemplo, se um vetor é convexo podemos definir o valor mínimo do vetor com uma busca ternária ao invés de percorrer todo o vetor.

Definição 2.5. *Seja $A \in \mathbb{Q}^{n \times m}$, definimos quatro vetores a seguir.*




FIGURA 2.6. Comportamento dos vetores de índices ótimos em relação à convexidade.

- O vetor de índices de máximos das linhas de A guarda na posição i o número $\max\{j \in [m] \mid A[i][j] \geq A[i][j'] \text{ para todo } j' \in [m]\}$.
- O vetor de índices de mínimos das linhas de A guarda na posição i o número $\min\{j \in [m] \mid A[i][j] \leq A[i][j'] \text{ para todo } j' \in [m]\}$.
- O vetor de índices de máximos das colunas de A guarda na posição j o número $\max\{i \in [n] \mid A[i][j] \geq A[i'][j] \text{ para todo } i' \in [n]\}$.
- O vetor de índices de mínimos das colunas de A guarda na posição j o número $\min\{i \in [n] \mid A[i][j] \leq A[i'][j] \text{ para todo } i' \in [n]\}$.

Note que o máximo de uma linha (ou coluna) foi definido como o maior índice que atinge o máximo e o de mínimo foi definido como o menor índice que atinge o mínimo. Esta escolha foi feita para simplificar o Lema 2.9.

Dada uma matriz, encontrar estes vetores é um problema central para este trabalho. Neste momento é interessante classificar algumas matrizes de acordo com propriedades que vão nos ajudar a calcular os vetores de mínimos e máximos de maneira especialmente eficiente.

A Figura 2.6 resume as relações de implicação da classificação que será realizada. Os conceitos ilustrados nela serão apresentados a seguir.

Definição 2.7 (Matriz monótona). *Seja $A \in \mathbb{Q}^{n \times m}$ uma matriz. Se A tiver o vetor de índices de máximos das linhas monótono, A é dita monótona nos máximos das linhas.*

Valem também as definições análogas para mínimos ou colunas e pode-se especificar monotonicidade crescente ou decrescente.

Definição 2.8 (Matriz totalmente monótona). *Seja $A \in \mathbb{Q}^{n \times m}$ uma matriz.*

- *Se $A[i'][j] \leq A[i'][j']$ implica $A[i][j] \leq A[i][j']$ para todo $1 \leq i < i' \leq n$ e $1 \leq j < j' \leq m$, A é monótona convexa nas linhas.*

- Se $A[i][j'] \leq A[i'][j']$ implica $A[i][j] \leq A[i'][j]$ para todo $1 \leq i < i' \leq n$ e $1 \leq j < j' \leq m$, A é monótona convexa nas colunas.
- Se $A[i'][j] > A[i][j]$ implica $A[i][j'] > A[i'][j']$ para todo $1 \leq i < i' \leq n$ e $1 \leq j < j' \leq m$, A é monótona côncava nas linhas.
- Se $A[i][j'] > A[i'][j']$ implica $A[i][j] > A[i'][j]$ para todo $1 \leq i < i' \leq n$ e $1 \leq j < j' \leq m$, A é monótona côncava nas colunas.

O motivo do uso dos termos “convexa” e “côncava” em relação a matrizes durante o texto são justificados pelo Teorema 2.15. Note que se uma matriz é totalmente monótona, todas as suas submatrizes são totalmente monótonas no mesmo sentido.

Lema 2.9. *Se $A \in \mathbb{Q}^{n \times m}$ é uma matriz totalmente monótona convexa nas linhas, toda submatriz de A é monótona decrescente nos máximos das linhas e monótona crescente nos mínimos das linhas.*

Se A é totalmente monótona côncava nas linhas, toda submatriz de A é monótona decrescente nos mínimos das linhas e monótona crescente nos máximos das linhas.

As afirmações valem identicamente em termos de colunas.

Demonstração. Considere uma matriz A totalmente monótona convexa nas linhas. Sejam i e i' índices de linhas de A onde $i < i'$. Chamamos de j o índice de máximo da linha i e de j' o índice de máximo da linha i' . Queremos provar que os máximos são decrescentes, portanto, vamos supor por absurdo que $j < j'$. Com isso, teremos $A[i][j'] < A[i][j]$ e $A[i'][j] \leq A[i'][j']$. Porém, já que A é monótona convexa nas linhas, a segunda desigualdade implica em $A[i][j] \leq A[i][j']$, que contradiz a primeira. Portanto, os índices de máximos são decrescentes.

Agora, considere novamente dois índices i e i' quaisquer de linhas de A onde $i < i'$. Denotamos por j o índice de mínimo da linha i' e por j' o índice de mínimo da linha i (note e a inversão no uso de '). Vamos supor por absurdo que $j < j'$ e teremos $A[i'][j] \leq A[i'][j']$ e $A[i][j'] < A[i][j]$. E, novamente, usando o fato de que A é monótona convexa nas linhas, obtivemos uma contradição.

Finalmente, se A' é uma submatriz de A , então A' é totalmente monótona convexa nas linhas, portanto monótona crescente nos máximos das linhas e monótona decrescente nos mínimos das linhas.

As demonstrações no caso côncavo e nos casos relacionados a colunas são análogas. \square

Definição 2.10 (Monge Convexidade). *Seja $A \in \mathbb{Q}^{n \times m}$.*

- (1) *Se vale $A[i][j] + A[i'][j'] \leq A[i][j'] + A[i'][j]$ para todo $1 \leq i < i' \leq n$ e $1 \leq j < j' \leq m$, A é dita Monge convexa.*
- (2) *Se vale $A[i][j] + A[i'][j'] \geq A[i][j'] + A[i'][j]$ para todo $1 \leq i < i' \leq n$ e $1 \leq j < j' \leq m$, A é dita Monge côncava.*

A desigualdade que define as matrizes Monge é conhecida também por “Condição de Monge” ou “Desigualdade Quadrangular”[1].

Lema 2.11. *Se A é Monge convexa, A é totalmente monótona convexa tanto nas linhas quanto nas colunas.*

Se A é Monge côncava, A é totalmente monótona côncava tanto nas linhas quanto nas colunas.

Demonstração. Seja A uma matriz Monge convexa. Suponha que vale, para certos $i, i' \in [n]$ e $j, j' \in [m]$ onde $i < i'$ e $j < j'$, $A[i'][j] \leq A[i][j']$, então, somamos esta desigualdade à definição de Monge convexa e obtemos $A[i][j] \leq A[i][j']$, ou seja, A é totalmente monótona convexa nas linhas.

Por outro lado, se vale, para certos $i, i' \in [n]$ e $j, j' \in [m]$ com $i < i'$ e $j < j'$, $A[i][j'] \leq A[i'][j]$, somamos esta desigualdade à definição de Monge convexa e obtemos $A[i][j] \leq A[i'][j]$, assim, A é totalmente monótona convexa nas colunas.

A prova para o caso côncavo é análoga. \square

As matrizes Monge são usadas para resolver uma série de problemas que serão explorados aqui. A condição de Monge é a mais forte apresentada aqui. Alguns dos algoritmos apresentados não dependem dela, apenas da monotonicidade ou total monotonicidade, ainda assim, ela leva a resultados úteis que nos permitem provar a pertinência dos algoritmos a alguns problemas, mesmo que o algoritmo usado não se utilize da condição diretamente.

Como consequência desta utilidade, iremos discutir um problema que será resolvido com um algoritmo apresentado somente na Seção ??, o algoritmo SMAWK. Ele não será explicado neste momento, utilizamos ele como caixa preta. Isto é motivado pelo fato de que o pensamento apresentado aqui não é útil somente para o algoritmo SMAWK, ele é útil também em vários dos outros momentos deste trabalho.

Problema 2.12. *Dados dois inteiros k e n com $k \leq n$, um vetor de pesos $a \in \mathbb{Q}_+^n$ e uma matriz de custos $A[i][j] = \left(\sum_{k=i+1}^j a_k \right)^2$. Queremos particionar o vetor a em k partes não-vazias de forma a maximizar a soma dos custos das partes, isto é, queremos escolher um vetor $r \in \mathbb{N}^{[0..k]}$ de índices tal que $1 = r_0 < r_1 < r_2 < \dots < r_{k-1} < r_k = n$ de forma que $\sum_{i=1}^k A[r_{i-1}][r_i]$ seja máximo.*

Podemos resolver este problema com programação dinâmica. Vamos preencher a matriz $E \in \mathbb{Q}^{k \times n}$ definida recursivamente para todo $k' \in [k]$ e $n' \in [n]$:

$$E[k'][n'] = \begin{cases} A[1][n'] & , \text{ se } k' = 1, \\ \max_{i=k'-1}^{n'-1} E[k'-1][i] + A[i][n'] & , \text{ se } k' \leq n', \\ \text{indefinida} & , \text{ caso contrário.} \end{cases}$$

A recorrência acima nos dá em cada entrada $E[k'][n']$ o maior valor possível alcançado particionando o vetor $a[1..n']$ em k' partes não vazias. Podemos

preencher esta tabela trivialmente em tempo $O(kn^2)$, basta iterarar primeiro pelos índices k' crescentemente. O caso onde $k' = 1$ é resolvido trivialmente e os casos maiores podem ser resolvidos, um por vez, testando todas as possibilidades de máximo para todo n' .

Fixamos um $k' > 1$. Vamos utilizar o algoritmo SMAWK para agilizar a solução deste subproblema. Este algoritmo é capaz de resolver o Problema 2.13 (descrito abaixo) em tempo $O(n)$. Precisamos provar, então, que o subproblema resolvido para cada k' é equivalente ao Problema 2.13.

Problema 2.13. *Dada uma matriz $A \in \mathbb{A}^{n \times n}$ totalmente monótona convexa nas colunas, encontrar o vetor de máximos das colunas de A .*

Definimos a matriz $B_{k'}$ para todo $i, n' \in \mathbb{N}$ onde $k' - 1 \leq i < n' \leq n$ como $B_{k'}[i][n'] = E[k' - 1][i] + A[i][n']$. Note que já que k' é fixo, já descobrimos os valores da entrada da matriz E na linha $k' - 1$. Encontrar o índice i que atinge o máximo em $E[k'] [n']$ é exatamente encontrar o índice de máximo da coluna n' na matriz $B_{k'}$, formalmente,

$$\max_{i=k'-1}^{n'-1} B_{k'}[i][n'] = \max_{i=k'-1}^{n'-1} E[k' - 1][i] + A[i][n'].$$

Portanto, basta mostrar que $B_{k'}$ é monótona convexa nas colunas. Para isso, vamos mostrar, com a ajuda dos resultados abaixo, que $B_{k'}$ é Monge convexa.

Lema 2.14. *Sejam $A, B \in \mathbb{Q}^{n \times m}$ matrizes e $c \in \mathbb{Q}^n$ um vetor tais que para todo $i \in [n]$ e $j \in [m]$, $B[i][j] = A[i][j] + c[j]$. Se A é Monge convexa, B é Monge convexa.*

O mesmo resultado vale se $c \in \mathbb{Q}^m$ e $B[i][j] = A[i][j] + c[j]$.

Demonstração. Sejam A, B e b definidos como no enunciado do teorema. Suponha que A é Monge convexa. Vale, para quaisquer $1 \leq i < i' \leq n$ e $1 \leq j < j' \leq m$, $A[i][j] + A[i'][j'] \leq A[i'][j] + A[i][j']$, logo, vale $A[i][j] + b[i] + A[i'][j'] + b[i'] \leq A[i'][j] + b[i'] + A[i][j'] + b[i]$ que é $B[i][j] + B[i'][j'] \leq B[i'][j] + B[i][j']$. A prova para o caso onde $c \in \mathbb{Q}^m$ e $B[i][j] = A[i][j] + c[j]$ é análoga. \square

Com este resultado, é fácil ver que, desde que A seja Monge convexa, B_1 será Monge convexa e a Monge convexidade será mantida para todo $B_{k'}$ com $1 \leq k' \leq k$. O teorema a seguir nos ajuda a mostrar que A é Monge convexa.

Teorema 2.15. *Sejam $A \in \mathbb{Q}^{n \times n}$ uma matriz, $w \in \mathbb{Q}_+^n$ um vetor e $g : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ uma função tais que para todo $i, j \in [n]$ vale $A[i][j] = g\left(\sum_{k=1}^j w_k - \sum_{k=1}^i w_k\right)$. Se g é convexa, A é Monge convexa.*

Similarmente, se g é côncava, A é Monge côncava.

Antes de apresentar uma prova para o teorema acima, vamos mostrar a utilidade dele no nosso problema atual, o que deve ajudar na compreensão de seu enunciado.

Queremos mostrar que A é Monge convexa, porém, para um certo vetor $a \in \mathbb{Q}_+^n$, $A[i][j] = \left(\sum_{k=(i+1)}^j a_k \right)^2 = \left(\sum_{k=1}^j a_k - \sum_{k=1}^i a_k \right)^2$, por definição. Assim, precisamos mostrar apenas que a função $g(x) = x^2$ é convexa, o que segue da Proposição 2.3. Agora, como explicado acima, todas as matrizes $B_{k'}$ são Monge convexas e podemos aplicar o algoritmo SMAWK para todo k' , resolvendo o Problema 2.12 em tempo $O(kn)$.

Agora, nos resta provar o Teorema 2.15.

Demonstração. Sejam A e g quaisquer que respeitem as condições do enunciado. Sejam ainda $i, i', j, j' \in [n]$ onde $i < i'$ e $j < j'$. Escrevemos $a = \sum_{k=1}^{i'} w_k - \sum_{k=1}^i w_k$, $b = \sum_{k=1}^{j'} w_k - \sum_{k=1}^j w_k$ e $z = \sum_{k=1}^j w_k - \sum_{k=1}^{i'} w_k$. Desta forma, temos $g(z) = A[i'][j]$, $g(z+a+b) = A[i][j']$, $g(z+a) = A[i][j]$ e $g(z+b) = A[i'][j']$, portanto, $g(z+a) + g(z+b) \leq g(z) + g(z+a+b)$ se e somente se $A[i][j] + A[i'][j'] \leq A[i][j'] + A[i'][j]$ (A é Monge convexa).

Com isso, vamos provar que se g é convexa, A é Monge convexa. Sejam $i, i', j, j' \in [n]$ onde $i < i'$ e $j < j'$. Definimos a , b e z como acima. Sabemos $0 \leq a$ e $0 \leq b$. Consideramos o caso onde $0 < a \leq b$. Temos $0 < a \leq b < a+b$, ou seja, $z < z+a \leq z+b < z+a+b$. Definimos $\lambda = \frac{a}{a+b}$. Já que $z+a = \lambda z + (1-\lambda)(z+a+b)$ e $z+b = (1-\lambda)z + \lambda(z+a+b)$, por convexidade de g , obtemos $g(z+a) \leq \lambda g(z) + (1-\lambda)g(z+a+b)$ e $g(z+b) \leq \lambda g(z+a+b) + (1-\lambda)g(z)$. Somando, obtemos $g(z+a) + g(z+b) \leq g(z) + g(z+a+b)$.

Se considerarmos o caso onde $0 < b \leq a$, seguimos o mesmo raciocínio e obtemos, novamente, $g(z+a) + g(z+b) \leq g(z) + g(z+a+b)$. Falta considerar o caso onde $0 = a = b$, neste caso, $g(z) = g(z+a) = g(z+b) = g(z+a+b)$ e vale $(z+a) + g(z+b) \leq g(z) + g(z+a+b)$. Portanto, A é Monge convexa. \square

3. DIVISÃO E CONQUISTA

Nesta seção será apresentada uma técnica que pode ser usada para encontrar máximos de linhas em matrizes monótonas crescentes nos máximos das linhas em tempo $\mathcal{O}((m+n)\lg(n))$, onde m é a quantidade de colunas e n a quantidade de linhas da matriz. Ao final desta seção, apresentamos exemplos de aplicações desta ideia em programação dinâmica e elencamos generalizações diretas do que foi explicado.

3.1. Técnica. Dada uma matriz $A \in \mathbb{Q}^{n \times m}$ monótona crescente nos máximos das linhas, queremos encontrar o vetor de índices de máximos das linhas de A . Isto é, para todo $i \in [n]$, queremos encontrar

$$R[i] = \min\{j \mid A[i][j] \geq A[i][j'] \text{ para todo } j' \in [n]\}.$$

Se, para alguma linha i , encontrarmos o valor $R[i]$, sabemos, já que A é monótona convexa, que para todo $i' < i$, $R[i'] \leq R[i]$ e, para todo $i' > i$, $R[i'] \geq R[i]$, isto é, sabemos que os máximos de menor índice das outras linhas se encontram nas submatrizes $A[1..i-1][1..R[i]]$ e $A[i+1..n][R[i]..m]$. Basta, agora, seguindo o paradigma de divisão e conquista, resolver o mesmo problema para estas submatrizes e conseguimos resolver o problema original.

Algoritmo 3.1 Máximos das linhas com divisão e conquista

```

1: função FINDROWMAX_DC( $A, r_s, r_t, c_s, c_t$ )
2:    $\ell \leftarrow \lceil (r_s + r_t)/2 \rceil$ 
3:    $R[\ell] \leftarrow \min\{j \mid A[i][j] \geq A[i][j'] \text{ para todo } j' \in [c_s..c_t]\}$ 
4:   se  $i > r_s$  então
5:      $R[r_s.. \ell - 1] \leftarrow \text{FINDROWMAX\_DC}(A, r_s, \ell - 1, c_s, R[\ell])$ 
6:   se  $i < r_t$  então
7:      $R[\ell + 1.. r_t] \leftarrow \text{FINDROWMAX\_DC}(A, \ell + 1, r_t, R[\ell], c_t)$ 
8:   devolve  $R$ 
```

3.2. Análise. Será feita uma análise do tempo de execução do algoritmo acima no pior caso assumindo que as atribuições feitas nas linhas 5 e 7 custam tempo constante, futuramente, em 3.3, iremos apresentar uma implementação em C++ que está de acordo com a análise realizada.

Se A é uma matriz e r_s, r_t, c_s e c_t são índices tais que $r_t - r_s = n > 0$ e $c_t - c_s = m > 0$, o tempo gasto por $\text{FINDROWMAX_DC}(A, r_s, r_t, c_s, c_t)$ pode ser expresso pela seguinte recorrência:

$$T(n, m) = \begin{cases} m & , \text{ se } n = 1, \\ m + \max_{j \in [m]} T(1, j) & , \text{ se } n = 2, \\ m + \max_{j \in [m]} \left\{ T(\lceil n/2 \rceil - 1, m - j + 1) + T(\lfloor n/2 \rfloor, j) \right\} & , \text{ caso contrário.} \end{cases}$$

Proposição 3.2. *Para todo $n, m \geq 1$, $T(n, m) \leq (m+n) \lg(2n)$ e, portanto, a técnica da divisão e conquista consegue encontrar o máximo de todas as linhas em tempo $\mathcal{O}((m+n) \lg(n))$*

Demonstração. Vamos usar indução em n para provar a tese. Se $n = 1$ e $m \geq 1$, $T(1, m) = m \leq (m+1) \lg(2)$. Se $n = 2$ e $m \geq 1$, existe $j \in [m]$ tal que $T(2, m) = m + r \leq 2m \leq (m+2) \lg(4)$. Agora, se $n \geq 3$ e $m \geq 1$, existe um $j \in [m]$ tal que

$$T(n, m) = m + T(\lceil n/2 \rceil - 1, j) + T(\lfloor n/2 \rfloor, m - j + 1).$$

Assumimos para $1 \leq n' < n$ e $m' \geq 1$ que $T(n', m') \leq (m' + n') \lg(2n')$. Com isso, já que $1 \leq \lceil n/2 \rceil - 1 < n$, $1 \leq \lfloor n/2 \rfloor < n$, $j \geq 1$ e $m - j + 1 \geq 1$, temos, com a equação acima e o fato de que $\lceil n/2 \rceil - 1 \leq \lfloor n/2 \rfloor \leq n/2$,

$$\begin{aligned} T(n, m) &\leq m + (j + \lceil n/2 \rceil - 1 + m - j + 1 + \lfloor n/2 \rfloor) \lg(n) \\ &= m + (m + n) \lg(n) < (m + n)(\lg(n) + 1) = (m + n) \lg(2n). \end{aligned}$$

□

3.3. Implementação. Para implementar o Algoritmo 3.1 com a complexidade desejada, devemos tomar cuidado com as atribuições feitas nas linhas 5 e 7. A forma como elas foram apresentadas sugere que os vetores R recebidos pelas funções sejam recebidos e copiados para o vetor R . Ao invés de fazer isso, passaremos o endereço do vetor R recursivamente e garantir que cada chamada só complete o subvetor $R[r_c \dots r_t]$, referente a seu subproblema. Além disso, como explicado na Seção 1.4, a matriz A será passada como uma função e não como uma matriz.

A implementação em C++ do algoritmo apresentado, levando em conta as considerações acima, pode ser encontrada em `implementacao/FindRowMax_DC.cpp`.

3.4. Generalizações. Podemos manipular a matriz dada e usar o Algoritmo 3.1 como caixa preta para resolver vários problemas parecidos. Se a matriz $A \in \mathbb{Q}^{n \times m}$ recebida tiver os índices de máximos decrescentes, podemos espelhar a matriz e aplicar o algoritmo nesta nova matriz, ou seja, na matriz B onde $B[i][j] = A[i][m - j + 1]$ para todo $i \in [n]$ e $j \in [m]$.

Se estivermos interessados no vetor de mínimos das linhas em uma matriz A onde este é monótono, podemos trabalhar sobre a matriz $-A$ e teremos um problema que sabemos resolver usando a técnica original ou a transformação já apresentada. Ainda mais, se estivermos interessados nos vetores relativos às colunas, basta transpor a matriz recebida e aplicar os conhecimentos já discutidos, desde que as hipóteses necessárias tornem-se válidas.

Todas as adaptações exemplificadas aqui podem ser atingidas facilmente com adaptações realizadas diretamente no algoritmo ao invés de transformações na matriz de entrada.

REFERÊNCIAS

- [1] F. Frances Yao. Efficient dynamic programming using quadrangle inequalities. In *Proceedings of the Twelfth Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, STOC '80, pages 429–435, New York, NY, USA, 1980. ACM.