

# Էջ 1 — ՔԵՄԱՆԷՔՍ

Տեղեկատվություն • Անվտանգություն • Վերականգնում

Created by Viken Darakjian



# Տեղեկատվություն • Անվտանգություն • Վերականգնում

Քեմսեքսը կարող է սկսվել որպես հաճույքի, մտերմության, ազատության կամ նոր փորձառության միջոց, սակայն որոշ մարդկանց համար ժամանակի ընթացքում այն կարող է դառնալ դժվար վերահսկելի:

Այս ուղեցույցը նախատեսված է նրանց համար, ովքեր՝

- ցանկանում են ավելի լավ հասկանալ քեմսեքսը,
- մտահոգված են իրենց կամ ուրիշի օգտագործմամբ,
- ցանկանում են նվազեցնել կամ դադարեցնել օգտագործումը,
- փորձում են վերականգնել սեքսն ու մտերմությունն առանց թմրանյութերի,
- ցանկանում են իմանալ՝ որտեղ կարելի է աջակցություն ստանալ Հայաստանում:

**Օգնություն խնդրելը պարտադիր չէ հետաձգել մինչև ճգնաժամային պահը:**

## Էջ 2 — Ի՞նչ է ՔԵՄՍԵՔՍԸ

Քեմսեքսը (chemsex) սեռական հարաբերությունների հետ որոշ հոգեակտիվ նյութերի օգտագործման համակցումն է՝ սեռական փորձառությունը ուժեղացնելու, երկարացնելու կամ փոխելու նպատակով:

### Մեթամֆետամին (Crystal Meth)

Կարող է բարձրացնել էներգիան, ինքնավստահությունը, գրգռվածությունն ու սեռական ցանկությունը, սակայն նաև կարող է կապված լինել անհանգստության, պարանոյայի, անքնության և կախվածության հետ:

### GHB/GBL («G»)

Կարող է առաջացնել էյֆորիա, թուլացնել արգելակվածությունը և բարձրացնել սեռական ցանկությունը: Չափից շատ օգտագործումը կարող է հանգեցնել գիտակցության կորստի և այլ լուրջ բժշկական խնդիրների:

### Մեֆեդրոն

Խթանիչ նյութ է, որը կարող է բարձրացնել էներգիան և սեռական գրգռվածությունը, սակայն կարող է նաև առաջացնել անհանգստություն, ուժեղ ցանկություն կրկին օգտագործելու և հոգեբանական խնդիրների:

# Ինչո՞ւ է քեմսեքսը գրավիչ որոշ մարդկանց համար

Այն կարող է ժամանակավորապես ապահովել՝

**հաճույք • վստահություն • երկարատև սեքս •  
ազատության զգացում • մտերմություն •  
պատկանելիություն • փախուստ միայնությունից  
կամ սթրեսից**

Հենց այդ պատճառով վերականգնումը միայն թմրանյութը  
դադարեցնելու մասին չէ:

Կարևոր է հասկանալ նաև՝ ի՞նչ կարիք էր քեմսեքսը  
բավարարում ձեր կյանքում:

# Ա. ԻՆՉՊԵՊՍ ԵՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՒՄ ՔԵՄՍԵՔՍԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐԸ

Օգտագործման եղանակը կարող է փոխել նյութի ազդեցության արագությունն ու վտանգները: Ստորև ներկայացված է ընդհանուր տեղեկություն, ոչ թե օգտագործման հրահանգ:

## Մեթամֆետամին — Crystal Meth / «Tina»

Կարող է օգտագործվել՝

- ծխելու միջոցով,
- քթով ներշնչելով,
- կուլ տալով,
- ներարկելով,
- ուղիղ աղիքի միջոցով:

Ծխելու և ներարկելու դեպքում ազդեցությունը կարող է առաջանալ շատ արագ: Ներարկումը կապված է նաև գերդոզավորման, երակների վնասման և վարակների վտանգի հետ:

## GHB/GBL — «G»

Սովորաբար ընդունվում է բերանով՝ հեղուկի ձևով: GBL-ը օրգանիզմում վերածվում է GHB-ի:

Նյութի խտությունը կարող է տարբեր լինել, իսկ ցանկալի ազդեցություն առաջացնող և գերդոզավորման հանգեցնող քանակների միջև տարբերությունը կարող է շատ փոքր լինել: Ալկոհոլի հետ համատեղ օգտագործումը հատկապես վտանգավոր է:

# Ա. ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ (շարունակություն)

## Մեֆեդրոն — 4-MMC / «Meow Meow» / «M-CAT»

Կարող է օգտագործվել՝

- քթով ներշնչելով,
- կով տալով,
- ներարկելով,
- ուղիղ աղիքի միջոցով:

Այն կարող է առաջացնել ուժեղ ցանկություն՝ կրկին օգտագործելու, ինչի հետևանքով դժվարանում է օգտագործումը վերահսկելը:

### Ներարկման հետ կապված հատուկ վտանգներ

Ասեղների, ներարկիչների կամ ներարկման այլ պարագաների համատեղ օգտագործումը կարող է փոխանցել ՄԻԱՎ և հեպատիտ C: Ներարկումը կարող է նաև առաջացնել թարախակույտեր, երակների վնասում և թրոմբոզներ:

**Օգտագործման որևէ եղանակ չի վերացնում նյութի ընդհանուր բժշկական վտանգները:**

# Բ. ՔԵՄՍԵՔՍԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ

Վտանգները կախված են նյութից, օգտագործման հաճախականությունից, համակցություններից և մարդու առողջական վիճակից:

## 1. Գերդոզավորում և գիտակցության կորուստ

GHB/GBL-ը կարող է առաջացնել արտահայտված քնկոտություն, գիտակցության կորուստ, շնչառության դանդաղում կամ կանգ, կոմա և մահ:

**«Գ»-ից հետո չարթնացող մարդը պարզապես «խորը քնած» չէ. դա կարող է լինել բժշկական արտակարգ իրավիճակ:**

## 2. Սրտի, անոթների և մարմնի ջերմաստիճանի հետ կապված խնդիրներ

Մեթամֆետամինը և մեֆեդրոնը կարող են առաջացնել՝

- արագ սրտխփոց և բարձր արյան ճնշում,
- սրտի աշխատանքի խանգարումներ,
- գերտաքացում և ջրազրկում,
- ցնցումներ:

Մեթամֆետամինի օգտագործումը կարող է նաև մեծացնել սրտամկանի ինֆարկտի և ինսուլտի վտանգը: Երկարատև ակտիվությունը և շոգ միջավայրը կարող են խորացնել գերտաքացումը:

## 3. Հոգեկան առողջության խնդիրներ

Հնարավոր են անհանգստություն, խուճապ, պարանոյա, շփոթվածություն և հալյուցինացիաներ:

Որոշ դեպքերում կարող է զարգանալ փսիխոզ՝ վիճակ, երբ մարդը դժվարանում է տարբերել իրականությունն իր ընկալումներից կամ համոզմունքներից:

Օգտագործումից հետո կարող են առաջանալ ընկճվածություն, ուժեղ հոգնածություն և դատարկության զգացում: Ինքնավնասման մտքերը կամ անվտանգ մնալու անկարողությունը պահանջում են անհապաղ օգնություն:

## Բ. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ (շարունակություն)

### 4. Սեռական առողջության և ֆիզիկական վնասվածքների ռիսկեր

Երկարատև կամ ինտենսիվ սեքսը կարող է առաջացնել ցավ, քերծվածքներ, պատռվածքներ և արյունահոսություն:

Թմրանյութերի ազդեցության տակ կարող է դժվարանալ պաշտպանիչ միջոցների օգտագործումը կամ նախապես սահմանած սահմանները պահպանելը: Սա կարող է մեծացնել ՄԻԱՎ-ի, հեպատիտ C-ի և այլ սեռավարակների փոխանցման վտանգը:

### 5. Կախվածություն և վտանգավոր զրկանք

Կարող են առաջանալ օգտագործումը վերահսկելու դժվարություն, ուժեղ ցանկություն և սեքսը թմրանյութերի հետ կապելու սովորություն:

GHB/GBL-ի հաճախակի օգտագործման դեպքում հնարավոր է ֆիզիկական կախվածություն: Այդ դեպքում հանկարծակի դադարեցնելը կարող է առաջացնել կյանքին սպառնացող զրկանք և պահանջում է բժշկական հսկողություն:

### 6. Նյութերի և դեղերի վտանգավոր համակցություններ

GHB/GBL-ը ալկոհոլի կամ բենզոդիազեպինների խմբի հանգստացնող դեղերի հետ համատեղ օգտագործելը կարող է մեծացնել գիտակցության կորստի և շնչառության կանգի վտանգը:

Մի քանի նյութերի համակցումը կարող է ունենալ դժվար կանխատեսելի ազդեցություն: Բժշկին տեղեկացրեք օգտագործած բոլոր նյութերի և ընդունվող դեղերի մասին:

# ԵՐԲ Ե ՊԵՏՔ ԱՆՄԻՋԱՊԵՍ ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՆԶԵԼ

Եթե մարդը՝

- չի արձագանքում կամ չի արթնանում,
- դժվար է շնչում կամ նորմալ չի շնչում,
- ունի ցնցումներ,
- ունի ուժեղ կրծքավանդակի ցավ,
- խիստ գերտաքացած է կամ ծանր շփոթված վիճակում է:

Օգնությանը սպասելիս՝

- մնացեք նրա կողքին և հետևեք շնչառությանը,
- եթե անգիտակից է, բայց նորմալ շնչում է, պառկեցրեք կողքի՝ անվտանգ դիրքով,
- եթե չի արձագանքում և նորմալ չի շնչում, սկսեք սրտաթոքային վերակենդանացում՝ հետևելով շտապ օգնության օպերատորի ցուցումներին,
- մի տվեք սնունդ, հեղուկ կամ այլ նյութեր և մի փորձեք փսխում առաջացնել,
- բուժաշխատողներին ասեք՝ ինչ է օգտագործել և երբ, եթե գիտեք:

**Մի սպասեք, որ մարդը պարզապես «քնի ու անցնի»:**

## Գ. ՔԵՄՍԵՔՍԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ

Քեմսեքսը կարող է ազդել նաև հարաբերությունների, աշխատանքի, ֆինանսների և անձնական անվտանգության վրա: Այս հետևանքները բոլորի մոտ նույն կերպ չեն առաջանում:

### 1. Հարաբերությունների խաթարում և մեկուսացում

Հնարավոր են կարևոր հանդիպումների չեղարկում, պարտավորությունների անտեսում, վստահության կորուստ և կոնֆլիկտներ:

Ժամանակի ընթացքում շփումը կարող է սահմանափակվել հիմնականում քեմսեքսի հետ կապված մարդկանցով, իսկ մյուս ընկերություններից ու հետաքրքրություններից մարդը կարող է հեռանալ:

### 2. Աշխատանքի և առօրյա խանգարում

Անքնությունը, հոգնածությունը և երկարատև օգտագործումը կարող են հանգեցնել ուշացումների, բացակայությունների, կենտրոնանալու դժվարության և աշխատանքի որակի անկման: Որոշ դեպքերում կարող է վտանգվել աշխատանքի պահպանումը:

### 3. Ֆինանսական դժվարություններ

Նյութերի վրա ծախսերը և աշխատանքային խնդիրները կարող են նպաստել պարտքերի առաջացմանը և հիմնական ծախսերը հոգալու դժվարությանը:

Թմրանյութի կամ գումարի հասանելիությունից կախված լինելը կարող է մարդուն ավելի խոցելի դարձնել ճնշման կամ շահագործման նկատմամբ:

## Գ. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ (շարունակություն)

### 4. Համաձայնության խախտում և սեռական բռնություն

Թմրանյութերը կարող են խանգարել իրավիճակը հասկանալուն, ազատ որոշում ընդունելուն և ցանկությունները հստակ արտահայտելուն:

**Անգիտակից կամ այնքան ուժեղ ազդեցության տակ գտնվող մարդը, որ չի կարող հասկանալ իրավիճակը կամ հաղորդակցվել, չի կարող համաձայնություն տալ:**

Լռությունը համաձայնություն չէ: Նախկին համաձայնությունը չի նշանակում համաձայնություն հետագա ցանկացած գործողության համար: Համաձայնությունը կարելի է հետ վերցնել ցանկացած պահի:

**Քեմսեքսի հանդիպմանը մասնակցելը չի նշանակում համաձայնություն սեքսի, ցանկացած սեռական գործողության կամ նկարահանման համար:**

### 5. Գաղտնիության կորուստ և շանտաժ

Թմրանյութերի ազդեցության տակ մարդը կարող է բացահայտել անձնական տեղեկություններ, ուղարկել ինտիմ նյութեր կամ հայտնվել առանց համաձայնության արված լուսանկարներում ու տեսանյութերում:

Դրանք կարող են օգտագործվել սպառնալիքների կամ շանտաժի համար: Ինտիմ կապը կամ նախկին համաձայնությունը նկարահանման կամ հրապարակման ավտոմատ թույլտվություն չէ:

### 6. Ամոթ և օգնության հետաձգում

Ամոթը, մեղավորության զգացումը կամ դատապարտվելու վախը կարող են խորացնել մեկուսացումը և դժվարացնել օգնություն խնդրելը:

**Եթե ձեզ ճնշել, շահագործել կամ սեռական բռնության են ենթարկել, դա ձեր մեղքը չէ: Դուք արժանի եք աջակցություն ստանալու՝ անկախ նյութեր օգտագործած լինելուց:**

## Էջ 3 — Ե՞ՐԲ Ե ՔԵՄՍԵՔՍԸ ԴԱՌՆՈՒՄ ԽՆԴԻՐ

Հարցրեք ինքներդ ձեզ՝

☐ Արդյո՞ք ավելի հաճախ եմ օգտագործում, քան նախատեսել էի:

☐ Արդյո՞ք դժվարանում եմ կանգ առնել սկսելուց հետո:

☐ Արդյո՞ք սեքսն առանց թմրանյութերի դարձել է դժվար պատկերացնել:

☐ Արդյո՞ք հաճախ եմ մտածում հաջորդ քեմսեքսի մասին:

☐ Արդյո՞ք օգտագործումը խանգարում է իմ աշխատանքին, քնին կամ հարաբերություններին:

☐ Արդյո՞ք քեմսեքսից հետո զգում եմ ուժեղ հոգնածություն, անհանգստություն, դատարկություն կամ ափսոսանք:

☐ Արդյո՞ք ջնջում եմ հավելվածները կամ կոնտակտները, բայց հետո կրկին վերականգնում դրանք:

☐ Արդյո՞ք փորձել եմ նվազեցնել կամ դադարեցնել, բայց չեմ կարողացել:

☐ Արդյո՞ք օգտագործումը դարձել է ավելի հաճախակի կամ ինտենսիվ:


Եթե ճանաչում եք ձեր փորձառությունը այս հարցերից մի քանիստում, դա պատճառ է կանգ առնելու և իրավիճակը գնահատելու:

**Պետք չէ սպասել, մինչև ամեն ինչ «շատ վատ» դառնա:**

## Էջ 4 — ՀԱՍԿԱՑԵՔ ՁԵՐ ՔԵՄՍԵՔՍԻ ՇՐՔԱՆ

Քեմսեքսը հաճախ սկսվում է շատ ավելի վաղ, քան թմրանյութի օգտագործումը:

### Տիպիկ շղթա



Որքան շուտ ընդհատեք շղթան, այնքան ավելի հեշտ կարող է լինել:

# Ձեր խթանիչ գործունեությունը կարող են լինել

## ՄԱՐԴԻԿ

Չուզընկերներ, նախկին սեռական կապեր, դիվերներ կամ որոշ ընկերներ:

## ՎԱՅՐԵՐ

Բնակարաններ, հյուրանոցներ, ակումբներ կամ որոշ թաղամասեր:

## ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

Ծանոթությունների հավելվածներ, չաթեր և սոցիալական ցանցեր:

## ՉԳԱՑՄՈՒՆՔՆԵՐ

Միայնություն, սթրես, մերժվածություն, ծանծրույթ կամ անհանգստություն:

## ՍԵՌԱԿԱՆ ԽԹԱՆՆԵՐ

Սեռական գրգռվածություն, ֆանտազիաներ կամ պոռնոգրաֆիա:

## ԺԱՄԱՆԱԿ

Ուրբաթ երեկո, հանգստյան օրեր, ուշ գիշեր կամ աշխատավարձ ստանալու օր:

## Հարց ինքներդ ձեզ

Ի՞նչ է սովորաբար տեղի ունենում իմ օգտագործումից մի քանի ժամ առաջ:

## Էջ 5 — ԻՆՉՊԵՐՍ ԴԻՄԱԿԱՅԵԼ ՈՒԺԵՂ ՑԱՆԿՈՒԹՅԱՆԸ

### Ցանկությունը հրաման չէ

Ցանկությունը կարող է լինել շատ ուժեղ, բայց դա չի նշանակում, որ դուք պարտավոր եք անմիջապես գործել դրա համաձայն:

### 30 րոպեի ծրագիր

0-5 րոպե

Մի գրեք ոչ մեկին: Ոչ մի որոշում մի ընդունեք:

5-10 րոպե

Փոխեք ձեր գտնվելու վայրը: Դուրս եկեք բարձր ռիսկային միջավայրից:

10-15 րոպե

Ջուր խմեք կամ ինչ-որ բան կերեք:

15-20 րոպե

Քայլեք, ցնցուղ ընդունեք կամ շարժվեք:

20-25 րոպե

Չանգահարեք կամ գրեք վստահելի մարդու:

25-30 րոպե

Հիշեք՝ ինչու եք ուզում դադարեցնել կամ նվազեցնել օգտագործումը:

Այնուհետև կրկին գնահատեք իրավիճակը:

# Իմ «արտակարգ քարտը»

**Երբ ուզում եմ օգտագործել, ես կարող եմ սպասել  
30 րոպե:**

Չեմ կապվի՝ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Կզանգահարեմ՝ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Կգնամ անվտանգ վայր՝ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Իմ առաջին գործողությունը կլինի՝ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Դադարեցնելու իմ պատճառը՝ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Էջ 6 — ՓՈԽԵՔ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ, ՈՉ ՄԻԱՅՆ ՁԵՐ ԿԱՄՔԻ ՈՒԺԸ

Վերականգնումը կամքի ուժի քննությունն չէ:

Եթե թմրանյութերը, հավելվածները, կոնտակտները և հնարավորությունները մշտապես հասանելի են, դուք ստիպված եք անընդհատ պայքարել ցանկության դեմ:

Փորձեք նախապես դժվարացնել ավտոմատ վերադարձը քեմսեքսին:

- ☐ Հեռացրեք թմրանյութերը և դրանց օգտագործման պարագաները:
- ☐ Ձեռքեք կամ արգելափակեք բարձր ռիսկային կոնտակտները:
- ☐ Դուրս եկեք քեմսեքսի հետ կապված խմբերից և չաթերից:
- ☐ Ժամանակավորապես հեռացրեք ծանոթությունների հավելվածները:
- ☐ Խուսափեք օգտագործման հետ կապված վայրերից:
- ☐ Նախապես պլանավորեք ուրբաթ և շաբաթ երեկոները:
- ☐ Ասեք առնվազն մեկ վստահելի մարդու, որ փորձում եք դադարեցնել:

# Պլանավորեք հանգստյան օրերը

Դատարկ ժամանակը կարող է մեծացնել վերադարձի ռիսկը:

Ուրբաթ երեկոյան ես կլինեմ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Շաբաթ օրը ես կանեմ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Մարդը, ում հետ կապ կունենամ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Եթե ցանկություն առաջանա, ես՝ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Էջ 7 — ՄԵՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԵՔՍ ԵՎ ՄՏԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆ

Քեմսեքսը միշտ չէ, որ միայն թմրանյութերի կամ սեքսի մասին է:

Այն կարող է տալ՝

**ուշադրություն • շփում • ընդունված լինելու զգացում • հուզմունք • ինքնավստահություն • մտերմություն • փախուստ միայնությունից**

Դադարեցնելուց հետո կյանքը որոշ ժամանակ կարող է ավելի «դատարկ» թվալ:

Այդ դատարկությունը նույնպես վերականգնման մաս է, և այն պետք է աստիճանաբար լցնել այլ փորձառություններով:

### Սեքսն առանց թմրանյութերի

Եթե ուղեղը երկար ժամանակ կապել է սեքսը թմրանյութերի հետ, սթափ սեքսը սկզբում կարող է թվալ՝

- ավելի քիչ ինտենսիվ,
- անհարմար,
- անծանոթ,
- պակաս գրգռիչ:

Դա պարտադիր չի նշանակում, որ սթափ սեքսը այլևս հաճելի չի լինելու:

Տվեք ինքներդ ձեզ ժամանակ:

Մտերմությունը կարող է սկսվել՝

**զրույցից • ժամադրությունից • հպումից • համբույրից • գրկախառնությունից • մաստուրբացիայից • հանգիստ սեռական փորձառություններից**

**Սեքսը պարտադիր չէ լինի ծայրահեղ, որպեսզի լավ լինի:**

## Էջ 8 — ՄԱՐՄՆԻ ԵՎ ՍԵՌԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

Վերականգնումը նաև ձեր մարմնի մասին հոգ տանելու գործընթաց է:

### ՔՈՒՆ

Կանոնավոր քնելու և արթնանալու ժամեր:

### ՄՆՈՒՆԴ ԵՎ ՀԵՂՈՒԿ

Կանոնավոր սնունդ և բավարար հեղուկ:

### ՇԱՐԺՈՒՄ

Քայլք, թեթև մարզանք և օրվա ընթացքում ակտիվություն:

### ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱԴ

Մի մեկուսացեք ամբողջությամբ:

### Սեռական առողջություն

Մտածեք բժշկի կամ համապատասխան ծառայության հետ քննարկելու մասին՝

- ՄԻԱՎ-ի թեստավորում,
- սեռավարակների հետազոտություն,
- հեպատիտների հետազոտություն,
- անհրաժեշտ պատվաստումներ,
- PrEP,
- PEP՝ ՄԻԱՎ-ի հնարավոր վերջին ազդեցությունից հետո:

**PEP-ը պետք է սկսել հնարավոր ազդեցությունից հետո  
հնարավորինս արագ և ոչ ուշ, քան 72 ժամվա ընթացքում:**

# ⚠️ ՀԱՏՈՒԿ ՉԳՈՒՇԱՑՈՒՄ — GHB/GBL

GHB/GBL-ի հաճախակի կամ երկարատև օգտագործման դեպքում կարող է զարգանալ ֆիզիկական կախվածություն:

**Այդ դեպքում հանկարծակի դադարեցնելը կարող է վտանգավոր լինել:**

Ծանր զրկանքի ախտանիշները կարող են ներառել՝

- ուժեղ անհանգստություն,
- գրգռվածություն կամ շփոթվածություն,
- հայուցինացիաներ,
- ցնցումներ:

Եթե կարծում եք, որ կախված եք GHB/GBL-ից, մինչև դադարեցնելը դիմեք բժշկական մասնագետի:

Ծանր ախտանիշների դեպքում անհրաժեշտ է շտապ բժշկական օգնություն:

## Էջ 9 — ԵԹԵ ԿՐԿԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ԵՔ

Մեկ անգամ կրկին օգտագործելը չի ջնջում ձեր արդեն կատարած աշխատանքը:

Կարևորը՝ ինչ եք անում դրանից հետո:

### 1 — ԿԱՆԳ ԱՌԵՔ

Հնարավորության դեպքում մի շարունակեք օգտագործումը:

### 2 — ԱՆՎՏԱՆԳ ՎԱՅՐ ԳՆԱՑԵՔ

Հեռացեք վտանգավոր իրավիճակից:

### 3 — ԿԱՊՎԵՔ ՈՐԵՎԷ ՄԵԿԻ ՀԵՏ

Մի թաքնվեք միայն ամոթի պատճառով:

### 4 — ՍՏՈՒԳԵՔ ՁԵՐ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ

Անհրաժեշտության դեպքում դիմեք բժշկական կամ սեռական առողջության ծառայության:

### 5 — ՀԱՍԿԱՑԵՔ՝ ԻՆՉ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՎ

Ի՞նչ խթանիչ գործոն կար:

Որտե՞ղ սկսվեց շղթան:

Ի՞նչ կարելի է հաջորդ անգամ փոխել:

### 6 — ՎԵՐԱԴԱՐՁԵՔ ԾՐԱԳՐԻՆ

Մի սպասեք հաջորդ շաբաթվան կամ հաջորդ ամսին:

# Իմ վերականգնման ծրագիրը

Իմ նպատակը՝ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Իմ ամենամեծ խթանիչ գործոնը՝ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Իմ հիմնական նախազգուշացնող նշանը՝ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ցանկության դեպքում ես՝ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Մարդը, ում կարող եմ զանգահարել՝ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Այն, ինչ ուզում եմ կառուցել իմ կյանքում՝ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# Էջ 10 — ՈՐՏԵՂ ԴԻՄԵԼ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

## DIGNITY Մարդասիրական ՀԿ

ՄԻԱՎ-ի կանխարգելման և սեռական առողջության հետ կապված ծառայություններ, այդ թվում՝ անվճար և գաղտնի արագ ՄԻԱՎ թեստավորում, խորհրդատվություն և համապատասխան ծառայությունների ուղղորդում:

### Երևան

+374 60 378989

+374 60 478989

+374 55 478980

### Գյումրի

+374 312 3 8989

### Վանաձոր

+374 322 2 4989

Էլ. փոստ՝ [contact@dignity.ngo](mailto:contact@dignity.ngo)

Կայք՝ [dignity.ngo](http://dignity.ngo)

---

## «Փինք» իրավապաշտպան ՀԿ — Pink Armenia

ԼԳԲՏ+ համայնքային աջակցություն, այդ թվում՝ հոգեբանական, սոցիալական և իրավական աջակցություն:

**Թեժ գիծ՝ +374 33 522533**

Հեռ.՝ +374 60 377277

Էլ. փոստ՝ [info@pinkarmenia.org](mailto:info@pinkarmenia.org)

Կայք՝ [pinkarmenia.org](http://pinkarmenia.org)

# ՀՀ ԱՆ Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոն

ՄԻԱՎ-ի հետ կապված հետազոտություն, խորհրդատվություն և  
բժշկական ծառայություններ:

**Թեժ գիծ՝ 8424**

## Ամբուլատոր կլինիկա

Աճառյան փ. 2, Երևան  
Հեռ.՝ +374 10 617107

## Ստացիոնար կլինիկա

Բաբաջանյան փ. 42, Երևան

Էլ. փոստ՝ [ncid@ncid.am](mailto:ncid@ncid.am)  
Կայք՝ [ncid.am](http://ncid.am)

# ՆՈՐ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

Սեղմեք աղբյուրի անվան վրա՝ կայքը բացելու համար:

**[1] Sexual Health Sheffield — Drugs associated with chemsex**

[www.sexualhealthsheffield.nhs.uk](http://www.sexualhealthsheffield.nhs.uk)

**[2] FRANK — Methamphetamine**

[talktofrank.com](http://talktofrank.com)

**[3] FRANK — Synthetic cathinones**

[www.talktofrank.com](http://www.talktofrank.com)

**[4] NHS — GHB/GBL “G”**

[www.letstalkaboutit.nhs.uk](http://www.letstalkaboutit.nhs.uk)

**[5] NHS Croydon Sexual Health — ChemSex**

[www.croydonsexualhealth.nhs.uk](http://www.croydonsexualhealth.nhs.uk)

**[6] Sexual Health Sheffield — Chemsex risks**

[www.sexualhealthsheffield.nhs.uk](http://www.sexualhealthsheffield.nhs.uk)

**[7] NHS — Poisoning**

[www.nhs.uk](http://www.nhs.uk)

**[8] Terrence Higgins Trust — Boundaries and consent**

[www.chemsex.co.uk](http://www.chemsex.co.uk)

**[9] Controlling Chemsex — Crime / Safety**

[controllingchemsex.com](http://controllingchemsex.com)

**[10] Terrence Higgins Trust — Consent and sexual assault**

[www.chemsex.co.uk](http://www.chemsex.co.uk)

**[11] Sexual Health Sheffield — When chemsex becomes problematic**

[www.sexualhealthsheffield.nhs.uk](http://www.sexualhealthsheffield.nhs.uk)

Ստուգված է՝ 05.10.2026

# ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԽՆԴՐԵԼԸ ԿԱՐՈՂ Է ՍԿՍԿԵԼ ՄԵԿ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

«Իմ թմրանյութերի օգտագործումը կապված է սեքսի հետ, և ես ուզում եմ օգնություն ստանալ այն դադարեցնելու կամ վերահսկելու համար»:

Պարտադիր չէ առաջին զրույցի ժամանակ պատմել ամեն ինչ:

## ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է

Այսօր պարտադիր չէ փոխել ձեր ամբողջ կյանքը:

## Կատարեք հաջորդ անվտանգ և առողջ ընտրությունը:

Այս նյութը տեղեկատվական և կրթական նպատակ ունի և չի փոխարինում բժշկական օգնությանը, կախվածությունների բուժմանը կամ շտապ օգնությանը:

Created by Viken Darakjian

Developed with AI-assisted research, writing and design tools.