

ХИМСЕКС

понять и защитить себя

Понятный гид о веществах, здоровье, согласии и возможностях получить поддержку.

Принимать осознанные решения.
Защищать границы. Находить помощь.

Для взрослых, близких и всех, кому важна эта тема.
С памятками, вопросами для размышления и личным планом.

Автор содержания: Викен Даракджян
(Viken Darakjian), с помощью ИИ.
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ / ОКТЯБРЬ 2026

Общая информация, а не индивидуальное лечение. Медицинские вопросы следует обсуждать со специалистом.

Как пользоваться этим гидом

Читайте последовательно или переходите к теме, которая нужна сейчас.

Есть непосредственная опасность? Откройте страницу 12. В России и странах ЕС: 112. В других странах используйте местный экстренный номер.

Понять | страницы 3-5

Что такое химсекс; распространённые вещества, способы употребления и физические риски.

Защитить себя | страницы 6-12

Психическое и сексуальное здоровье, согласие, социальные последствия, снижение вреда, PrEP и первая помощь.

Изменить ситуацию | страницы 13-16

Тревожные признаки, безопасный выход, тяга к употреблению и личный план поддержки.

Найти помощь | страницы 17-18

Консультации, взаимопомощь и проверяемые источники с активными ссылками.

Текст не осуждает людей и их сексуальность. Сексуальная ориентация не является заболеванием. Не каждый человек с опытом химсекса имеет зависимость. Однако опасные последствия возможны даже после одной встречи.

Что такое химсекс?

Значение термина

Химсекс - это намеренное употребление определённых психоактивных веществ перед сексуальным контактом или во время него. Часто упоминают GHB/GBL, метамфетамин и мефедрон. В российских материалах также обсуждают другие стимуляторы, включая альфа-ПВП. Состав веществ и практики отличаются между регионами.

Контекст и термины

Термин особенно часто используют в отношении геев, бисексуальных мужчин и других мужчин, практикующих секс с мужчинами. Употребление веществ в сексуальном контексте встречается и в других группах. «Chems» означает вещества; «слэмминг» - инъекционное употребление; PnP - «Party and Play».

Что люди ищут в этом опыте

Возможные мотивы: усиление удовольствия, более длительный секс, снижение стеснения и ощущение близости. Также могут влиять одиночество, стыд и стресс из-за дискриминации. Причины у каждого человека свои.

Что я ищу: удовольствие, близость, облегчение или принадлежность?

Распространённые вещества

Способы употребления приведены для понимания рисков. Здесь нет дозировок или инструкций по приёму.

GHB / GBL | «бутират», «G», «водичка»

Обычно принимают внутрь. GBL превращается в организме в GHB. Возможны расслабление и снижение сдержанности, но также провалы памяти, рвота, потеря сознания и нарушения дыхания. Между желаемым эффектом и передозировкой очень небольшая разница.

Метамфетамин | «кристалл», «тина»

Его курят, вдыхают через нос, принимают внутрь, вводят инъекционно или ректально. Он может повышать энергию, бодрость и сексуальное желание. Риски включают бессонницу, нарушения сердечного ритма, тревогу и паранойю.

Мефедрон | «4-ММС», «мяу»

Принимают внутрь, через нос, инъекционно или ректально. Возможны эйфория и усиление возбуждения. Риски: сильная нагрузка на сердце и кровообращение, тревога, паранойя и судороги.

Другие вещества

Кетамин часто употребляют через нос; он изменяет восприятие и ощущение тела. При длительном употреблении возможны серьёзные нарушения мочеиспускания. Пары попперсов вдыхают; они могут резко снижать давление. Также встречаются кокаин, MDMA, алкоголь и лекарства.

Физические риски

Острые последствия

Передозировка и непредсказуемые взаимодействия могут угрожать жизни. Длительные сессии повышают риск истощения и травм. Стимуляторы нагружают сердце и сосуды; вещества с угнетающим действием могут нарушать дыхание и сознание.

Способ употребления имеет значение

Инъекции создают дополнительные риски инфекций и повреждения тканей. Общие иглы и другие материалы со следами крови могут передавать ВИЧ или гепатиты. Повреждения носа и слизистых также требуют внимания.

Особенно опасные сочетания

GHB/GBL с алкоголем, бензодиазепинами или другими угнетающими веществами: повышенный риск тяжёлого нарушения дыхания.

Попперсы с силденафилом, тадалафилом и аналогичными средствами для эрекции: опасность угрожающего жизни падения давления.

Заболевания и лекарства меняют уровень риска. Обсудите взаимодействия с врачом или фармацевтом. Боль, раны, стойкие симптомы и нарушения мочеиспускания - повод обратиться за медицинской помощью.

Психическое здоровье

Во время сессии и после неё

Возможны тревога, недоверие, паранойя, резкие изменения настроения и спутанность сознания. После стимуляторов люди могут испытывать истощение и подавленность. Недосып способен ухудшать состояние. Повторяющиеся симптомы стоит обсудить со специалистом.

Если восприятие изменилось

Голоса, выраженный страх преследования или сильная дезориентация могут указывать на кризис. Создайте спокойную обстановку, говорите просто и не спорьте о том, что человек воспринимает. При острой опасности, сильном возбуждении или дезориентации: 112.

При мыслях о самоубийстве

Если вы опасаетесь, что можете причинить себе вред: не оставайтесь одни, свяжитесь с близким человеком и срочно обратитесь за помощью. При непосредственной опасности звоните 112 или обращайтесь в ближайшее отделение неотложной помощи. По возможности отойдите от предметов, которыми можно себя травмировать.

К кому я обращусь, если мне станет психологически тяжело?

Защита, тесты и помощь

Профилактика ВИЧ

Презервативы и подходящая смазка помогают снизить риски. PrEP (ДКП) - профилактика ВИЧ с помощью лекарств под медицинским наблюдением. Она не защищает от других инфекций, передающихся половым путём (ИППП). Схему и контрольные визиты подбирают индивидуально.

Возможный контакт с ВИЧ: действуйте сразу

PEP (ПКП) - экстренная профилактика после возможного контакта с ВИЧ. Немедленно свяжитесь с региональным центром СПИД или отделением неотложной помощи, чтобы получить врачебную оценку и назначение. Начать нужно как можно раньше, не позднее 72 часов. Не ждите симптомов или результатов теста.

Другие инфекции и травмы

Гонорея, хламидиоз, сифилис и гепатиты могут протекать без симптомов. Обсудите нужные тесты, места взятия мазков и сроки обследования. Вакцинация против гепатитов А/В и, по показаниям, трох также может быть полезна. При боли, кровотечении, сыпи или выделениях обратитесь к врачу.

На приёме расскажите, какие контакты и вещества были. Спросите о тестах на ВИЧ/ИППП, взаимодействиях, прививках и личном плане защиты. Профилактический приём антибиотиков необходимо обсуждать с врачом.

Согласие должно быть свободным

Согласие нужно на каждом этапе

Согласие должно быть добровольным, конкретным и допускающим отказ в любой момент. Предыдущее «да» не означает согласия на всё. Молчание, замирание и отсутствие сопротивления - не согласие. Человек без сознания или без способности принимать решения не может дать согласие.

Обсуждайте заранее и проверяйте в процессе

До встречи договоритесь о границах, защите, фото и видео. Спрашивайте: «Ты всё ещё этого хочешь?» и «Нужна пауза?» Если человек не может ясно общаться или вы сомневаетесь, остановите сексуальный контакт.

Фразы, которые можно использовать

- «Я хочу остановиться».
- «Не снимай фото или видео».
- «Я хочу уйти домой».
- «Мне нужна помощь, чтобы отсюда уйти».

Вина за насилие не лежит на пострадавшем человеке. Перейдите в безопасное место и обратитесь за медицинской и психологической поддержкой. Травмы и возможные инфекции требуют своевременной помощи. За консультацией можно обратиться, даже если решение об обращении в полицию ещё не принято.

Социальные риски

Не все последствия возникают у каждого. Примеры помогают заметить изменения в собственной жизни.

Отношения и изоляция

Секреты, нарушенные договорённости и разные границы могут подрывать доверие. Если почти все встречи связаны с химсексом, другие отношения и занятия могут отходить на второй план.

Работа, деньги и жильё

Длительные сессии и восстановление после них могут приводить к пропускам работы и невыполненным задачам. Расходы растут, финансовые обязательства остаются без внимания. Возможны конфликты дома или нестабильность жилья.

Приватность и эксплуатация

В состоянии опьянения бывает труднее распознать давление, обман или нарушение границ. Съёмка без согласия и передача личных данных могут причинять вред. При угрозах, шантаже или насилии обращайтесь за поддержкой.

Что изменилось в моей повседневной жизни?

Какие отношения или обязательства я хочу защитить в первую очередь?

Источники: [1], [6]; дополнительные вопросы для размышления

Практический список безопасности

Снижение вреда может уменьшить последствия, но не делает химсекс безопасным.

Перед встречей

- ☐ Обсудить границы и способы защиты.
- ☐ Выбрать доступного человека для связи и путь домой.
- ☐ Зарядить телефон, знать адрес, сохранить экстренный номер.
- ☐ Проверить взаимодействия своих лекарств.
- ☐ Подготовить презервативы, смазку и личные чистые материалы.

Во время встречи

- ☐ Избегать опасных сочетаний веществ.
- ☐ Не делиться принадлежностями; для инъекций использовать только новые стерильные материалы.
- ☐ Делать перерывы для еды, питья, охлаждения и отдыха.
- ☐ Проверять, что все в сознании и согласны.
- ☐ При тревожных признаках остановиться и вызвать помощь.

После встречи

- ☐ Организовать отдых и контакт с человеком, которому доверяете.
- ☐ Обратиться за помощью при травмах и симптомах.
- ☐ После возможного контакта с ВИЧ сразу уточнить необходимость ПКП.
- ☐ Договориться о тестах и последующем наблюдении.

Если в вашем регионе доступна проверка состава веществ (drug-checking), она может дать информацию о компонентах. Результат не гарантирует безопасность. Неизвестный состав и взаимодействия сохраняют риск.

Химсекс: как уменьшить вред

Профилактика ВИЧ, физическая безопасность и поддержка дополняют друг друга.

PrEP / ДКП в плане защиты

Доконтактная профилактика (ДКП, PrEP) - лекарства для людей без ВИЧ. При правильном применении она значительно снижает риск ВИЧ. Она не предотвращает другие ИППП, передозировку или травмы. Подходящий вариант обсудите с квалифицированным специалистом.

Надёжное применение ДКП

До начала нужны тест на ВИЧ, оценка функции почек и статуса гепатита В; затем - регулярный контроль. Соблюдайте назначенную схему. Защита не возникает автоматически после первой дозы. Начало, перерывы и отмену согласуйте с врачом. Приём по событию подходит не всем людям и видам контакта.

Подготовка к длительной сессии

Используйте напоминания о назначенном приёме и контрольных визитах. Если пропустили приём или была рвота, своевременно получите медицинский совет, не меняя схему самостоятельно. При возможном контакте с ВИЧ и сомнениях в защите сразу уточните необходимость ПКП - не позднее 72 часов.

Не только профилактика ВИЧ

Презервативы, смазка, тесты на ИППП и консультация по прививкам дополняют защиту. Не делитесь иглами и принадлежностями, избегайте опасных смесей, планируйте отдых и дорогу домой. Проверяйте согласие. Снижение вреда полезно и без цели полного отказа.

112: распознать и действовать

В России и странах ЕС. В других странах используйте местный экстренный номер.

Немедленно вызывайте помощь

Человек не просыпается; нет нормального дыхания или есть только редкие судорожные вдохи; судороги; сильная боль в груди; тяжёлый перегрев; коллапс или опасная спутанность сознания. Потеря сознания после G - не безобидный сон.

1 / Проверьте состояние и звоните

Убедитесь в собственной безопасности. Проверьте реакцию и дыхание. Позвоните 112, включите громкую связь и следуйте диспетчеру. Назовите адрес, состояние и известные вещества. Обеспечьте доступ бригаде.

2 / Действия зависят от дыхания

Без сознания, но дышит нормально: положите на бок в устойчивое положение, сохраняйте проходимость дыхательных путей и проверяйте дыхание.

Нет нормального дыхания: начинайте надавливания в центре груди: 100-120 в минуту, глубина 5-6 см у взрослого. Если обучены и можете: 30 надавливаний и 2 вдоха. Иначе непрерывно надавливайте. Используйте автоматический дефибриллятор, если доступен.

3 / Оставайтесь рядом

Не оставляйте человека одного. Не давайте еду, питье или другие вещества; не вызывайте рвоту. При судорогах освободите пространство, не удерживайте человека и ничего не кладите ему в рот. Продолжайте помощь до прибытия бригады.

Когда химсекс становится проблемой?

Эти вопросы помогают сориентироваться, но не устанавливают диагноз.

Отметьте тревожные признаки

- ☐ Употребляю чаще или дольше, чем планировал(а).
- ☐ Мне трудно завершить сессию.
- ☐ Секс без веществ кажется почти невозможным.
- ☐ Продолжаю, несмотря на тяжёлые последствия.
- ☐ Страдают сон, отношения, работа или финансы.
- ☐ Нужна большая доза или появляются симптомы отмены.
- ☐ Скрываю масштаб употребления или часто испытываю отчаяние после него.

Даже один пункт может стать поводом для конфиденциальной беседы. Для получения помощи не нужно знать диагноз или набрать определённое число признаков.

Что мне это даёт - и какой ценой?

Что я хочу изменить первым делом?

Безопасный выход: сначала врач

Отмена GHB/GBL может угрожать жизни

При частом или регулярном употреблении резкая отмена может вызвать судороги, тяжёлую спутанность сознания и другие опасные симптомы. Планируйте прекращение под медицинским наблюдением. При дрожи, сильном потоотделении, галлюцинациях, спутанности или судорогах срочно нужна медицинская помощь.

Не проводите детоксикацию самостоятельно

Не пытайтесь лечить отмену алкоголем, чужими лекарствами или другими веществами. Сообщите врачу и о регулярном употреблении алкоголя или бензодиазепинов. Если симптомы уже появились или G больше нет, срочно обратитесь за медицинской помощью.

Три шага для начала

1. Связаться: обратиться в службу помощи при зависимости, ВИЧ-сервисную организацию или к врачу.
2. Прояснить ситуацию: честно описать вещества, частоту, симптомы и предыдущие попытки.
3. Выбрать поддержку: консультации, медицинское лечение отмены, психотерапию, реабилитацию или взаимопомощь - по потребностям.

Можно начать так: «Я хочу изменить употребление веществ при химсексе и нуждаюсь в помощи, чтобы сделать это безопасно».

Тяга и возврат к употреблению

Ниже - практические предложения. При симптомах отмены следуйте предупреждению на странице 14.

Если тяга усиливается

Прервите ситуацию: закройте приложение, отложите приглашение, смените место. Позвоните человеку, который вас поддерживает. Позаботьтесь о текущей потребности: еда, отдых, общение или движение. Принимайте следующее решение, когда появится немного дистанции.

Выстраивать повседневную жизнь

Создайте небольшие опоры: время подъёма, еда, сон и контакт вне среды употребления. Сократите триггеры - определённые чаты или места. Попробуйте близость без давления: прогулку, разговор или прикосновения без ожидания секса.

После возврата к употреблению

Сначала оцените безопасность и потребность в медицинской помощи. Сообщите поддерживающему человеку. Позже спросите: что этому предшествовало? Чего не хватило? Что конкретно изменить? Возврат к употреблению - повод скорректировать план, а не доказательство невозможности перемен.

Мой план: если _____, то я _____.

Мой личный план поддержки

Для распечатки и заполнения от руки. Храните личные данные в защищённом месте.

Моя цель на следующую неделю:

Мои основные триггеры:

Что я могу сделать вместо употребления:

К кому я могу обратиться (имя / контакт):

Моя следующая консультация или первый звонок:

Мой экстренный план

В России и странах ЕС: 112.

При потере сознания проверьте дыхание, вызовите помощь и действуйте по странице 12.

После возможного контакта с ВИЧ сразу уточните ПКП.

Не проходите отмену GHB/GBL в одиночку.

Помощь на русском языке

Организации в России и русскоязычные ресурсы. Доступность, конфиденциальность, условия и расписание уточняйте напрямую.

ВИЧ, профилактика и снижение вреда

СПИД.ЦЕНТР: информация о ВИЧ, консультации, тестирование и база ВИЧ-сервисных организаций.

spid.center/ru

«Гуманитарное действие»: помощь людям с ВИЧ, гепатитами и зависимостью; программы сопровождения в Санкт-Петербурге и области.

haf-spb.org

По вопросам ДКП/ПКП обращайтесь также в региональный центр СПИД. Не откладывайте обращение после возможного контакта с ВИЧ.

Взаимопомощь и психологическая поддержка

Анонимные Наркоманы: поиск очных и онлайн-собраний.

na-russia.org

СМА «Химсекс»: на сайте СПИД.ЦЕНТРа опубликована информация о группе в Санкт-Петербурге. Актуальное расписание уточняйте у организатора.

spid.center/ru/events/4687

Российский Красный Крест: психологическая помощь.

redcross.ru/activity/psychological-help/

Если вы живёте вне России, ищите местного врача или службу сексуального здоровья с консультацией на русском языке. Спрашивайте об опыте работы с химсексом и уважительном отношении к ЛГБТК+ людям. Группы взаимопомощи не заменяют медицинское сопровождение отмены. При непосредственной опасности нужен экстренный вызов, а не ожидание консультации.

Читать дальше и проверять

Источники проверены 5 октября 2026 года. Используются материалы российских организаций на русском языке. Ссылки активны.

[1] «Гуманитарное действие»: химсекс и профилактика ВИЧ (2023)

[2] СПИД.ЦЕНТР: что нужно знать о химсексе

[3] «Веримед»: GHB, передозировка и синдром отмены

[4] «Гуманитарное действие»: доконтактная профилактика

[5] «Гуманитарное действие»: 72 часа и ПКП

[6] «Гуманитарное действие»: возврат к употреблению

[7] МЧС России: реанимация пострадавшего

[8] МЧС России: универсальный алгоритм первой помощи

[9] СПИД.ЦЕНТР: консультации и помощь

[10] Российский Красный Крест: психологическая помощь

[11] Анонимные Наркоманы: официальный сайт

[12] СПИД.ЦЕНТР: информация о группе СМА «Химсекс»

[13] Клиника «Дельта»: последствия употребления кетамина

Об этом гиде

Автор содержания: Викен Даракджян (Viken Darakjian), с помощью ИИ.

ИИ использован для поиска информации, подготовки текста и дизайна. Гид не прошёл врачебную рецензию и не заменяет лечение. Материалы клиник [3], [13] - пациентские обзоры, а не клинические рекомендации. Вопросы и упражнения - дополнительные практические предложения. В экстренной ситуации не ждите ответа онлайн-консультанта.