

WISSEN / SICHERHEIT / VERÄNDERUNG

CHEMSEX

verstehen

Ein verständlicher Guide zu Substanzen, Gesundheit,
Einvernehmlichkeit und Wegen zur Unterstützung.

Informiert entscheiden. Grenzen schützen.
Unterstützung finden.

Für Erwachsene, Angehörige und Interessierte.
Mit Checklisten, Reflexionsfragen und einem persönlichen Plan.

Inhalt erstellt von Viken Darakjian
(mit Unterstützung von KI).

DEUTSCH • AUSGABE OKTOBER 2026

Allgemeine Information, keine individuelle Behandlung. Medizinische Fragen
gehören in professionelle Hände.

So nutzt du diesen Guide

Du kannst von vorn lesen oder direkt zu dem Thema springen, das du gerade brauchst.

Akut in Gefahr? Gehe sofort zu Seite 12. In Deutschland und der EU: 112. Außerhalb der EU gilt die örtliche Notrufnummer.

Verstehen | Seiten 3-5

Was Chemsex ist; häufige Substanzen, Konsumformen und körperliche Risiken.

Schützen | Seiten 6-12

Psychische und sexuelle Gesundheit; Einvernehmlichkeit; soziale Folgen; Risikoreduktion und Erste Hilfe.

Verändern | Seiten 13-16

Warnzeichen, sicherer Ausstieg, Umgang mit Suchtdruck und dein persönlicher Plan.

Unterstützung | Seiten 17-18

Beratung, Selbsthilfe und nachvollziehbare Quellen mit anklickbaren Links.

Die Beispiele sind ohne moralische Bewertung formuliert. Sexuelle Orientierung ist keine Erkrankung. Nicht jede Person mit Chemsex-Erfahrung ist abhängig. Gesundheitliche Risiken können trotzdem schon bei einer einzelnen Begegnung entstehen.

Was bedeutet Chemsex?

Der Begriff

Chemsex bezeichnet den gezielten Konsum bestimmter psychoaktiver Substanzen vor oder während sexueller Begegnungen. Häufig genannt werden GHB/GBL, Methamphetamin und Mephedron. Weitere Drogen können hinzukommen.

Kontext und Sprache

Der Begriff wird besonders im Zusammenhang mit schwulen und bisexuellen Männern sowie anderen Männern, die Sex mit Männern haben, verwendet. Sexualisierter Drogenkonsum kommt auch in anderen Gruppen vor. „Chems“ meint die Substanzen; „Slammen“ bezeichnet das Injizieren. PnP steht für „Party and Play“.

Was Menschen darin suchen

Mögliche Motive sind intensivere Lust, längere sexuelle Begegnungen, weniger Hemmungen oder ein Gefühl von Nähe. Einsamkeit, Scham und Minderheitenstress können ebenfalls eine Rolle spielen. Die Gründe sind individuell.

Reflexion: Was suche ich - Lust, Nähe, Entlastung oder Zugehörigkeit?

Quellen: [1], [2]

Häufige Chems im Überblick

Konsumformen werden zur Einordnung genannt. Diese Übersicht enthält keine Dosierungen oder Anleitungen.

GHB / GBL | „G“, „Gina“

Meist geschluckt. GBL wird im Körper zu GHB umgewandelt. Möglich sind Enthemmung und Entspannung, aber auch Gedächtnislücken, Erbrechen, Bewusstlosigkeit und Atemprobleme. Der Abstand zwischen gewünschter Wirkung und Überdosierung ist klein.

Methamphetamin | „Crystal“, „Tina“

Wird unter anderem geraucht, geschnupft, geschluckt, injiziert oder rektal angewendet. Es kann Energie, Wachheit und sexuelles Verlangen steigern. Risiken sind Schlafverlust, Herzrhythmusstörungen, Angst und Paranoia.

Mephedron | „4-MMC“, „Meow“

Wird geschluckt, geschnupft, injiziert oder rektal angewendet. Möglich sind Euphorie und gesteigerte Erregung. Risiken sind starke Belastung von Herz und Kreislauf, Angst, Paranoia und Krampfanfälle.

Weitere Substanzen

Ketamin wird häufig geschnupft; es verändert Wahrnehmung und Körpergefühl. Regelmäßiger Konsum kann die Blase schädigen. Poppers werden als Dämpfe eingeatmet; sie können den Blutdruck stark senken. Auch Kokain, MDMA, Alkohol oder Medikamente können beteiligt sein.

Körperliche Risiken verstehen

Akute Risiken

Überdosierungen und unvorhersehbare Wechselwirkungen können lebensbedrohlich sein. Lange Sessions erhöhen das Risiko von Erschöpfung und Verletzungen. Stimulanzien belasten Herz und Kreislauf; dämpfende Substanzen können Atmung und Bewusstsein beeinträchtigen.

Konsumform macht einen Unterschied

Injizieren bringt zusätzliche Risiken für Infektionen und Gewebeschäden mit sich. Geteilte Nadeln oder andere blutverunreinigte Materialien können HIV oder Hepatitis übertragen. Auch Nasen- und Schleimhautverletzungen brauchen Aufmerksamkeit.

Besonders gefährliche Kombinationen

GHB/GBL mit Alkohol, Benzodiazepinen oder anderen dämpfenden Substanzen: erhöhtes Risiko schwerer Atemprobleme.

Poppers mit Sildenafil, Tadalafil oder ähnlichen Potenzmitteln: Gefahr eines lebensbedrohlichen Blutdruckabfalls.

Vorerkrankungen und Medikamente verändern das Risiko. Lass Wechselwirkungen ärztlich oder in einer Apotheke prüfen. Bei Schmerzen, Wunden, anhaltenden Beschwerden oder Problemen beim Wasserlassen ist eine medizinische Untersuchung sinnvoll.

Psychische Gesundheit schützen

Während und nach einer Session

Angst, Misstrauen, Paranoia, Stimmungseinbrüche und Verwirrtheit können auftreten. Nach stimulierenden Substanzen berichten Menschen von Erschöpfung und depressiven Gefühlen. Schlafmangel kann die Situation verschärfen. Wiederkehrende Beschwerden verdienen professionelle Unterstützung.

Wenn die Wahrnehmung kippt

Stimmenhören, starke Verfolgungsängste oder schwere Verwirrtheit können auf eine psychische Krise hinweisen. Sorge für eine ruhige Umgebung, sprich einfach und vermeide Streit über die Wahrnehmung. Bei akuter Gefahr, schwerer Erregung oder fehlender Orientierung: 112.

Bei Suizidgedanken

Wenn du befürchtest, dir etwas anzutun: Bleib nicht allein, kontaktiere eine vertraute Person und suche sofort Hilfe. Bei unmittelbarer Gefahr: 112 oder die nächste Notaufnahme. Entferne dich, wenn möglich, von Dingen, mit denen du dich verletzen könntest.

Meine Ansprechperson, wenn es mir psychisch schlecht geht:

Schutz, Tests und Versorgung

HIV-Prävention

Kondome und geeignetes Gleitmittel können Risiken senken. PrEP ist eine ärztlich begleitete vorbeugende HIV-Medikation; sie schützt nicht vor anderen sexuell übertragbaren Infektionen. Einnahme und Kontrolltermine müssen zu deiner Situation passen.

Nach möglichem HIV-Kontakt: sofort handeln

PEP ist eine Notfallbehandlung nach möglicher HIV-Exposition. Suche sofort eine Notaufnahme oder HIV-Schwerpunktpraxis auf. Beginn so früh wie möglich, spätestens innerhalb von 72 Stunden; warte nicht auf Symptome oder einen Test.

Andere Infektionen und Verletzungen

Gonorrhö, Chlamydien, Syphilis und Hepatitis können ohne erkennbare Beschwerden verlaufen. Besprich passende Tests, Abstrichorte und Zeitpunkte. Auch Impfungen gegen Hepatitis A/B und gegebenenfalls Mpox können relevant sein. Bei Schmerzen, Blutungen, Ausschlag oder Ausfluss: ärztlich abklären.

Für den Termin: Sag, welche Kontakte und Substanzen beteiligt waren. Frage nach HIV/STI-Tests, möglichen Wechselwirkungen, Impfungen und einem individuellen Schutzplan. Antibiotika zur Vorbeugung gehören in ärztliche Beratung.

Ein Ja muss freiwillig sein

Zustimmung gilt fortlaufend

Einvernehmlichkeit bedeutet freiwillige, konkrete und jederzeit widerrufbare Zustimmung. Ein früheres Ja ist keine Zustimmung zu allem. Schweigen, Erstarren oder fehlender Widerstand sind kein Ja. Eine bewusstlose oder nicht entscheidungsfähige Person kann nicht zustimmen.

Vorher besprechen, währenddessen prüfen

Kläre Grenzen, Schutz, Fotos und Videos vor der Begegnung. Frage zwischendurch: „Möchtest du das noch?“ und „Sollen wir eine Pause machen?“ Wenn jemand nicht klar kommunizieren kann oder du unsicher bist, stoppe den sexuellen Kontakt.

Sätze, die du verwenden kannst

„Ich möchte aufhören.“
„Keine Fotos oder Videos.“
„Ich will jetzt nach Hause.“
„Ich brauche Hilfe, um hier wegzukommen.“

Nach einem Übergriff trägt die betroffene Person keine Schuld. Gehe an einen sicheren Ort und suche medizinische und psychosoziale Unterstützung. Verletzungen und mögliche Infektionen sollten zeitnah versorgt werden. Du kannst auch ohne bereits getroffene Entscheidung über eine Anzeige Beratung suchen.

Soziale Risiken erkennen

Nicht jede Folge tritt bei jeder Person auf. Diese Beispiele helfen, Veränderungen im eigenen Alltag zu bemerken.

Beziehungen und Isolation

Geheimhaltung, nicht eingehaltene Absprachen oder unterschiedliche Grenzen können Vertrauen belasten. Wenn Treffen fast nur noch im Chemsex-Kontext stattfinden, können andere Beziehungen und Aktivitäten in den Hintergrund geraten.

Arbeit, Geld und Wohnen

Lange Sessions und die Erholung danach können zu Fehlzeiten oder versäumten Aufgaben führen. Ausgaben können steigen; finanzielle Verpflichtungen bleiben liegen. Auch Konflikte im Haushalt oder eine unsichere Wohnsituation können entstehen.

Privatsphäre und Ausbeutung

Intoxikation kann es erschweren, Druck, Betrug oder Grenzverletzungen zu erkennen. Ohne Einwilligung aufgenommene Bilder und die Weitergabe persönlicher Daten können schaden. Hole dir Unterstützung bei Drohungen, Erpressung oder Gewalt.

Was hat sich in meinem Alltag verändert?

Welche Beziehung oder Verpflichtung möchte ich zuerst schützen?

Quellen: [1], [6], [9]; ergänzende Reflexionsfragen

Eine praktische Schutz-Checkliste

Risikoreduktion kann Schäden verringern. Sie macht Chemsex nicht risikofrei.

Vor einer Begegnung

- ☐ Grenzen und Schutzwünsche besprechen.
- ☐ Eine erreichbare Vertrauensperson und Heimweg planen.
- ☐ Handy laden, Adresse kennen, Notruf speichern.
- ☐ Eigene Medikamente und Wechselwirkungen prüfen.
- ☐ Kondome, Gleitmittel und eigenes sauberes Material bereithalten.

Währenddessen

- ☐ Keine gefährlichen Substanzkombinationen eingehen.
- ☐ Konsumutensilien nicht teilen; beim Injizieren ausschließlich neues steriles Material verwenden.
- ☐ Pausen für Essen, Trinken, Abkühlung und Ruhe machen.
- ☐ Regelmäßig prüfen, ob alle ansprechbar sind und zustimmen.
- ☐ Bei Warnzeichen sofort stoppen und Hilfe holen.

Danach

- ☐ Ruhe und Kontakt zu einer vertrauten Person organisieren.
- ☐ Verletzungen und Beschwerden abklären lassen.
- ☐ Bei möglichem HIV-Kontakt sofort PEP abklären.
- ☐ Tests und Nachsorge passend zum Kontakt vereinbaren.

Wenn Drug-Checking vor Ort verfügbar ist, kann es Informationen über Inhaltsstoffe liefern. Ein Ergebnis garantiert keine Sicherheit. Bei unbekannter Zusammensetzung und unklaren Wechselwirkungen bleibt das Risiko bestehen.

Chemsex: Schäden verringern

HIV-Prävention, körperliche Sicherheit und Unterstützung gehören zusammen.

PrEP als Teil des Schutzplans

PrEP (Prä-Expositionsprophylaxe) ist eine vorbeugende Medikation für Menschen ohne HIV. Bei korrekter Anwendung senkt sie das HIV-Risiko deutlich. Sie schützt nicht vor anderen STIs, Überdosierung oder Verletzungen. Ob und welche PrEP für dich passt, klärst du mit einer qualifizierten Praxis.

PrEP zuverlässig anwenden

Vor dem Beginn sind ein HIV-Test und ärztliche Untersuchungen nötig; regelmäßige Kontrollen gehören dazu. Halte das vereinbarte Schema ein. Schutz besteht nicht automatisch ab der ersten Einnahme. Beginn, Pausen und Absetzen ärztlich planen. Anlassbezogene PrEP passt nicht für alle Personen oder Kontaktarten.

Für längere Sessions vorausplanen

Plane verordnete Einnahmen und Kontrolltermine mit Erinnerungen. Wenn du eine Einnahme vergessen hast oder erbrochen hast, hole zeitnah medizinischen Rat, statt selbst ein neues Schema zu improvisieren. Nach möglicher HIV-Exposition bei unklarem Schutz sofort PEP abklären - spätestens innerhalb von 72 Stunden.

Mehr als HIV-Prävention

Kondome, Gleitmittel, STI-Tests und Impfberatung ergänzen den Schutz. Keine Nadeln oder Utensilien teilen, gefährliche Mischungen vermeiden, Ruhe und Heimweg planen. Einvernehmlichkeit fortlaufend prüfen. Risikoreduktion hilft auch ohne aktuelles Abstinenzziel.

112: erkennen und handeln

In Deutschland und der EU. Anderswo die örtliche Notrufnummer wählen.

Sofort Hilfe bei diesen Zeichen

Nicht weckbar; keine normale Atmung oder nur Schnappatmung; Krampfanfälle; starke Brustschmerzen; schwere Überhitzung; Kollaps oder akute Gefahr durch starke Verwirrtheit. Bewusstlosigkeit nach G ist kein harmloser Schlaf.

1 / Rufen und prüfen

Achte auf die eigene Sicherheit. Prüfe Reaktion und Atmung. Rufe 112, stelle das Telefon auf Lautsprecher und folge der Leitstelle. Nenne Adresse, Zustand und bekannte Substanzen. Sorge dafür, dass der Rettungsdienst Zugang hat.

2 / Atmung entscheidet

Bewusstlos, aber normale Atmung: stabile Seitenlage, Atemwege frei halten und Atmung weiter kontrollieren.

Keine normale Atmung: sofort mit Herzdruckmassage in der Brustmitte beginnen: 100-120-mal pro Minute, 5-6 cm tief beim Erwachsenen. Wenn geschult und möglich: 30 Kompressionen, 2 Beatmungen. Sonst ohne Unterbrechung drücken. AED nutzen, sobald verfügbar.

3 / Dabeibleiben

Nicht allein lassen. Kein Essen, Trinken oder weitere Drogen geben; kein Erbrechen auslösen. Bei Krampfanfällen Umgebung sichern, nicht festhalten und nichts in den Mund stecken. Hilfe fortsetzen, bis der Rettungsdienst übernimmt.

Wann wird Chemsex problematisch?

Diese Fragen sind eine Orientierung, keine Diagnose.

Warnzeichen zum Ankreuzen

- ☐ Ich konsumiere häufiger oder länger als geplant.
- ☐ Es fällt mir schwer, eine Session zu beenden.
- ☐ Sex ohne Chems erscheint kaum noch möglich.
- ☐ Ich habe trotz belastender Folgen weitergemacht.
- ☐ Schlaf, Beziehungen, Arbeit oder Geld leiden darunter.
- ☐ Ich brauche mehr oder bekomme Entzugssymptome.
- ☐ Ich verheimliche den Umfang oder fühle mich danach oft verzweifelt.

Schon ein einzelner Punkt kann ein guter Anlass für ein vertrauliches Gespräch sein. Du musst weder eine Diagnose kennen noch eine bestimmte Anzahl an Warnzeichen erreichen, um Unterstützung zu bekommen.

Was gefällt mir daran - und welchen Preis zahle ich?

Was möchte ich als Erstes verändern?

Ausstieg: zuerst medizinisch sicher

GHB/GBL-Entzug kann lebensgefährlich sein

Bei häufigem oder regelmäßigem G-Konsum kann abruptes Absetzen Krampfanfälle, schwere Verwirrtheit oder andere gefährliche Entzugssymptome auslösen. Plane das Absetzen ärztlich begleitet. Bei Zittern, starkem Schwitzen, Halluzinationen, Verwirrtheit oder Krampfanfällen: sofort medizinische Hilfe.

Keine Entgiftung auf eigene Faust

Entzug nicht mit Alkohol, fremden Medikamenten oder anderen Drogen selbst behandeln. Auch regelmäßiger Alkohol- oder Benzodiazepinkonsum muss beim Arztgespräch genannt werden. Wenn bereits Symptome bestehen oder G nicht mehr verfügbar ist: umgehend medizinisch abklären lassen.

Drei Schritte zum Beginn

1. Kontakt herstellen: Suchtberatung, Aidshilfe oder ärztliche Praxis ansprechen.
2. Situation klären: Substanzen, Häufigkeit, Beschwerden und bisherige Versuche ehrlich beschreiben.
3. Unterstützung wählen: ambulante Beratung, medizinisch betreuter Entzug, Psychotherapie, Reha oder Selbsthilfe - passend zum Bedarf.

Ein brauchbarer Einstiegssatz: „Ich möchte meinen Chemsex-Konsum verändern und brauche Hilfe, damit es medizinisch sicher ist.“

Suchtdruck und Rückschläge

Die folgenden Übungen sind praktische Vorschläge. Bei Entzugssymptomen gilt die medizinische Warnung auf Seite 14.

Wenn das Verlangen stark wird

Unterbrich die Situation: App schließen, Einladung vertagen, Ort wechseln. Ruf eine Unterstützungs-person an. Kümmere dich um ein aktuelles Bedürfnis - Essen, Ruhe, Gesellschaft oder Bewegung. Triff die nächste Entscheidung erst, wenn du etwas Abstand gewonnen hast.

Den Alltag neu aufbauen

Plane kleine feste Anker: Aufstehen, Mahlzeiten, Schlaf und ein Kontakt außerhalb der Konsumszene. Reduziere Auslöser wie bestimmte Chats oder Orte. Probiere Nähe ohne Leistungsdruck: ein Spaziergang, ein Gespräch oder körperliche Zuwendung ohne Erwartung von Sex.

Nach einem Rückschlag

Prüfe zuerst Sicherheit und medizinischen Bedarf. Informiere eine unterstützende Person. Frage später: Was ging voraus? Was fehlte? Welche konkrete Änderung hilft beim nächsten Mal? Ein Rückschlag ist ein Anlass, den Plan anzupassen, kein Beweis dafür, dass Veränderung unmöglich ist.

Mein Wenn-dann-Plan: Wenn _____, dann _____.

Mein persönlicher Unterstützungsplan

Zum Ausdrucken oder handschriftlichen Ausfüllen. Bewahre sensible Angaben geschützt auf.

Mein Ziel für die nächste Woche:

Meine wichtigsten Auslöser:

Was ich stattdessen tun kann:

Wen ich kontaktieren kann (Name / Kontakt):

Mein nächster Beratungstermin oder erster Anruf:

Mein Notfallplan

Notruf in Deutschland/EU: 112.

Bei Bewusstlosigkeit Atmung prüfen, Hilfe rufen und nach Seite 12 handeln.

Bei möglichem HIV-Kontakt sofort PEP abklären.

GHB/GBL-Entzug nicht allein durchführen.

Hilfe finden

Die folgenden Angebote richten sich überwiegend an Menschen in Deutschland. Region, Sprache, Kosten und Termine jeweils direkt prüfen.

Beratung und Behandlung

DHS Suchthilfeverzeichnis: Beratungs- und Behandlungsangebote nach Region finden.

dhs.de/service/suchthilfeverzeichnis

Aidshilfe-Onlineberatung: Fragen zu HIV, sexueller Gesundheit und Chemsex.

aidshilfe-beratung.de

Schwulenberatung Berlin: queere Beratung, auch zu Sucht und Chemsex.

schwulenberatungberlin.de

Austausch und Selbsthilfe

Mann-O-Meter Berlin: Chemsex-Beratung und Gruppenangebote.

mann-o-meter.de

Crystal Meth Anonymous: abstinenzorientierte Selbsthilfe.

crystalmethanonymous.de

Narcotics Anonymous: Selbsthilfe bei Drogenabhängigkeit.

narcotics-anonymous.de

Außerhalb Deutschlands: Suche eine örtliche sexuelle Gesundheitsambulanz, HIV/STI-Beratungsstelle oder Suchtberatung. Frage ausdrücklich nach Erfahrung mit Chemsex und respektvoller, queersensibler Versorgung. Selbsthilfe ergänzt professionelle Behandlung; sie ersetzt keinen medizinischen Entzug.

Weiterlesen und nachprüfen

Quellenstand: 5. Oktober 2026. Links sind anklickbar. Angebote und Empfehlungen können sich ändern.

- [1] [IWWIT: Chemsex - Intimität im Rausch](#)
- [2] [NHS Sheffield: What is chemsex?](#)
- [3] [NHS Sheffield: Drugs associated with chemsex](#)
- [4] [HSE: Effects and dependency - G \(GHB and GBL\)](#)
- [5] [IWWIT: Safer Use](#)
- [6] [NHS Sheffield: Chemsex risks](#)
- [7] [CDC: Preventing HIV with PEP](#)
- [8] [NHS Sheffield: PrEP](#)
- [9] [NHS Sheffield: When chemsex becomes problematic](#)
- [10] [DRK: Stabile Seitenlage](#)
- [11] [St John Ambulance: How to do CPR](#)
- [12] [DHS: Suchthilfeverzeichnis](#)
- [14] [CDC: Preventing HIV with PrEP](#)
- [13] [Cambridge University Hospitals: Ketamine Bladder](#)

Ketamin und Blasenschäden auf Seite 4: zusätzlich Quelle [13].

Über diesen Guide

Inhalt erstellt von Viken Darakjian (mit Unterstützung von KI).

Mit KI-gestützter Recherche, Text- und Gestaltungserstellung entwickelt. Keine individuelle Diagnose oder Therapie und keine fachärztlich geprüfte Leitlinie. Die Reflexionsfragen und Planungshilfen sind ergänzende praktische Vorschläge. Im Notfall nicht auf eine Antwort aus einer Onlineberatung warten.