

- | | |
|----------|--|
| 3 | Погрижете се повредениот да има доволно свеж воздух. |
| 4 | Разлабавете ја тесната облека. |
| 5 | Следете ги виталните функции додека чекате ИМП и доколку е потребно применете СБО. |

10.2. МОЗОЧЕН УДАР

Мозочниот удар настапува поради нагло запирање на крвотокот во мозокот поради што доаѓа до оштетување на дел од мозочното ткиво.

Симптомите на мозочниот удар зависат од тоа кој дел од мозочното ткиво е оштетено. Може да се јави ненадејна слабост или вкочанетост на делови од телото (лице, раце, нозе) најчесто на истата страна на телото, збунетост, потешкотии во говорот, ослабување или загуба на видот, вртоглавица, несигурност или губење на свест.

Ако се сомневате дека повредениот има мозочен удар направете ги следниве постапки за да бидете сигурни:

1. Проверете го лицето на повредениот, натерајте го да се насмее. Ако се работи за мозочен удар ќе ви се насмее само со едната страна додека другата страна ќе биде опуштена.
2. Проверете ги рацете на повредениот замолувајќи го да ги поткрене рацете. Ако се работи за мозочен удар ќе може да ја подигне само едната рака.
3. Проверете го говорот. Поставете му неколку прашања и видете дали може да зборува и дали ве разбира додека му зборувате.

Ако кај повредениот забележите дека има присуство на гореспоменатите промени, тогаш веројатно се работи за мозочен удар и на таквиот повреден треба итно да му помогнете.

- | | |
|----------|--|
| 1 | Смирете го повредениот и повикајте ИМП или замолете некој друг да повика. |
| 2 | Внимавајте лицето да мирува и да не се напрега. Поставете го лицето во удобна лежечка положба со подигнати рамена и глава. |
| 3 | Погрижете се лицето да има доволно свеж воздух. |
| 4 | Разлабавете ја тесната облека. |
| 5 | Следете ги виталните функции свест, дишење додека чекате ИМП и доколку е потребно применете веднаш СБО. |