

Hyaluronidase

Hyaluronsyrebaserad filler används bland annat för att korrigera och konturera linjer, rynkor eller ansiktets form. Ibland måste fillern lösas upp med Hyaluronidase – ett kroppseget enzym som bryter ner sockermolekylerna som Hyaluronsyran består av.

Anledningen till att fillern behöver lösas upp kan vara om den estetiska behandlingen inte gett önskat resultat eller vid akuta komplikationer i samband med eller nära anslutning till behandlingen.

Hylase är ett licensläkemedel och kräver att en läkare har ordinerat behandlingen. Hylase innehåller ett enzym, hyaluronidase, som förekommer i vissa toxiner som t.ex. huggormsgift och gifter i vissa insektsbett. Är du en person som har kraftig allergi för liknande bett ber vi dig att berätta detta innan behandling. Vi kan därmed förbereda med vissa läkemedel (kortison, antihistamin) för att undvika en alltför kraftfull allergisk reaktion.

Resultatet

Det går inte helt att förutse eftersom det inte går att punktbehandla. Tillfällig förlust av egen vävnad/upplevelse av volymförlust i området kan förekomma.

Resultatet syns cirka 24-48 timmar efter behandlingen och att helt bryta ner hyaluronsyran (bland annat beroende på mängd och fabrikat) kan behandlingen behöva upprepas.

Det är vanligt att man blir svullen men svullnaden lägger sig ofta redan efter några timmar.

Det behandlade området med Hylase kommer att få synbart mindre volym de första två veckorna. Detta för att kroppens egna hyaluronsyra också bryts ned i samband med borttagningen av din filler. Huden återuppbyggs med ny hyaluronsyra successivt.

Vid en akut komplikation behandlas området omgående med Hyaluronidase och vid oönskat resultat görs ett pricktest före behandlingen.

Biverkningar

I mycket sällsynta fall kan behandling med Hyaluronidase ge en svår allergisk reaktion vilken kan yttra sig i form av: nässelutslag, andningssvårigheter och/eller svullnad i ansikte/tunga/hals.

Skulle en allvarlig allergisk reaktion uppstå har din injektionsbehandlare den medicinska kompetensen och de läkemedel som är nödvändiga för att behandla detta på våra kliniker.

Mindre allvarliga och vanligt förekommande injektionsrelaterade reaktioner som kan uppstå i området som behandlats: Klåda, rodnad, svullnad och/eller blåmärke, ömhet vid injektionsstället. Dessa är oftast milda till måttliga och försvinner spontant inom några dagar efter behandlingen.

Efter behandling med Hyaluronidase skal du kontakta din behandlare alternativt akutsjukvården vid nytillkomna symtom på utslag, andningssvårigheter och/eller svullnad i ansikte/tunga/hals och vid behov av ytterligare behandling bokas en ny tid enligt överenskommelse med din behandlare.

Eftervårdsråd

Efter behandlingen ska området inte vidröras på grund av risk för infektion, sminka kan du göra tidigast efter 24 timmar, undvik träning på 24 timmar, undvik extrem värme/kyla/solljus i 2 veckor.

Vid frågor efter behandlingen kontaktas kliniken omgående för vidare rådgivning.

SAMTYCKE

- > Jag förstår att det kan uppstå en volymförlust eller ojämnheter i området som behandlas med Hyaluronidase
- > Jag förstår att behandlingen kan behöva upprepas
- > Jag är införstådd med de eventuella biverkningar som kan uppstå i samband med/nära anslutning till behandling med Hyaluronidase
- > Jag har informerat min injektionsbehandlare om tidigare eventuella allergiska reaktioner, allergier, överkänslighet samt aktuella läkemedel samt en korrekt och uppdaterad hälsoanamnes. Vid utebliven/inkorrekt information kring min medicinska bakgrund samt aktuell information tar jag personligen fullt ansvar för detta.
- > Jag har fått tillräcklig information och svar på eventuella frågor om behandling med Hyaluronidase
- > Jag har fått information om eftervård och kommer att följa de råd som ges