

Steindachneridion doceana

Steindachneridion doceana (Eigenmann & Eigenmann, 1889)

Sinônimos

Nomes populares

Surubim-do-doce

Características

Principais características morfológicas e de coloração...

Galeria de fotos da espécie

Não foi encontrado nada.

Habitat e ecologia

Observações

Status de ameaça:

Mundial (IUCN, 2007) - não consta

Brasil (Biodiversitas, 2002) - Criticamente em perigo

Distribuição geográfica

Sua distribuição pretérita remete à bacia do rio Doce (MG e ES) e, possivelmente, à bacia do rio Mucuri (MG). Registros recentes de sua ocorrência (últimos 10 anos) existem para somente três localidades na bacia do rio Doce, todas em Minas Gerais: médio rio Santo Antônio, próximo à cidade de Ferros, baixo Peixes, rio Manhuaçu e no rio Piranga, acima e abaixo da cidade de Ponte Nova. O maior número de exemplares provém dessa última localidade. Importante ressaltar que, apesar desse peixe ter sido descrito com base em exemplares coletados no rio Doce entre Linhares (ES) e Aimorés (MG), a espécie foi considerada extinta no Espírito Santo quando da elaboração da lista estadual de espécies ameaçadas de extinção em 2004. No rio Mucuri, o único registro existente foi feito próximo à cidade de Carlos Chagas (MG)[1].

Referências

1. Vieira, F.; Pompeu, P.S. & Garavello, J. 2008. *Steindachneridion doceana* (Eigenmann & Eigenmann, 1889) In: A.B.M. Machado; G.M. Drummond & A.P. Paglia. (Org.). Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas, v. II, p. 52-54.

Links Externos

- <http://www.>
- <http://www.>

[Especies, Nome-do-genero, Nome-da-familia](#)
especies/steindachneridion_doceanum.txt