Espaces Vectoriels

Espaces vectoriels et sous-espaces vectoriels

Exercice 1. ♦ Dire si les ensembles suivants (munis des lois + et · usuelles, rappelées en cours) sont des espaces vectoriels. Justifier la réponse.

1. $E_1 = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x+y+z=0 \text{ et } 2x-y+3z=0\right\}$,
2. $E_2 = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; |x|=|y|\right\}$,
3. $E_3 = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x-2y+z=0\right\} \cup \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x+z=0\right\}$,
4. $E_4 = \left\{\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \;\middle|\; x_1+x_2=x_4\right\}$,
5. $E_5 = \left\{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \;\middle|\; ad-bc=1\right\}$,
6. $E_6 = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(1)=0\}$,
7. $E_7 = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P'(0)=1\}$.

Exercice 2. Dire si les ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R})$, l'espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Justifier la réponse.

1. $E_1 = \{f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid \forall x \in \mathbb{R},\ f(x) \geq 0\}$,
2. $E_2 = \{f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid f \text{ est impaire}\}$,
3. $E_3 = \{f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid f \text{ est croissante}\}$,
4. $E_4 = \{f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid \forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R},\ f(x+y) = f(x)+f(y)\}$,
5. $E_5 = \left\{f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \;\middle|\; f \text{ est continue sur } \mathbb{R} \text{ et pour tout } a \geq 0, \int_{-a}^{a} f(t)dt = 0\right\}$.

Exercice 3. Soient F, G et H trois sous-espaces vectoriels d'un même espace vectoriel E.

1. Montrer que $F \cup G$ est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si $F \subset G$ ou $G \subset F$.
2. Montrer que $F+G$ est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant F et G, au sens suivant : si K est un sous-espace vectoriel de E contenant F et G, alors $F+G \subset K$.
3. Montrer que l'on a $(F \cap G) + (F \cap H) \subset F \cap (G+H)$ et donner un exemple où l'inclusion est stricte.

Exercice 4. ♦ Les sous-espaces vectoriels F et G des espaces vectoriels E suivants sont-ils supplémentaires dans E? Justifier.

1. $E = \mathbb{R}^2$, $F = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x+y=0\right\}$ et $G = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x=y\right\}$,
2. $E = \mathbb{R}^3$, $\quad F = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x-y+z=0\right\}$
   et $G = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; 2x+y-z=0\right\}$,
3. $E = \mathbb{R}[X]$, $\quad F = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P''(X)=0\}$
   et $G = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(0)=0 \text{ et } P'(0)=0\}$.

Exercice 5. On définit les sous-ensembles de $M_2(\mathbb{R})$ suivants :

$$\mathcal{S} = \left\{\begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \;\middle|\; a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}, d \in \mathbb{R}\right\} \quad \text{et} \quad \mathcal{A} = \left\{\begin{pmatrix} 0 & -c \\ c & 0 \end{pmatrix} \;\middle|\; c \in \mathbb{R}\right\}.$$

1. ♦ Montrer que $\mathcal{S}$ et $\mathcal{A}$ sont des sous-espaces vectoriels de $M_2(\mathbb{R})$.
2. ♦ Montrer que $M_2(\mathbb{R}) = \mathcal{S} \oplus \mathcal{A}$ (i.e. $\mathcal{S}$ et $\mathcal{A}$ sont supplémentaires dans $M_2(\mathbb{R})$).
3. Généraliser à $M_n(\mathbb{R})$ avec $n \geq 2$.

Exercice 6. ♦ Soit $n \geq 2$, soit $D = \{(x,\dots,x) \in \mathbb{R}^n \mid x \in \mathbb{R}\}$ et soit $H = \{(x_1,\dots,x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1+\cdots+x_n=0\}$.
Montrer que $D \oplus H = \mathbb{R}^n$.

Exercice 7. Soit $F = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R}) \mid f(0)=f(1)=0\}$.

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R})$.
2. Soit $h \in \mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R})$. Déterminer a, b dans $\mathbb{R}$ tels que la fonction f définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $f(x) = h(x) - (ax+b)$ vérifie $f \in F$.
3. En déduire un supplémentaire de F dans $\mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R})$.

Exercice 8. On considère les sous-ensembles suivants de l'espace vectoriel des suites à valeurs réelles (noté $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$) :

$$F = \left\{u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \;\middle|\; \forall n \in \mathbb{N},\ u_{2n} = u_{2n+1}\right\} \quad \text{et} \quad G = \left\{u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \;\middle|\; \forall n \in \mathbb{N},\ u_{2n} = 0\right\}.$$

1. Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.
2. Montrer que F et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Familles de vecteurs

Exercice 9. ♦ J Soient $u = (1,1,0)$, $v = (4,-2,6)$ et $w = (1,-2,3)$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$.

1. Trouver des nombres réels non tous nuls α, β et γ tels que $\alpha u + \beta v + \gamma w = 0_{\mathbb{R}^3}$.
2. Que peut-on dire de la famille $\{u, v, w\}$?

Exercice 10. ♦ VOn considère dans $\mathbb{R}^3$ les vecteurs

$$v_1 = (1,0,1), \quad v_2 = (4,1,-4) \quad \text{et} \quad v_3 = (-2,-1,6).$$

1. Vérifier que chacune des trois familles $\{v_1, v_2\}$, $\{v_1, v_3\}$ et $\{v_2, v_3\}$ est libre.
2. Montrer que la famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ est liée.

Exercice 11. ♦ J Les familles suivantes sont-elles libres ? Justifier.

1. $\{(1,0,1),(0,2,2),(3,7,1)\}$ dans $\mathbb{R}^3$,
2. $\{(1,0,0),(0,1,1),(1,1,1)\}$ dans $\mathbb{R}^3$,
3. $\{(1,2,1,2,1),(2,1,2,1,2),(1,0,1,1,0),(0,1,0,0,1)\}$ dans $\mathbb{R}^5$,
4. $\mathcal{F} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$ dans $M_2(\mathbb{R})$.

Exercice 12. V On considère les vecteurs $u_1 = (1,-1,1)$, $u_2 = (-2,2,-2)$ et $u_3 = (1,0,-1)$ de $\mathbb{R}^3$.

1. Peut-on trouver $v \in \mathbb{R}^3$ tel que la famille $\{u_1, u_2, v\}$ soit libre ?
2. Peut-on trouver $v \in \mathbb{R}^3$ tel que la famille $\{u_1, u_3, v\}$ soit libre ?

Exercice 13. V Dire, en justifiant, si les familles $\mathcal{F}$ des espaces vectoriels E ci-après sont libres ou liées.

1. $E = \mathbb{R}^6$ et $\mathcal{F} = \{(2,4,3,-1,4,-1),(1,1,2,1,3,1),(0,-1,0,3,6,2)\}$,
2. $E = M_2(\mathbb{R})$ et $\mathcal{F} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$,
3. $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $\mathcal{F} = \left\{ x \mapsto e^{-x}, x \mapsto e^{x}, x \mapsto e^{2x} \right\}$.

Exercice 14. ♦ J Soit $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ une famille libre d'un espace vectoriel E. Les familles de E suivantes sont-elles libres ? Justifier.

a) $\mathcal{F}_1 = \{e_1, 2e_2, e_3\}$,
b) $\mathcal{F}_2 = \{e_1, e_3\}$,
c) $\mathcal{F}_3 = \{3e_1 + e_3, e_3, e_2 + e_3\}$,
d) $\mathcal{F}_4 = \{2e_1 + e_2, e_1 - 3e_2, e_4, e_2 - e_1\}$.

Exercice 15. V Soit $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ une famille libre d'un espace vectoriel E. Les familles de E suivantes sont-elles libres ou liées ? Justifier.

1. $\mathcal{F}_1 = \{e_1 - e_2,\ e_2 - e_3,\ e_3 - e_4,\ e_1 - e_4\}$,
2. $\mathcal{F}_2 = \{e_1 + e_2,\ e_2 + e_3,\ e_3 + e_4,\ e_1 + e_4\}$,
3. $\mathcal{F}_3 = \{e_1,\ e_1 + e_2,\ e_1 + e_2 + e_3,\ e_1 + e_2 + e_3 + e_4\}$.

Exercice 16. ♦ J Soit $\mathcal{F}$ une famille finie de vecteurs d'un espace vectoriel E. Montrer que

1. si $0_E \in \mathcal{F}$, alors $\mathcal{F}$ est liée,
2. si $\mathcal{F}$ contient deux vecteurs égaux, alors $\mathcal{F}$ est liée.

Exercice 17. V Soient $\mathcal{F}, \mathcal{F}'$ deux familles d'un espace vectoriel E. Dire si les assertions suivantes sont vraies ou fausses en justifiant par un contre-exemple ou une courte démonstration.

1. Si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{F}'$ sont libres et si $\mathcal{F} \cap \mathcal{F}' \neq \varnothing$, alors $\mathcal{F} \cap \mathcal{F}'$ est libre,
2. Si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{F}'$ engendrent E et si $\mathcal{F} \cap \mathcal{F}' \neq \varnothing$, alors $\mathcal{F} \cap \mathcal{F}'$ engendre E,
3. Si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{F}'$ sont libres, alors $\mathcal{F} \cup \mathcal{F}'$ est libre,
4. Si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{F}'$ sont génératrices de E, alors $\mathcal{F} \cup \mathcal{F}'$ est génératrice de E.

Exercice 18. ♦ J On considère les vecteurs de $\mathbb{R}^4$ suivants :

$$u_1 = (0,1,-2,1), \quad u_2 = (1,0,2,-1), \quad u_3 = (3,2,2,-1), \quad u_4 = (0,0,1,0).$$

Dire, en justifiant, si les propositions suivantes sont vraies ou fausses.

1. $\mathrm{Vect}(u_1, u_2, u_3) = \mathrm{Vect}\left((1,1,0,0),(-1,1,-4,2)\right)$,
2. $(1,1,0,0) \in \mathrm{Vect}(u_1, u_2) \cap \mathrm{Vect}(u_2, u_3, u_4)$,
3. $\mathrm{Vect}(u_1, u_2) + \mathrm{Vect}(u_2, u_3, u_4) = \mathbb{R}^4$.

Exercice 19. V Dans $\mathbb{R}^3$, soient $F = \mathrm{Vect}\left((2,3,-1),(1,-1,-2)\right)$ et $G = \mathrm{Vect}\left((3,7,0),(5,0,-7)\right)$. Démontrer que $F = G$.

Exercice 20. ♦ J Donner une base de chacun des espaces vectoriels suivants:

a) $F_1 = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y\right\}$,
b) $F_2 = \mathrm{Vect}((2,1),(0,1),(-3,-1))$,
c) $F_3 = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid \deg(P) \leq 2 \text{ et } P(0) = 0\}$,
d) $F_4 = \left\{ \begin{pmatrix} a & a+b \\ 0 & 2a \end{pmatrix} \text{ avec } a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R} \right\}$.

Exercice 21. ♦

1. On considère dans $\mathbb{R}^2$ les vecteurs $u_1 = (1,1)$ et $u_2 = (1,-1)$.
   (a) Montrer que $\mathcal{B} = (u_1, u_2)$ est une base de $\mathbb{R}^2$.
   (b) Quelles sont les coordonnées des vecteurs e_1 et e_2 de la base canonique dans la base $\mathcal{B}$?
2. On considère dans $\mathbb{R}^3$ les vecteurs $v_1 = (1,0,0)$, $v_2 = (-2,1,0)$ et $v_3 = (1,-3,1)$.
   (a) Montrer que $\mathcal{D} = (v_1, v_2, v_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
   (b) Quelles sont les coordonnées des vecteurs $w_1 = (4,-5,1)$ et $w_2 = (0,0,1)$ dans la base $\mathcal{D}$?
3. On considère dans $\mathbb{R}_3[X]$ les polynômes $P_0 = 1$, $P_1 = X+1$, $P_2 = (X+1)^2$ et $P_3 = (X+1)^3$.
   (a) Montrer que $\mathcal{E} = (P_0, P_1, P_2, P_3)$ est une base de $\mathbb{R}_3[X]$.
   (b) Quelles sont les coordonnées des vecteurs $P = X^2$ et $Q = 1 + X + X^2 + X^3$ dans la base $\mathcal{E}$?

Dimension des espaces vectoriels

Exercice 22. ♦ V Déterminer la dimension des espaces vectoriels suivants :

1. $F_1 = \text{Vect}\left((1,2,-1,1),(-3,-2,3,2),(-1,0,1,1),(2,3,-2,1)\right)$,
2. $F_2 = \text{Vect}\left((1,1,1),(1,2,3),(1,0,-1)\right)$,
3. $F_3 = \text{Vect}\left((1,0,0,0),(1,2,0,0),(1,2,3,0),(1,2,3,4)\right)$,
4. $F_4 = \left\{(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; x+y+z+t = 0 \text{ et } x+2y+3z+4t = 0\right\}$.

Exercice 23. ♦ J Dans chacun des cas suivants, déterminer la dimension de F et de G puis préciser s'ils sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^4$ en justifiant la réponse.

1. $F = \left\{(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; x+y = z+t = 0\right\}$ et $G = \{(2a,-a,0,a), \text{ avec } a \in \mathbb{R}\}$;
2. $F = \left\{(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; x-y+z-t = 0 \text{ et } 2z+t = 0\right\}$
   et $G = \left\{(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; y-z = 0 \text{ et } y+z+t = 0\right\}$;
3. $F = \left\{(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; x+y = 0 \text{ et } x-z+t = 0\right\}$
   et $G = \left\{(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; 2x-z = 0 \text{ et } 2x+y+t = 0\right\}$.

Exercice 24. ♦ V Soit F le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ engendré par les vecteurs $v_1 = (1,3,-2,2)$, $v_2 = (2,7,-5,6)$ et $v_3 = (1,2,-1,0)$. Soit G le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ engendré par les vecteurs $w_1 = (1,3,0,2)$, $w_2 = (2,7,-3,6)$ et $w_3 = (1,1,6,-2)$.

1. Montrer que v_3 est une combinaison linéaire de v_1 et v_2. En déduire que F est engendré par v_1 et v_2. Donner une base de F et les coordonnées de v_3 dans cette base.
2. Montrer que w_3 est combinaison linéaire de w_1 et w_2. En déduire que G est engendré par w_1 et w_2. Donner une base de G et les coordonnées de w_3 dans cette base.
3. Montrer que la famille $\{v_1, v_2, w_1, w_2\}$ est liée. En déduire une famille génératrice puis une base de $F+G$.
4. Soit $E = \left\{(x_1,x_2,x_3,x_4) \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; 4x_1 - 2x_2 + x_4 = 0\right\}$.
   (a) Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$
   (b) Déterminer une famille génératrice puis une base de E.
5. Établir l'égalité $E = F + G$. Cette somme est-elle directe ? En déduire la dimension de $F \cap G$ à l'aide d'une formule du cours.

Exercice 25. J On considère dans $\mathbb{R}^4$ les vecteurs $u_1 = (2,1,0,1)$ et$u_2 = (0,1,-1,1)$.

1. Montrer que la famille $\{u_1, u_2\}$ est libre et la compléter en une base $\mathcal{B} = (u_1, u_2, v_1, v_2)$ de $\mathbb{R}^4$.

On note $F = \text{Vect}(u_1, u_2)$, $H_1 = \text{Vect}(u_1, u_2, v_1)$ et $H_2 = \text{Vect}(u_1, u_2, v_2)$.

2. Quelle est la dimension de F ? de H_1 ? de H_2 ? de $H_1 + H_2$?
3. Montrer que $F = H_1 \cap H_2$.
4. Déterminer une équation cartésienne de H_1 ; c'est-à-dire trouver quatre nombres réels a, b, c, d tels que pour tout vecteur $u = (x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4$, on a :
   $$u \in H_1 \iff ax + by + cz + dt = 0.$$
   Faire de même avec H_2 et en déduire un système d'équations cartésiennes de F.

On note $G = \text{Vect}(v_1, v_2)$.

5. Justifier que l'on a $\mathbb{R}^4 = F \oplus G$. Soit $u = (a,b,c,d) \in \mathbb{R}^4$. Déterminer en fonction de a, b, c, d, les vecteurs $v \in F$ et $w \in G$ tels que $u = v + w$.

Exercice 26. ♦ V Soient F et G les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^4$ suivants :

$$F = \left\{(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; x+y+z = 0 \text{ et } 2x+y+z-t = 0\right\},$$
$$G = \text{Vect}\left((1,-2,1,1),(1,2,-3,1),(5,-3,-2,5)\right).$$

1. Calculer la dimension de F et justifier que $\dim(G) \geq 2$.
2. Montrer que $G \subset F$ et en déduire avec la question précédente que l'on a $G = F$.
3. Déterminer un supplémentaire de F dans $\mathbb{R}^4$.

Exercice 27. J

1. Pour quelles valeurs du paramètre réel t la famille ordonnée $\big((1,t),(t,3)\big)$ est-elle une base de $\mathbb{R}^2$?
2. Même question avec la famille ordonnée $\big((1,0,t),(1,1,t),(t,0,1)\big)$ de vecteurs de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 28. V Soient F et G les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^4$ suivants :

$$F = \big\{(a,b,c,d) \in \mathbb{R}^4 \;\big|\; b - 2c + d = 0\big\} \quad \text{et} \quad G = \big\{(a,b,c,d) \in \mathbb{R}^4 \;\big|\; a = d \text{ et } b = 2c\big\}.$$

1. ♦ Trouver une base de F. En déduire sa dimension puis compléter cette base de F pour obtenir une base de $\mathbb{R}^4$.
2. Mêmes questions pour G puis pour $F \cap G$.

Exercice 29. J Soient F et G deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E de dimension finie.

1. Soit F' un supplémentaire de $F \cap G$ dans F. Montrer que F' est un supplémentaire de G dans $F + G$, c'est-à-dire $F' \oplus G = F + G$.
2. En déduire la formule suivante (vue en cours) :
$$\dim(F+G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G).$$
3. Montrer que si $F \cap G = \{0_E\}$ et $\dim(F) + \dim(G) = \dim(E)$, alors on a $E = F \oplus G$.

Exercice 30. V Soient F un sous-espace vectoriel strict d'un espace vectoriel E (i.e. $F \neq \{0_E\}$ et $F \neq E$) et G un supplémentaire de F dans E.

1. Montrer qu'il existe $x \in E \setminus (F \cup G)$.
2. Soit G' un supplémentaire de $F + \mathrm{Vect}(x)$. Montrer que $G' \oplus \mathrm{Vect}(x)$ est un supplémentaire de F distinct de G.

Extraits d'examens d'années précédentes

Exercice 31 (Extrait de l'examen intermédiaire 2017–2018)**.** Soient

$$\begin{aligned} F &= \{(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 \mid 2x - y + 4z + 3t = 0\}, \\ G &= \{(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 \mid y - 4z + 3t = 0\}, \\ H &= \mathrm{Vect}\left((-3,1,1,1),(6,2,-1,-2),(3,11,2,-1)\right). \end{aligned}$$

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ et en donner une base, puis la dimension.
2. Montrer que $F \cap G$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ et en donner une base, puis la dimension.
3. Compléter la base de $F \cap G$ trouvée dans la question précédente en une base de $\mathbb{R}^4$ et déterminer un supplémentaire de $F \cap G$ dans $\mathbb{R}^4$.
4. Montrer que $H \subset F \cap G$, et en déduire que $H = F \cap G$.

Exercice 32 (Extrait de l'examen intermédiaire 2018-2019)**.** Soit E l'ensemble défini par

$$E = \big\{(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 \;\big|\; x + y = 0 \text{ et } x + z - t = 0\big\}$$

et F le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ engendré par les vecteurs $u_1 = (-1,0,1,-1)$ et $u_2 = (0,1,0,1)$.

1. Prouver que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ engendré par deux vecteurs v_1 et v_2 à déterminer.
2. Donner une base et la dimension de E.
3. Justifier que $\dim(F) = 2$.
4. Montrer que la famille $\{u_1, u_2, v_1, v_2\}$ n'est pas libre.
5. Déterminer une famille génératrice puis une base et la dimension de $E + F$.
6. (a) Vérifier que le vecteur $u_1 + u_2$ appartient à E.
   (b) Donner la dimension et une base de $E \cap F$.
7. Les sous-espaces vectoriels E et F sont-ils supplémentaires dans $\mathbb{R}^4$? Justifier.

Exercice 33 (Extrait de l'examen intermédiaire 2019-2020)**.** Soit $E = \mathbb{R}^4$ et $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3, e_4)$ sa base canonique. On considère les vecteurs suivants de E

$$v_1 = (1,1,0,0), \quad v_2 = (1,1,1,0), \quad v_3 = (1,1,1,1) \quad \text{et} \quad v_4 = (2,2,1,3)$$

et les sous-espaces vectoriels suivants de E

$$F = \mathrm{Vect}(v_1, v_2, v_3, v_4) \quad \text{et} \quad G = \big\{(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 \;\big|\; y = 0\big\}.$$

1. (a) Montrer que $v_4 \in \mathrm{Vect}(v_1, v_2, v_3)$.
   (b) Donner une base de F et déduire la dimension de F.
2. (a) En utilisant la définition du cours, montrer que G est un sous-espace vectoriel de E.
   (b) Donner une base de G et déduire la dimension de G.
3. (a) Montrer que le vecteur e_1 n'est pas dans F puis que les vecteurs e_3 et e_4 sont dans $F \cap G$.

(b) Déterminer une base de $F \cap G$ et déduire la dimension de ce sous-espace vectoriel de E.

(c) Montrer que les sous-espaces vectoriels F et G ne sont pas supplémentaires dans E.

4. Déduire que $F + G = \mathbb{R}^4$.

5. Trouver un supplémentaire de F dans E.

Correction des exercices

N'hésitez pas à signaler les inévitables coquilles et à transmettre vos commentaires à Julian Le Clainche ou à Vincent Souveton.

Espaces vectoriels et sous-espaces vectoriels

Correction de l'Exercice 1.

Dans cet exercice, on doit montrer que les ensembles proposés sont ou non des espaces vectoriels. Pour ce faire, on pourrait vérifier chacun des 8 axiomes définissant un espace vectoriel mais ceci est très long et fastidieux. En général, pour montrer qu'un ensemble F est un espace vectoriel, on montre que c'est un sous espace vectoriel d'un espace vectoriel connu $(E, +, \cdot)$ ($\boldsymbol{R}^n$, $\boldsymbol{R}[X]$, $\mathcal{F}(\boldsymbol{R}, \boldsymbol{R})$,...). On doit alors vérifier 3 points :

(i) $F \neq \emptyset$,

(ii) F est stable par l'addition $+$,

(iii) F est stable par la multiplication externe $\cdot$.

1. $E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3,\ x + y + z = 0, 2x - y + 3z = 0\}$

   - On a $0 + 0 + 0 = 0$ et $2 \times 0 - 0 + 3 \times 0 = 0$ donc $(0, 0, 0) \in E_1 \neq \emptyset$
   - Soient $u_1 = (x_1, y_1, z_1)$ et $u_2 = (x_2, y_2, z_2)$ deux éléments de E_1, on pose $v = u_1 + u_2 = (x, y, z)$.
     D'une part, $x + y + z = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) + (z_1 + z_2) = x_1 + y_1 + z_1 + x_2 + y_2 + z_2 = 0$ car $u_1, u_2 \in E_1$
     D'autre part, $2x - y + 3z = 2(x_1 + x_2) - (y_1 + y_2) + 3(z_1 + z_2) = 2x_1 - y_1 + 3z_1 + 2x_2 - y_2 + 3z_2 = 0$ car $u_1, u_2 \in E_1$
     Donc $v \in E_1$ et E_1 est stable par addition.
   - Soient $u = (x, y, z) \in E_1$ et $\lambda \in \mathbf{R}$, on note $v = \lambda \cdot u$
     D'une part, $\lambda x + \lambda y + \lambda z = \lambda(x + y + z) = 0$ car $u \in E_1$ D'autre part, $2\lambda x - \lambda y + 3\lambda z = \lambda(2x - y + 3z) = 0$ car $u \in E_1$
     Ainsi, $v = \lambda \cdot u \in E_1$ donc E_1 est stable par multiplication externe.

   On a donc montré que E_1 est un sous espace vectoriel de $\mathbf{R}^3$, donc c'est un espace vectoriel.

2. $E_2 = \{(x,y) \in \mathbf{R}^2,\ |x| = |y|\}$

   L'ensemble E_2 n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbf{R}^2$. En effet, l'ensemble E_2 n'est pas stable par addition. Par exemple, si on note $u = (1,1)$ et $v = (-1,1)$, on a $u, v \in E_2$ mais $u + v = (0,2) \notin E_2$ car $|0| = 0 \neq 2 = |2|$

3. $E_3 = \{(x,y,z) \in \mathbf{R}^3,\ x - 2y + z = 0\} \cup \{(x,y,z) \in \mathbf{R}^3,\ x + z = 0\}$

   Comme on va le voir dans l'exercice 3, une union de sous-espaces vectoriels n'est en général pas un espace vectoriel (penser à la réunion de deux droites non confondues dans le plan). Ce qui fait défaut en général pour la réunion de deux sous-espaces, c'est la stabilité pour l'addition.

   On considère $u = (1,1,1) \in \{(x,y,z) \in \mathbf{R}^3,\ x - 2y + z = 0\} \subset E_3$ et $v = (0,1,0) \in \{(x,y,z) \in \mathbf{R}^3,\ x + z = 0\} \subset E_3$, on pose $w = u + v = (1,2,1)$.

   On a $1 - 2 \times 2 + 1 = -2 \neq 0$ et $1 + 1 = 2 \neq 0$ donc $w \neq E_3$.

   Ainsi E_3 n'est pas stable par l'addition et n'est donc pas un sous-espace vectoriel de $\mathbf{R}^3$.

4. $E_4 = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbf{R}),\ x_1 + x_2 = x_4 \right\}$

   - On a $0 + 0 = 0$ donc $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in E_4 \neq \emptyset$
   - Soient $M_1 = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}$ et $M_2 = \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ y_3 & y_4 \end{pmatrix}$ deux éléments de E_4, on pose $N = M_1 + M_2 = \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ z_3 & z_4 \end{pmatrix}$.
     On a $z_1 + z_2 = (x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) = x_1 + x_2 + y_1 + y_2 = x_4 + y_4 = z_4$ donc $N \in E_4$ et E_4 est stable par addition.
   - Soient $M = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \in E_4$ et $\lambda \in \mathbf{R}$.
     On a $\lambda x_1 + \lambda x_2 = \lambda(x_1 + x_2) = \lambda x_4$ donc $\lambda \cdot M \in E_4$ et E_4 est stable par multiplication externe.

   On a donc montré que E_4 est un sous espace vectoriel de $M_2(\mathbf{R})$, donc c'est un espace vectoriel.

5. $E_5 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbf{R}),\ ad - bc = 1 \right\}$

   On sait qu'un sous-espace vectoriel F de E contient nécessairement 0_E. De plus, si $(E,+,\cdot)$ est un espace vectoriel et que $(F,+,\cdot)$ aussi, avec $F \subset E$, alors F est nécessairement un sous-espace vectoriel de E. Donc, si un ensemble $H \subset E$ ne contient pas 0_E, alors $(H,+,\cdot)$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $(E,+,\cdot)$, et donc pas un espace vectoriel.

   Soit $0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbf{R})$ la matrice nulle, on a $0 \times 0 - 0 \times 0 = 0 \neq 1$ donc $0 \notin E_5$ et donc E_5 n'est pas un sous-espace vectoriel de $M_2(\mathbf{R})$.

6. $E_6 = \{P \in \mathbf{R}[X], P(1) = 0\}$

   - Il est clair que $0 \in E_6 \neq \emptyset$
   - Soient $P, Q \in E_6$, on a $(P+Q)(1) = P(1) + Q(1) = 0$ donc $P + Q \in E_6$ et E_6 est stable pour l'addition.
   - Soit $P \in E_6$ et $\lambda \in \mathbf{R}$, $(\lambda P)(1) = \lambda(P(1)) = 0$ donc $\lambda P \in E_6$.

   On a donc montré que E_6 est un sous espace vectoriel de $\mathbf{R}[X]$, donc c'est un espace vectoriel.

7. $E_7 = \{P \in \mathbf{R}[X], P'(0) = 1\}$

   Il est évident que $0 \notin E_7$ car la dérivée du polynôme nul est le polynôme nul. Ainsi, E_7 n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbf{R}[X]$.

Correction de l'Exercice 2.

1. $E_1 = \{f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}, \forall x \in \mathbf{R}, f(x) \geq 0\}$

   Il est assez clair ici que E_1 n'est pas stable par multiplication par un scalaire. En effet, si on considère par exemple la fonction constante $f = 1$, $f \in E_1$ mais $(-1) \cdot f = -f \cong -1 \notin E_1$ donc E_1 n'est pas stable par multiplication externe donc n'est pas un sous-espace vectoriel.

2. $E_2 = \{f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}, f \text{ est impaire}\}$

   On rappelle que f impaire signifie que pour tout $x \in \mathbf{R}$, $f(-x) = -f(x)$.

   - Il est clair que $0 \in E_2 \neq \emptyset$
   - Soient $f, g \in E_2$, on pose $h = f + g$.
     Pour $x \in \mathbf{R}$, on a $h(-x) = (f+g)(-x) = f(-x) + g(-x) = -f(x) - g(x) = -h(x)$ et h est impaire donc $h = f + g \in E_2$ et E_2 est stable pour l'addition.
   - Soit $f \in E_2$ et $\lambda \in \mathbf{R}$, pour $x \in \mathbf{R}$, $(\lambda f)(-x) = \lambda(f(-x)) = -\lambda f(x)$ donc $\lambda f \in E_2$.

   On a donc montré que E_2 est un sous espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbf{R}, \mathbf{R})$, donc c'est un espace vectoriel.

3. $E_3 = \{f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}, f \text{ est croissante}\}$

   Comme dans le cas de E_1, on va montrer que E_3 n'est pas stable par multiplication externe.
   En effet, $f : x \mapsto x$ est croissante donc $f \in E_3$ cependant, $-f : x \mapsto -x$ est

strictement décroissante donc $-f \notin E_3$ et E_3 n'est pas stable par multiplication externe.
Ainsi, E_3 n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbf{R},\mathbf{R})$.

4. $E_4 = \{f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}, \forall x, y \in \mathbf{R},\ f(x+y) = f(x) + f(y)\}$

   - Il est clair que $0 \in E_4 \neq \emptyset$
   - Soient $f, g \in E_4$, on pose $h = f + g$.
     Pour $x, y \in \mathbf{R}$, on a $h(x+y) = f(x+y)+g(x+y) = f(x)+f(y)+g(x)+g(y) = h(x) + h(y)$ donc $h = f + g \in E_4$ et E_4 est stable pour l'addition.
   - Soit $f \in E_4$ et $\lambda \in \mathbf{R}$, pour $x, y \in \mathbf{R}$, $(\lambda f)(x+y) = \lambda(f(x+y)) = \lambda(f(x) + f(x)) = \lambda f(x) + \lambda f(y)$ donc $\lambda f \in E_4$ et E_4 est stable par multiplication externe.

   On a donc montré que E_4 est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbf{R},\mathbf{R})$.

5. $E_5 = \{f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}, f$ est continue et pour tout $a \geq 0, \int\limits_{-a}^{a} f(t)dt = 0\}$

   - Il est clair que $0 \in E_5 \neq \emptyset$
   - Soient $f, g \in E_5$, on pose $h = f + g$.
     La fonction h est continue comme somme de fonctions continues et pour $a \geq 0$,
     $\int\limits_{-a}^{a} h(t)dt = \int\limits_{-a}^{a} f(t)dt + \int\limits_{-a}^{a} g(t)dt = 0$ donc $h \in E_5$
   - Soit $f \in E_5$ et $\lambda \in \mathbf{R}$, λf est continue et pour $a \geq 0$ $\int\limits_{-a}^{a} \lambda f(t)dt = \lambda \int\limits_{-a}^{a} f(t)dt = \lambda \times 0 = 0$ donc $\lambda f \in E_5$ et E_4 est stable par multiplication externe.

   Ainsi, E_5 est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbf{R},\mathbf{R})$.

Correction de l'Exercice 3.

Soit E un espace vectoriel, soient F, G, H trois sous-espaces vectoriels de E

1. On veut montrer que $F \cup G$ est un sous-espace vectoriel de E *ssi* ($F \subset G$ ou $G \subset F$).

   Pour cela on raisonne par double implication :

   $\boxed{\Leftarrow}$

   Ce sens est évident. En effet, si $F \subset G$, alors $F \cup G = G$ est un sous-espace vectoriel de E par hypothèse.

   $\boxed{\Rightarrow}$

   On suppose que $F \cup G$ est un sous-espace vectoriel de E.

   <u>Cas 1</u> : $F \subset G$ alors on a le résultat

   <u>Cas 2</u> : $F \not\subset G$

   On va montrer que $G \subset F$. Par hypothèse, il existe $x \in F$ tel que $x \notin G$.
   Soit $y \in G$, on a $x + y \in F \cup G$ car $F \cup G$ est un sous-espace vectoriel de E.

   - Si $x + y \in G$, alors $x = (x + y) - y \in G$ car G est un sous-espace vectoriel de E Or par définition, $x \notin G$ ceci est donc absurde.
   - On a donc $x + y \in F$ et alors, $y = (x + y) - x \in F$ car F est un sous-espace vectoriel de E.

   On a donc montré que si $y \in G$ alors $y \in F$ autrement dit $G \subset F$.

   On a bien prouvé l'équivalence annoncée.

2. On veut montrer que si K est un sous-espace vectoriel de E tel que $F \subset K$ et $G \subset K$ alors $F + G \subset K$.

   Soit K un tel sous-espace vectoriel de E.

   Soit $z \in F + G$, alors il existe $x \in F$ et $y \in G$ tels que $z = x + y$.

   Par hypothèse sur K, on a $x \in K$ et $y \in K$ or K étant un sous-espace vectoriel de E, on a $z = x + y \in K$ d'où le résultat.

3. - Soit $z \in (F \cap G) + (F \cap H)$, par définition, il existe $x \in F \cap G$ et $y \in F \cap H$ tels que $z = x + y$.
     D'une part, $x, y \in F$ or F est un sous-espace vectoriel de E donc $z = x+y \in F$,
     d'autre part, $x \in G$ et $y \in H$ donc $z = x + y \in G + H$.
     Ainsi, on a $z \in F \cap (G + H)$ et on a montré l'inclusion de sous-espaces demandée.
   - On considère l'espace $E = \mathbf{R}^2$, on pose $F = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2,\ x = 0\}$, $G = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2,\ y = 0\}$ et $H = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2,\ x = y\}$.
     On a d'une part $(F \cap G) = 0$ et $(F \cap H) = 0$ donc $(F \cap G) + (F \cap H) = 0$.
     D'autre part, $G + H = \mathbf{R}^2$ donc $F \cap (G + H) = F = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2,\ x = 0\}$ et l'inclusion est stricte.

Correction de l'Exercice 4.

Pour montrer que deux sous-espaces vectoriels F et G sont supplémentaires dans E, on doit vérifier les deux points suivants :

- $*$ *$F \cap G = \{0\}$, on dit alors que F et G sont en somme directe noté $F + G = F \oplus G$*

* *$E = F + G$, autrement dit, tout élément x de E peut s'écrire $x = y + z$ avec $y \in F$ et $z \in G$.*

En général, montrer le deuxième point est plus difficile

1. $E = \mathbf{R}^2,\ F = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid x + y = 0\},\ G = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid x = y\}$

   - Montrons que $F \cap G = \{0\}$. On sait que $F \cap G$ est un sous espace vectoriel de E donc $0 \in F \cap G$ et il suffit de montrer que $F \cap G \subset \{0\}$.

     Soit $(x, y) \in F \cap G$, on a alors $\begin{cases} x + y = 0 \\ x - y = 0 \end{cases}$, autrement dit, $x = y$ et $x = -y$.

     On en déduit alors $x = -x$ et donc $x = 0$ puis $x = y$ donne $y = 0$.

     On a donc montré que $F \cap G = \{0\}$.

   - Montrons que $F + G = E$

     De manière générale, pour montrer que $F + G = E$, on raisonne par analyse-synthèse. L'analyse consiste à considérer un élément $x \in E$ et une décomposition $x = y + z$ avec $y \in F$ et $z \in G$ et a déduire des conditions sur y et z. La synthèse consiste à vérifier que des éléments y et z vérifiant les conditions trouvées vérifient $x = y + z$, $y \in F$ et $z \in G$.
     L'analyse peut ne pas figurer sur votre copie, vous pouvez la faire au brouillon et ne reporter que la "synthèse" sur votre copie (sans la nommer ainsi).

     On raisonne par analyse-synthèse

     <u>Analyse</u> Soit $(x, y) \in \mathbf{R}^2$, on suppose que $(x, y) = (a, b) + (u, v)$ avec $(a, b) \in F$ et $(u, v) \in G$. On a alors, par définition de F et G, $b = -a$ et $u = v$. D'où $\begin{cases} x = a + u \\ y = b + v = u - a \end{cases}$

     On en déduit alors $u = v = \frac{x+y}{2}$ et $a = -b = \frac{x-y}{2}$.

     <u>Synthèse</u> Soit $(x, y) \in \mathbf{R}^2$, on pose $e_1 = (\frac{x-y}{2}, \frac{y-x}{2})$ et $e_2 = (\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2})$

     → On a $(x, y) = e_1 + e_2$,

     → Clairement, $e_1 \in F$ et $e_2 \in G$.

     On a donc $\mathbf{R}^2 = F + G$.

   Finalement, on a montré que $\mathbf{R}^2 = F \oplus G$.

2. $E = \mathbf{R}^3,\ F = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 \mid x - y + z = 0\},\ G = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 \mid 2x + y - z = 0\}$

   Ici, les deux espaces ne sont pas supplémentaires dans E car ils ne sont pas en somme directe ($F \cap G \neq \{0\}$). En effet, F et G sont des plans distincts dans $\mathbf{R}^3$ et on sait que l'intersection de deux tels plans est soit vide, soit une droite. Or le premier cas est exclu car les deux plans contiennent le point $(0, 0, 0)$ (ce sont des sous-espaces vectoriels).

   Pour s'en convaincre, déterminons l'équation de cette droite. Soit $(x, y, z) \in F \cap G$,

   $$\begin{cases} x - y + z = 0 \\ 2x + y - z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 3x = 0 \\ y = z \end{cases}$$

   Donc $F \cap G = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 \mid x = 0,\ y = z\}$ est la droite dirigée par le vecteur $(0, 1, 1)$. En particulier $F \cap G \neq \{0\}$, donc F et G ne sont pas en somme directe donc ne sont pas supplémentaires dans $\mathbf{R}^3$

3. $E = \mathbf{R}[X],\ F = \{P \in \mathbf{R}[X] \mid P''(X) = 0\},\ G = \{P \in \mathbf{R}[X] \mid P(0) = P'(0) = 0\}$

   - Montrons que $F \cap G = \{0\}$.

     Soit $P \in F \cap G$, on a alors $P''(X) = 0$ donc P est de degré inférieur ou égal à 1, autrement dit, il existe $a, b \in \mathbf{R}$ tels que $P = aX + b$. Or $P(0) = a = 0$ et $P'(0) = b = 0$ car $P \in G$. D'où $P = 0$ et donc $F \cap G = \{0\}$.

   - Montrons que $F + G = E$

     On raisonne par analyse-synthèse

     <u>Analyse</u> Soit $P \in \mathbf{R}[X]$, on suppose que $P = P_1 + P_2$ avec $P_1 \in F$ et $P_2 \in G$

     – <u>Cas 1</u> $deg(P) < 2$,
       On a alors $P''(X) = 0 = P_1''(X) + P_2''(X) = P_2''(X)$ car $P_1 \in F$. On a alors $P_2 \in F \cap G$ donc $P_2 = 0$ et $P_1 = P$.

     – <u>Cas 2</u> $deg \geq 2$,
       On note $P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i$, $P_1 = \sum_{i=0}^{n} b_i X^i$ et $P_2 = \sum_{i=0}^{n} c_i X^i$.
       On a $P(0) = a_0 = P_1(0) = b_0$ car $P_2 \in G$ et de même $b_1 = a_1$.
       De plus, $P_1''(X) = \sum_{k=1}^{n} k(k-1) b_k X^{k-2} = 0$ donc pour $k \geq 2$, on a $b_k = 0$ et $P_1 = a_1 X + a_0$.
       Enfin, $P_2 = P - P_1 = \sum_{i=2}^{n} a_i X^i$

     <u>Synthèse</u> Soit $P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i \in \mathbf{R}[X]$, on pose $P_1 = a_1 X + a_0$ et $P_2 = \sum_{i=2}^{n} a_i X^i$

     → On a $P = P_1 + P_2$,

     → Puisque $deg(P_1) \leq 1$, on a $P_1'' = 0$ et donc $P_1 \in F$

     → Il est immédiat que $P_2(0) = P_2'(0) = 0$ donc

     On a donc $\mathbf{R}[X] = F + G$.

   Finalement, on a montré que $\mathbf{R}[X] = F \oplus G$.

Correction de l'Exercice 5.

On définit les sous-ensembles de $M_2(\mathbf{R})$ suivant :

$$\mathcal{S} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \;\middle|\; a, b, d \in \mathbf{R} \right\} \text{ et } \mathcal{A} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & -c \\ c & 0 \end{pmatrix} \;\middle|\; c \in \mathbf{R} \right\}$$

1. Montrons que $\mathcal{S}$ et $\mathcal{A}$ sont des sous-espaces vectoriels de $M_2(\mathbf{R})$

   $\boxed{\mathcal{S}}$

   - Il est clair que $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{S} \neq \emptyset$.
   - Pour $M = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$, $M' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ b' & d' \end{pmatrix} \in \mathcal{S}$, on pose $N = M + M' = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$.

     On a $\beta = b + b'$ et $\gamma = b + b'$ donc $N = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \delta \end{pmatrix} \in \mathcal{S}$ et $\mathcal{S}$ est stable pour l'addition.
   - Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \in \mathcal{S}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a $\lambda M = \begin{pmatrix} \lambda a & \lambda b \\ \lambda b & \lambda d \end{pmatrix} \in \mathcal{S}$ donc $\mathcal{S}$ est stable par multiplication externe.

   Finalement, on a montré que $\mathcal{S}$ est un sous-espace vectoriel de $M_2(\mathbf{R})$.

   $\boxed{\mathcal{A}}$

   - Il est clair que $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{A} \neq \emptyset$.
   - Pour $M = \begin{pmatrix} 0 & -c \\ c & 0 \end{pmatrix}$, $M' = \begin{pmatrix} 0 & -c' \\ c' & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{A}$, on pose $N = M + M' = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$.

     On a $\alpha = 0 + 0 = 0$, $\delta = 0 + 0 = 0$, $\beta = -c - c'$ et $\gamma = c + c'$ donc $N = \begin{pmatrix} 0 & -\gamma \\ \gamma & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{A}$ et $\mathcal{A}$ est stable pour l'addition.
   - Soit $M = \begin{pmatrix} 0 & -c \\ c & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{A}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a $\lambda M = \begin{pmatrix} 0 & -\lambda c \\ \lambda c & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{A}$ donc $\mathcal{A}$ est stable par multiplication externe.

   Finalement, on a montré que $\mathcal{A}$ est un sous-espace vectoriel de $M_2(\mathbf{R})$.

2. Montrons que $\mathcal{S}$ et $\mathcal{A}$ sont supplémentaires dans $M_2(\mathbf{R})$.

   - Montrons que $\mathcal{S} \cap \mathcal{A} = \{0\}$.

     Soit $M = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \in \mathcal{S} \cap \mathcal{A}$. Puisque $M \in \mathcal{A}$, on a $x = t = 0$ et $y = -z$. De plus, $M \in \mathcal{S}$ donc $y = z$.
     On en déduit alors $y = -y$ et donc $y = 0$ puis $z = y$ donne $z = 0$.
     On a donc montré que $\mathcal{S} \cap \mathcal{A} = \{0\}$.
   - Montrons que $\mathcal{S} + \mathcal{A} = M_2(\mathbf{R})$
     On raisonne par analyse-synthèse
     <u>Analyse</u>
     Soit $M = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \in M_2(\mathbf{R})$, on suppose que $M = S + A$ avec $S \in \mathcal{S}$ et $A \in \mathcal{A}$.
     par définition, il existe $a, b, c, d \in \mathbf{R}$ tels que

     $$S = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \text{ et } A = \begin{pmatrix} 0 & -c \\ c & 0 \end{pmatrix}$$

     .
     On a alors

     $$\begin{cases} x = a \\ y = b - c \\ z = b + c \\ t = d \end{cases} \iff \begin{cases} a = x \\ d = t \\ b = \dfrac{y+z}{2} \\ c = \dfrac{z-y}{2} \end{cases}$$

     Donc $S = \begin{pmatrix} x & \frac{y+z}{2} \\ \frac{y+z}{2} & t \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{z-y}{2} \\ \frac{z-y}{2} & 0 \end{pmatrix}$
     <u>Synthèse</u>
     Soit $M = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \in M_2(\mathbf{R})$, on pose $S = \begin{pmatrix} x & \frac{y+z}{2} \\ \frac{y+z}{2} & t \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{z-y}{2} \\ \frac{z-y}{2} & 0 \end{pmatrix}$.
     $\rightarrow$ Il est clair que $A + S = M$
     $\rightarrow$ Par définition, on a $A \in \mathcal{A}$ et $S \in \mathcal{S}$

   Finalement, on a montré que $M_2(\mathbf{R}) = \mathcal{S} \oplus \mathcal{A}$.

3. Pour $n \geq 2$, on définit $\mathcal{S}_n(\mathbf{R}) = \{M = (m_{ij})_{i,j=1,\dots,n} \in M_n(\mathbf{R}) \mid m_{ij} = m_{ji} \forall 1 \leq i, j \leq n\}$ et $\mathcal{A}_n(\mathbf{R}) = \{M = (m_{ij})_{i,j=1,\dots,n} \in M_n(\mathbf{R}) \mid m_{ij} = -m_{ji} \forall 1 \leq i, j \leq n\}$

   Il est clair que ces deux ensembles sont des généralisations des ensembles $\mathcal{A}$ et $\mathcal{S}$ des questions précédentes. De plus, on peut montrer que ces deux ensembles sont des sous-espaces vectoriels de $M_n(\mathbf{R})$ exactement comme dans la question 1.

   On va à présent montrer que $\mathcal{A}_n(\mathbf{R})$ et $\mathcal{S}_n(\mathbf{R})$ sont supplémentaires dans $M_n(\mathbf{R})$.

- La même preuve qu'à la question précédente nous montre que $\mathcal{S}_n(\mathbf{R}) \cap \mathcal{A}_n(\mathbf{R}) = \{0\}$.
- Montrons que $\mathcal{S}_n(\mathbf{R}) + \mathcal{A}_n(\mathbf{R}) = M_n(\mathbf{R})$
  On raisonne par analyse-synthèse
  Analyse
  Soit $M = (m_{ij})_{1\leq i,j\leq n} \in M_n(\mathbf{R})$, on suppose que $M = S + A$ avec $S \in \mathcal{S}_n(\mathbf{R})$ et $A \in \mathcal{A}_n(\mathbf{R})$.
  On note $S = (s_{ij})_{1\leq i,j\leq n}$ et $A = (a_{ij})_{1\leq i,j\leq n}$, on a donc $a_{ij} = -a_{ji}$ et $s_{ij} = s_{ji}$ pour $1 \leq i, j \leq n$.
  On a alors
  $$m_{ij} = a_{ij} + s_{ij} \implies m_{ij} + m_{ji} = 2s_{ij} \text{ et } m_{ij} - m_{ji} = 2a_{ij}.$$
  Donc $S = (\frac{m_{ij}+m_{ji}}{2})_{1\leq i,j\leq n}$ et $A(\frac{m_{ij}-m_{ji}}{2})_{1\leq i,j\leq n}$.
  Synthèse
  Soit $M = (m_{ij})_{1\leq i,j\leq n} \in M_n(\mathbf{R})$, on pose $S = (\frac{m_{ij}+m_{ji}}{2})_{1\leq i,j\leq n}$ et $A(\frac{m_{ij}-m_{ji}}{2})_{1\leq i,j\leq n}$.
  $\rightarrow$ Il est clair que $A + S = M$
  $\rightarrow$ Par définition, on a $A \in \mathcal{A}$ et $S \in \mathcal{S}$

Finalement, on a montré que $\mathcal{S}_n(\mathbf{R}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbf{R}) = M_n(\mathbf{R})$.

Correction de l'Exercice 6.

On considère $D = \{(x, ..., x) \in \mathbf{R}^n \mid x \in \mathbf{R}\}$ et $H = \{(x_1, ...x_n) \in \mathbf{R}^n \mid x_1+...+x_n = 0\}$, on va montre que D et H sont supplémentaires dans $\mathbf{R}^n$.

- Montrons que $D \cap H = \{0\}$.
  Soit $(x_1, ..., x_n) \in D \cap H$, puisque $(x_1, ..., x_n) \in D$, on a $x_1 = ... = x_n$. De plus, $(x_1, ..., x_n) = (x_1, ..., x_1) \in H$ donc $x_1 + ... + x_1 = n \times x_1 = 0$, d'où $x_1 = 0$.
  Ainsi $D \cap H = \{0\}$.
- Montrons que $D + H = \mathbb{R}^n$, on raisonne par analyse-synthèse.
  Analyse
  Soit $x = (x_1, ..., x_n) \in \mathbf{R}^n$, on suppose que $x = (d, ...d)+(h_1, ...h_n)$ avec $(d, ..., d) \in D$ et $h = (h_1, ..., h_n) \in H$.
  On a $x_1+...+x_n = n\times d+(h_1+..+h_n) = n\times d$ car $h \in H$. Donc $d = \frac{x_1+...+x_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$ et $h = x - (d, .., d)$.
  Synthèse
  Soit $x = (x_1, ..., x_n) \in \mathbf{R}^n$, on pose $d = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$ et $h = x - (d, ..., d)$.
  $\rightarrow$ Au vu de la définition de h, on a clairement $x = (d, ..., d) + h$,
  $\rightarrow$ par définition de D, on a $(d, ..., d) \in D$,
  $\rightarrow$ on note $h = (h_1, ..., h_n)$, on a $h_1 + ... + h_n = (x_1 - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i) + ... + (x_n - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i) = x_1 + ... + x_n - n \times \frac{x_1+...+x_n}{n} = 0$ donc $h \in H$.

  On a donc montré que $\mathbf{R}^n = D + H$

Finalement, on a $\mathbf{R}^n = D \oplus H$

Correction de l'Exercice 7.

On considère $F = \{f \in \mathcal{F}(\mathbf{R}, \mathbf{R}) \mid f(0) = f(1) = 0\}$

1. On va montrer que F est une sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbf{R}, \mathbf{R})$
   - Clairement la fonction nulle vérifie $f(0) = f(1) = 0$ donc $0 \in F \neq 0$
   - Soient $f, g \in F$, on pose $h = f+g$. On a $h(0) = (f+g)(0) = f(0)+g(0) = 0$ et de la même manière, $h(1) = 0$ donc $h \in F$ et F est stable pour l'addition
   - Soit $f \in F$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, on a $(\lambda f)(0) = \lambda(f(0)) = 0$ et de même, $\lambda f(1) = 0$ donc $\lambda f \in F$ et F est stable pour la multiplication externe.

   On a donc montré que F est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbf{R}, \mathbf{R})$.
2. On raisonne par analyse-synthèse.
   Analyse
   Soit $h \in \mathcal{F}(\mathbf{R}, \mathbf{R})$, on suppose qu'il existe $a, b \in \mathbf{R}$ tels que $f : x \mapsto h(x) - (ax + b) \in F$.
   On a $f(0) = 0 = h(0) - b$ donc $b = h(0)$.
   On a également $f(1) = 0 = h(1) - a - b = h(1) - h(0) - a$ donc $a = h(1) - h(0)$.
   Synthèse
   Soit $h \in \mathcal{F}(\mathbf{R}, \mathbf{R})$, on pose $a = h(1) - h(0)$ et $b = h(0)$. On définit f par $f(x) = h(x) - (ax + b)$.
   On a $f(0) = h(0)-(a\times 0+b) = h(0)-b = 0$ et $f(1) = h(1)-(h(1)-h(0)+h(0) = 0$.
   Ainsi $f \in F$.
3. On note $\mathrm{Aff}(\mathbf{R})$ l'ensemble des fonctions affines sur $\mathbf{R}$. On va vérifier que $\mathrm{Aff}(\mathbf{R})$ est un supplémentaire de F dans $\mathcal{F}(\mathbf{R}, \mathbf{R})$.
   La question précédente nous permet d'affirmer que $F + \mathrm{Aff}(\mathbf{R}) = \mathcal{F}(\mathbf{R}, \mathbf{R})$. Il nous reste donc à prouver que la somme est directe ($F \cap \mathrm{Aff}(\mathbf{R}) = \{0\}$).

Soit $f \in F \cap \mathrm{Aff}(\mathbf{R})$, puisque f est une fonction affine, il existe $a, b \in \mathbb{R}$ tels que pour $x \in \mathbf{R}$, $f(x) = ax + b$. Or $f \in F$ donc $b = f(0) = 0$ et $a + b = f(1) = 0$ donc $a = b = 0$ et finalement, la fonction f est nulle. Donc $F \cap \mathrm{Aff}(\mathbf{R}) = \{0\}$.

On a donc montré que $\mathrm{Aff}(\mathbf{R})$ et F sont supplémentaires dans $\mathcal{F}(\mathbf{R}, \mathbf{R})$.

Correction de l'Exercice 8.

On considère les sous-ensembles suivant :
$F = \left\{ u \in \mathbf{R}^{\mathbf{N}} \;\middle|\; \forall n \in \mathbf{N},\ u_{2n} = u_{2n+1} \right\}$ et $G = \left\{ u \in \mathbf{R}^{\mathbf{N}} \;\middle|\; \forall n \in \mathbf{N},\ u_{2n} = 0 \right\}$

1. Montrons que F et G sont des sous-espaces vectoriels de l'ensemble des suites à valeurs réelles $\mathbf{R}^{\mathbf{N}}$.

   $\boxed{F}$

   - Soit $u = 0$ la suite nulle, elle vérifie clairement $u_{2n} = u_{2n+1} = 0$ pour tout $n \in \mathbf{N}$ donc $0 \in F \neq \emptyset$.
   - Soit $u, v \in F$, on note $w = u + v$.
     Pour $n \in \mathbf{N}$, $w_{2n} = u_{2n} + v_{2n} = u_{2n+1} + v_{2n+1} = w_{2n+1}$ donc $w = u + v \in F$ et F est stable par addition.
   - Soit $u \in F$ et $\lambda \in \mathbf{R}$, pour $n \in \mathbf{N}$, on a $(\lambda u)_{2n} = \lambda u_{2n} = \lambda u_{2n+1} = (\lambda u)_{2n+1}$ donc $\lambda u \in F$ et F est stable par multiplication externe.

   Finalement, on a montré que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbf{R}^{\mathbf{N}}$.

   $\boxed{G}$

   - Soit $u = 0$ la suite nulle, elle vérifie clairement $u_{2n} = 0$ pour tout $n \in \mathbf{N}$ donc $0 \in G \neq \emptyset$.
   - Soit $u, v \in G$, on note $w = u + v$.
     Pour $n \in \mathbf{N}$, $w_{2n} = u_{2n} + v_{2n} = 0 + 0 = 0$ donc $w = u + v \in G$ et G est stable par addition.
   - Soit $u \in G$ et $\lambda \in \mathbf{R}$, pour $n \in \mathbf{N}$, on a $(\lambda u)_{2n} = \lambda u_{2n} = \lambda \times 0 = 0$ donc $\lambda u \in G$ et G est stable par multiplication externe.

   Finalement, on a montré que G est un sous-espace vectoriel de $\mathbf{R}^{\mathbf{N}}$.

2. Montrons que F et G sont supplémentaires dans $\mathbf{R}^{\mathbf{N}}$

   - Montrons que $F \cap G = \{0\}$.
     Soit $u \in F \cap G$, puisque $u \in G$, on a pour $n \in \mathbf{N}$ $u_{2n} = 0$. Or $u \in F$ donc pour $n \in \mathbf{N}$, $u_{2n+1} = u_{2n} = 0$.
     Finalement, on a $u_n = 0$ $\forall n \in \mathbf{N}$ et donc $u = 0$.
     Ainsi, on a vérifié que $F \cap G = \{0\}$.
   - Montrons que $\mathbf{R}^{\mathbf{N}} = F + G$.
     On raisonne par analyse-synthèse.
     <u>Analyse</u>
     Soit $u \in \mathbf{R}^{\mathbf{N}}$, on suppose que $u = v + w$ avec $v \in F$ et $w \in G$.
     Pour $n \in \mathbf{N}$, on a $u_{2n} = v_{2n} + w_{2n} = v_{2n}$ car $w \in G$ et $v_{2n+1} = v_{2n} = u_{2n}$.
     On a également $w_{2n+1} = u_{2n+1} - v_{2n+1} = u_{2n+1} - u_{2n}$.
     <u>Synthèse</u>
     Soit $u \in \mathbf{R}^{\mathbf{N}}$, soit $v, w \in \mathbf{R}^{\mathbf{N}}$ définies par $v_{2n} = v_{2n+1} = u_{2_n}$ pour $n \in \mathbf{N}$ et $w = u - v$.
     $\rightarrow$ La définition de v et w donne immédiatement $u = v + w$,
     $\rightarrow$ par définition, il est clair que $v \in F$,
     $\rightarrow$ pour $n \in \mathbf{N}$, on a $w_{2n} = u_{2n} - v_{2n} = 0$ par définition de v donc $w \in G$.
     On a donc montré que $F + G = \mathbf{R}^{\mathbf{N}}$

   Finalement, on a $\mathbf{R}^{\mathbf{N}} = F \oplus G$.

Familles de vecteurs

Correction de l'Exercice 9.

1. $$\alpha u + \beta v + \gamma w = 0_{\mathbf{R}^3} \iff \begin{cases} \alpha + 4\beta + \gamma = 0 \\ \alpha - 2\beta - 2\gamma = 0 \\ 6\beta + 3\gamma = 0 \end{cases}$$
   $$\iff \begin{cases} \gamma = -2\beta \\ \alpha + 2\beta = 0 \\ \alpha + 2\beta = 0 \end{cases}$$
   $$\iff \begin{cases} \gamma = -2\beta \\ \alpha = -2\beta. \end{cases}$$
   On obtient donc une solution en posant par exemple $\beta = -1$. On a alors $\alpha = 2$ et $\gamma = 2$ et on vérifie qu'on a bien
   $$2u - v + 2w = 0_{\mathbf{R}^3}.$$

2. D'après la question précédente, la famille $\{u; v; w\}$ est donc liée.

Correction de l'Exercice 10.

1. *Pour montrer qu'une famille de <u>deux</u> vecteurs est libre, il suffit de s'assurer que les deux vecteurs qui la composent ne sont pas colinéaires.* Ici,

- v_1 et v_2 ne sont pas colinéaires $\left(\frac{1}{4} \neq \frac{0}{1}, \text{ par exemple}\right)$ donc la famille $\{v_1, v_2\}$ est libre.
- v_1 et v_3 ne sont pas colinéaires $\left(\frac{1}{-2} \neq \frac{0}{-1}, \text{ par exemple}\right)$ donc la famille $\{v_1, v_3\}$ est libre.
- v_2 et v_3 ne sont pas colinéaires $\left(\frac{4}{-2} \neq \frac{1}{-1}, \text{ par exemple}\right)$ donc la famille $\{v_2, v_3\}$ est libre.

2. On remarque facilement que $v_3 + v_2 - 2v_1 = 0_{\mathbf{R}^3}$ donc la famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ est liée.

Correction de l'Exercice 11.

1. Pour $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{R}$, on a

$$\begin{aligned}
\alpha(1,0,1) + \beta(0,2,2) + \gamma(3,7,1) = 0_{\mathbf{R}^3} &\iff \begin{cases} \alpha + 3\gamma = 0 \\ 2\beta + 7\gamma = 0 \\ \alpha + 2\beta + \gamma = 0 \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} \alpha + 3\gamma = 0 \\ 2\beta + 7\gamma = 0 \\ 2\beta - 2\gamma = 0 \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} \alpha + 3\gamma = 0 \\ \beta = -\frac{7}{2}\gamma = 0 \\ \beta = \gamma \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} \beta = 0 \\ \gamma = 0 \\ \alpha = -3\gamma = 0 \end{cases}
\end{aligned}$$

Ainsi, on a montré que $\alpha(1,0,1) + \beta(0,2,2) + \gamma(3,7,1) = 0_{\mathbf{R}^3} \iff \alpha = \beta = \gamma = 0$. La famille $\{(1,0,1), (0,2,2), (3,7,1)\}$ est donc libre.

2. On remarque que $(1,0,0) + (0,1,1) = (1,1,1)$, autrement dit $(1,0,0) + (0,1,1) - (1,1,1) = 0_{\mathbf{R}^3}$ et la famille $\{(1,0,0), (0,1,1), (1,1,1)\}$ est donc liée.

3. On remarque que $(1,2,1,2,1) + (2,1,2,1,2) - 3(1,0,1,1,0) - 3(0,1,0,0,1) = 0_{\mathbf{R}^5}$ et la famille $\{(1,2,1,2,1), (2,1,2,1,2), (1,0,1,1,0), (0,1,0,0,1)\}$ est donc liée.

4. Pour $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{R}$, on a

$$\begin{aligned}
\alpha \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = 0_{M_2(\mathbf{R})} &\iff \begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ -\alpha = 0 \\ \alpha - \gamma = 0 \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} \beta = -\alpha \\ \alpha = 0 \\ \gamma = \alpha \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases}
\end{aligned}$$

Ainsi, on a montré que $\alpha \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = 0_{M_2(\mathbf{R})} \iff \alpha = \beta = \gamma = 0$ et donc la famille $\mathcal{F}$ est libre.

Correction de l'Exercice 12.

1. La famille $\{u_1, u_2\}$ est liée (car $u_2 = -2u_1$) donc pour n'importe quel vecteur v de $\mathbf{R}^3$, la famille $\{u_1, u_2, v\}$ sera liée aussi. C'est impossible.

2. La famille de 2 vecteurs $\{u_1, u_3\}$ est libre $\left(\frac{1}{1} \neq \frac{1}{-1}, \text{ par exemple}\right)$ dans un espace de dimension 3 donc, d'après le théorème de la base incomplète, on peut la compléter en une base (donc une famille libre) de $\mathbf{R}^3$. Par exemple, prendre le vecteur $v = (0,0,1)$. *En général, pour compléter une famille libre en une base de $\mathbf{R}^n$, on ne s'embête pas et on choisit des vecteurs de la base canonique.*

Correction de l'Exercice 13.

1. <u>Libre</u>. En effet,

$$\alpha(1,1,2,1,3,1) + \beta(2,4,3,-1,4,-1) + \gamma(0,-1,0,3,6,2) = (0,0,0,0,0,0)$$

$$\iff \begin{cases} \alpha + 2\beta + 0\gamma = 0 \\ \alpha + 4\beta - \gamma = 0 \\ 2\alpha + 3\beta + 0\gamma = 0 \\ \alpha - \beta + 3\gamma = 0 \\ 3\alpha + 4\beta + 6\gamma = 0 \\ \alpha - \beta + 2\gamma = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha = -2\beta \\ \gamma = 2\beta \\ -\beta = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases}$$

2. <u>Liée</u>. En effet, $2 \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = 0.$

3. <u>Libre</u>. Posons $f_k \colon x \mapsto e^{kx}$. La relation $\alpha f_{-1} + \beta f_1 + \gamma f_2 = 0$ évaluée en $x = 0$, $x = 1$ et $x = -1$ donne le système :

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \alpha e^{-1} + \beta e - \gamma e^2 = 0 \\ \alpha e^1 + \beta e^{-1} + \gamma e^{-2} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases}$$

grâce à l'application du pivot de Gauss.

Correction de l'Exercice 14.

a) Soient $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{R}$ tels que $\alpha e_1 + 2\beta e_2 + \gamma e_3 = 0_E$. La famille $\{e_1, e_2, e_3\}$ est libre comme sous-famille d'une famille libre et donc $\alpha = 2\beta = \gamma = 0$. Autrement dit, on a $\alpha = \beta = \gamma = 0$ et donc la famille $\mathcal{F}_1$ est libre.

b) La famille $\mathcal{F}_2$ est libre comme sous-famille d'une famille libre.

c) En utilisant la liberté de $\{e_1, e_2, e_3\}$, on a

$$\begin{aligned} \alpha(3e_1 + e_3) + \beta e_3 + \gamma(e_2 + e_3) = 0_E &\iff 3\alpha e_1 + \gamma e_2 + (\alpha + \beta + \gamma)e_3 = 0_E \\ &\iff \begin{cases} 3\alpha = 0 \\ \gamma = 0 \\ \alpha + \beta + \gamma = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, la famille $\mathcal{F}_3$ est libre.

d) En utilisant la liberté de $\{e_1, e_2, e_4\}$, on a

$$\begin{aligned} &\alpha(2e_1 + e_2) + \beta(e_1 - 3e_2) + \gamma e_4 + \delta(e_2 - e_1) = 0_E \\ &\iff (2\alpha + \beta - \delta)e_1 + (\alpha - 3\beta + \delta)e_2 + \gamma e_4 = 0_E \\ &\iff \begin{cases} 2\alpha + \beta - \delta = 0 \\ \alpha - 3\beta + \delta = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \alpha - 3\beta + \delta = 0 \\ 7\beta - 3\delta = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \alpha - 3\beta + \delta = 0 \\ \beta = \frac{3}{7}\delta \\ \gamma = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \alpha = \frac{2}{7}\delta \\ \beta = \frac{3}{7}\delta \\ \gamma = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, une solution non nulle du système est donnée par $\alpha = 2, \beta = 3, \gamma = 0, \delta = 7$ et la famille $\mathcal{F}_4$ est donc liée.

Correction de l'Exercice 15.

1. <u>Liée</u>. En effet, $1 \cdot (e_1 - e_2) + 1 \cdot (e_2 - e_3) + 1 \cdot (e_3 - e_4) - 1 \cdot (e_1 - e_4) = 0$.

2. <u>Liée</u>. On remarque que $1 \cdot (e_1 + e_2) - 1 \cdot (e_2 + e_3) + 1 \cdot (e_3 + e_4) - 1 \cdot (e_1 + e_4) = 0$.

3. <u>Libre</u>. Pour le voir, il suffit de trouver les solutions du système suivant :

$$\begin{aligned} &\alpha \cdot e_1 + \beta \cdot (e_1 + e_2) + \gamma \cdot (e_1 + e_2 + e_3) + \mu \cdot (e_1 + e_2 + e_3 + e_4) = 0 \\ &\iff (\alpha + \beta + \gamma + \mu) \cdot e_1 + (\beta + \gamma + \mu) \cdot e_2 + (\gamma + \mu) \cdot e_3 + \mu e_4 = 0 \end{aligned}$$

Or, la famille $\mathcal{F}_3$ est libre. Cela équivaut donc au système échelonné :

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma + \mu = 0 \\ \beta + \gamma + \mu = 0 \\ \gamma + \mu = 0 \\ \mu = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ \gamma = 0 \\ \mu = 0 \end{cases}$$

Correction de l'Exercice 16.

On note $\mathcal{F} = \{e_1, ..., e_n\}$

1. Supposons que $e_1 = 0_E$. On pose $\lambda_1 = 1$ et $\lambda_i = 0$ pour $i \geq 2$. On a alors
$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i e_i = 1 \times e_1 = 0_E$$
avec $(\lambda_1, ..., \lambda_n) \neq (0, ..., 0)$ donc la famille $\mathcal{F}$ est liée.

2. Supposons que $e_1 = e_2$. On pose $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$ et $\lambda_i = 0$ pour $i \geq 3$ On a alors
$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i e_i = e_1 - e_2 = 0_E = 0_E$$
avec $(\lambda_1, ..., \lambda_n) \neq (0, ..., 0)$ donc la famille $\mathcal{F}$ est liée.

Correction de l'Exercice 17.

1. C'est <u>vrai</u>. On a $\mathcal{F} \cap \mathcal{F}' \subset \mathcal{F}$, avec $\mathcal{F}$ une famille libre. Ainsi, pour tout $p \in \mathbf{N} \backslash \{0\}$, et pour tous vecteurs $u_1, ..., u_p \in \mathcal{F} \cap \mathcal{F}' \subset \mathcal{F}$,
$$\sum_{i=1}^{p} \lambda_i u_i = 0 \Longleftrightarrow \lambda_i = 0, \quad \forall i \in \{1, ..., p\}.$$

2. C'est <u>faux</u>. Dans l'espace vectoriel $E = \mathbf{R}^2$, prenons $\mathcal{F} = \{(1,0),(1,1)\}$ et $\mathcal{F}' = \{(0,1),(1,1)\}$. On montre facilement que $\mathcal{F}$ et $\mathcal{F}'$ engendrent E. Pourtant, $\mathcal{F} \cap \mathcal{F}' = \{(1,1)\}$ n'est pas génératrice de E.

3. C'est <u>faux</u>. Reprendre exactement le même exemple que précédemment pour s'en convaincre : dans ce cas, $\mathcal{F} \cup \mathcal{F}' = \{(1,0),(0,1),(1,1)\}$ n'est pas libre car $(1,1) = (1,0) + (0,1)$.

4. C'est <u>vrai</u>. Pour tout vecteur $u \in E$, puisque la famille $\mathcal{F}$ est génératrice de E, il existe des réels $\lambda_1, ..., \lambda_p$ et des vecteurs $u_1, ..., u_p \in \mathcal{F} \subset \mathcal{F} \cup \mathcal{F}'$ tels que $u = \lambda_1 u_1 + ... + \lambda_p u_p$. Ainsi, tout vecteur de E peut s'exprimer comme combinaison linéaire de vecteurs de $\mathcal{F} \cup \mathcal{F}'$. Donc cette dernière est génératrice.

Correction de l'Exercice 18.

1. On note $v_1 = (1,1,0,0)$ et $v_2 = (-1,1,-4,2)$. On veut montrer que $\mathrm{Vect}(u_1,u_2,u_3) = \mathrm{Vect}(v_1,v_2)$, pour ce faire, on raisonne par double inclusion.

   *Pour montrer que $\mathrm{Vect}(v_1,v_2) \subset F$ où F est un sous-espace vectoriel de $E(= \boldsymbol{R}^4$ ici), il suffit de vérifier que $v_1, v_2 \in F$. En effet, par définition $\mathrm{Vect}(v_1,v_2)$ est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant les vecteurs v_1 et v_2 donc si ces vecteurs sont contenus dans le **sous-espace vectoriel** F alors nécessairement $\mathrm{Vect}(v_1,v_2) \subset F$.*

   Ici, on commence donc par montrer que les vecteurs v_1 et v_2 sont dans $\mathrm{Vect}(u_1,u_2,u_3)$, c'est à dire qu'ils s'écrivent comme combinaison linéaire des vecteurs u_1, u_2 et u_3

   On remarque que $v_1 = u_1 + u_2$ et $v_2 = u_1 - u_2$ ainsi, on a $v_1, v_2 \in \mathrm{Vect}(u_1,u_2,u_3)$ et donc d'après la remarque ci-dessus, on a $\mathrm{Vect}(v_1,v_2) \subset \mathrm{Vect}(u_1,u_2,u_3)$.

   Montrons maintenant la deuxième inclusion, à savoir $\mathrm{Vect}(u_1,u_2,u_3) \subset \mathrm{Vect}(v_1,v_2)$.

   En utilisant les expressions de v_1 et v_2 comme combinaisons linéaires de u_1 et u_2, on obtient $u_1 = \frac{1}{2}v_1 + \frac{1}{2}v_2$ et $u_2 = \frac{1}{2}v_1 - \frac{1}{2}v_2$. On cherche $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$ tels que
$$\begin{aligned}
\alpha v_1 + \beta v_2 = u_3 &\Longleftrightarrow \begin{cases} \alpha - \beta = 3 \\ \alpha + \beta = 2 \\ -4\beta = 2 \\ 2\beta = -1 \end{cases} \\
&\Longleftrightarrow \begin{cases} \alpha = \beta + 3 \\ \alpha = 2 - \beta \\ \beta = -\frac{1}{2} \\ \beta = -\frac{1}{2} \end{cases} \\
&\Longleftrightarrow \begin{cases} \beta = -\frac{1}{2} \alpha = \frac{5}{2} \end{cases}
\end{aligned}$$
   ainsi $u_3 = -\frac{1}{2}v_2 + \frac{5}{2}v_1$. On a donc montré que $u_1, u_2, u_3 \in \mathrm{Vect}(v_1,v_2)$ et donc $\mathrm{Vect}(u_1,u_2,u_3) \subset \mathrm{Vect}(v_1,v_2)$.

   Finalement, on a $\mathrm{Vect}(u_1,u_2,u_3) = \mathrm{Vect}(v_1,v_2)$ et l'affirmation est donc $\boxed{\textbf{VRAIE}}$.

   Ici, on aurait pu utiliser un argument de dimension. En effet, il est clair que $\dim(\mathrm{Vect}(v_1,v_2)) = 2$ et on montre facilement que $\dim(\mathrm{Vect}(u_1,u_2,u_3)) = 2$ (en remarquant que $u_3 = 2u_1 + u_3$ par exemple). Ainsi, après avoir montré la première inclusion, on aurait pu conclure directement à l'égalité des deux sous espaces vectoriels par égalité des dimensions.

2. On a montré à la question précédente que $v_1 = (1,1,0,0) = u_1 + u_2$ et donc $v_1 \in \mathrm{Vect}(u_1,u_2)$. Il reste alors à montrer que $v_1 \in \mathrm{Vect}(u_2,u_3,u_4)$ pour prouver que l'affirmation est vraie. On cherche donc $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{R}$ tels que

$$\alpha u_2 + \beta u_3 + \gamma u_4 = v_1 \iff \begin{cases} \alpha + 3\beta = 1 \\ 2\beta = 1 \\ 2\alpha + 2\beta + \gamma = 0 \\ -\alpha - \beta = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} \beta = \frac{1}{2} \\ \alpha = 1 - 3\beta \\ \gamma = -2\alpha - 2\beta \\ \alpha = -\beta \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} \beta = \frac{1}{2} \\ \alpha = -\frac{1}{2} \\ \gamma = 0 \\ \alpha = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Ainsi, on a $v_1 = -\frac{1}{2}u_2 + \frac{1}{2}u_3 + 0u_3$ et en particulier, $v_1 \in \mathrm{Vect}(u_2, u_3, u_4)$.

On a donc montré que $v_1 = (1, 1, 0, 0) \in \mathrm{Vect}(u_1, u_2) \cap \mathrm{Vect}(u_2, u_3, u_4)$ et l'affirmation est donc $\boxed{\textbf{VRAIE}}$.

3. Cette affirmation est $\boxed{\textbf{FAUSSE}}$.
Pour le montrer, on va vérifier que $(0, 0, 0, 1) \notin \mathrm{Vect}(u_{1,2}) + \mathrm{Vect}(u_2, u_3, u_4) = \mathrm{Vect}(u_1, u_2, u_3, u_4)$. On a

$$\alpha u_1 + \beta u_2 + \gamma u_3 + \delta u_4 = (0, 0, 0, 1) \iff \begin{cases} \beta + 3\gamma = 0 \\ \alpha + 2\gamma = 0 \\ -2\alpha + 2\beta + 2\gamma + \delta = 0 \\ \alpha - \beta - \gamma = 1 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} \beta = -3\gamma \\ \alpha = -2\gamma \\ -2\alpha + 2\beta + 2\gamma + \delta = 0 \\ \alpha - \beta - \gamma = 1 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} \beta = -3\gamma \\ \alpha = -2\gamma \\ -2\alpha + 2\beta + 2\gamma + \delta = 0 \\ 0 = 1 \end{cases}$$

Ce système n'ayant pas de solution, on a donc montré que $(0, 0, 0, 1) \notin \mathrm{Vect}(u_1, u_2, u_3, u_4)$ et en particulier $\mathrm{Vect}(u_1, u_2, u_3, u_4) \neq \mathbf{R}^4$.

Correction de l'Exercice 19.

On rappelle que $\mathrm{Vect}(u_1, ..., u_p)$ est très exactement l'espace vectoriel composé de l'ensemble des combinaisons linéaires de $u_1, ..., u_p$. Ainsi, un vecteur v est dans $\mathrm{Vect}(u_1, ..., u_p)$ ssi il existe des réels $\lambda_1, ..., \lambda_p$ tels que $v = \lambda_1 u_1 + ... + \lambda_p u_p$.

Pour simplifier les écritures, notons $u_1 = (2, 3, -1)$, $u_2 = (1, -1, -2)$ et $v_1 = (3, 7, 0)$, $v_2 = (5, 0, -7)$. On a ainsi $F = \mathrm{Vect}(u_1, u_2)$ et $G = \mathrm{Vect}(v_1, v_2)$. On remarque facilement que

$$2u_1 - u_2 = v_1 \tag{1}$$
$$u_1 + 3u_2 = v_2 \tag{2}$$

Ainsi, $v_1, v_2 \in F$ en tant que combinaisons linéaires de u_1 et de u_2. Mais comme F est un espace vectoriel, donc stable par combinaison linéaire, alors toute combinaison linéaire de v_1 et de v_2, c'est-à-dire tout vecteur de G, est dans F. On conclut que $G \subset F$.

Réciproquement, en faisant (**??**)+3(**??**) pour isoler u_1 et (**??**)-2(**??**) pour isoler u_2, on trouve que

$$u_1 = \frac{3}{7}v_1 + \frac{1}{7}v_2$$
$$u_2 = \frac{2}{7}v_1 - \frac{1}{7}v_2$$

Donc, en utilisant le même raisonnement que précédemment, $F \subset G$. Par double inclusion, on a finalement $F = G$.

Correction de l'Exercice 20.

Pour trouver une base d'un espace vectoriel E, on commence le plus souvent par trouver une famille génératrice de E. Par exemple, si $E = \mathrm{Vect}(u_1, ..., u_p)$, alors on sait que la famille $(u_1, ..., u_p)$ est génératrice de E ; sinon, on essaie d'écrire un vecteur quelconque de E comme combinaison linéaire d'autres vecteurs et on conclut que les vecteurs intervenant dans cette combinaison forment une famille génératrice de l'espace.

Une fois la famille génératrice obtenue, on vérifie si elle est libre. Si c'est le cas, alors c'est une base. Sinon, c'est qu'un des vecteurs qui la compose est combinaison linéaire des autres : on le retire, ce qui ne change en rien le caractère générateur de la famille, et on vérifie que la nouvelle famille obtenue est libre. On recommence ce procédé jusqu'à obtenir une famille libre et génératrice, donc une base, de E.

Dans la pratique, on utilisera souvent un argument de dimension (cf. partie suivante du TD) : en effet, si E est de dimension n, alors une famille libre de E avec n éléments ou une famille génératrice de E avec n éléments est une base.

a) Soit $u = (x, y, z) \in \mathbf{R}^3$. On a

$$\begin{aligned}(x,y,z) \in F_1 &\iff x = y \\ &\iff u = (x,x,z) \\ &\iff u = x(1,1,0) + z(0,0,1) \\ &\iff u \in \mathrm{Vect}(u_1, u_2)\end{aligned}$$

où $u_1 = (1,1,0)$ et $u_2 = (0,0,1)$. Ainsi, la famille $\{u_1, u_2\}$ est une famille génératrice de F_1. De plus, il est clair que u_1 et u_2 ne sont pas colinéaires donc c'est une famille libre.

Ainsi, (u_1, u_2) est une base de F_1.

b) On remarque que $(-3,-1) = -\frac{3}{2}(2,1) + \frac{1}{2}(0,1)$ et donc $F_2 = \mathrm{Vect}((2,1),(0,1),(-3,-1)) = \mathrm{Vect}((2,1),(0,1))$. Par définition, la famille $\{(2,1),(0,1)\}$ est donc une famille génératrice de F_2. De plus, il est clair que $(2,1)$ et $(0,1)$ ne sont pas colinéaires donc c'est une famille libre.

Ainsi $((2,1),(0,1))$ est une base de F_2.

c) Soit $P \in \mathbf{R}[X]$, on a $\deg(P) \leq 2$ et donc $P = aX^2 + bX + c$ avec $a, b, c \in \mathbf{R}$. De plus, on a $P(0) = 0$ et donc $c = 0$. Ainsi $P = aX^2 + bX$ et on a montré que $\{X, X^2\}$ engendre F_3. Or cette famille est une sous-famille de la famille libre $\{1, X, X^2\}$ donc c'est une famille libre et finalement (X, X^2) est une base de F_3.

d) Soit $M \in M_2(\mathbf{R})$, on a

$$\begin{aligned}M \in F_4 &\iff \exists a, b \in \mathbf{R},\ M = \begin{pmatrix} a & a+b \\ 0 & 2a \end{pmatrix} \\ &\iff \exists a, b \in \mathbf{R},\ M = a\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\iff \exists a, b \in \mathbf{R},\ M = aM_1 + bM_2\end{aligned}$$

où $M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Ainsi, la famille $\{M_1, M_2\}$ est une familel génératrice de F_4. Il est de plus clair que c'est une famille libre donc $\left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right)$ est une base de F_4.

Correction de l'Exercice 21.

1. On considère les vecteurs $u_1 = (1,1)$ et $u_2 = (1,-1)$ de $\mathbb{R}^2$.

   a) On veut montrer que $\mathcal{B} = (u_1, u_2)$ est une base de $\mathbf{R}^2$. On doit montrer que c'est une famille libre et génératrice dans $\mathbf{R}^2$.

   - Soient $\lambda, \mu \in \mathbf{R}$ tels que $\lambda u_1 + \mu u_2 = 0$, on a alors

   $$\begin{cases} \lambda + \mu = 0 \\ \lambda - \mu = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2 \times \lambda = 0 \\ \lambda = \mu \end{cases} \iff \lambda = \mu = 0$$

   Ainsi, la famille (u_1, u_2) est libre.

   - Soit $(x, y) \in \mathbf{R}^2$, on cherche $\lambda, \mu \in \mathbf{R}$ tels que $\lambda u_1 + \mu u_2 = (x, y)$. On cherche alors des solutions au système $\begin{cases} \lambda + \mu = x \\ \lambda - \mu = y \end{cases}$ d'inconnues (λ, μ).

   L'unique solution de ce système est donnée par $(\frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2})$. On a donc $(x, y) = \frac{x+y}{2}u_1 + \frac{x-y}{2}u_2$ donc (u_1, u_2) est une famille génératrice de $\mathbf{R}^2$.

   Finalement, $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbf{R}^2$.

   b) Il suffit ici d'utiliser la question précédente avec le vecteur $(x, y) = e_1 = (1, 0)$. On obtient alors que $e_1 = \frac{1}{2}u_1 + \frac{1}{2}u_2$ donc les coordonnées de e_1 dans la base $\mathcal{B}$ sont données par $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.
   De même, les coordonnées de e_2 dans la base $\mathcal{B}$ sont données par $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$.

2. On considère les vecteurs $v_1 = (1,0,0)$, $v_2 = (-2,1,0)$ et $v_3 = (1,-3,1)$ de $\mathbf{R}^3$.

   a) On veut montrer que $\mathcal{D} = (v_1, v_2, v_3)$ est une base de $\mathbf{R}^3$. On doit montrer que c'est une famille libre et génératrice dans $\mathbf{R}^3$.

   - Soient $\lambda, \mu, \nu \in \mathbf{R}$ tels que $\lambda v_1 + \mu v_2 + \nu v_3 = 0$, on a alors

   $$\begin{cases} \lambda - 2\mu + \nu = 0 \\ \mu - 3\nu = 0 \\ \nu = 0 \end{cases} \iff \lambda = \mu = \nu = 0$$

   Ainsi, la famille (v_1, v_2, v_3) est libre.

   - Soit $(x, y, z) \in \mathbf{R}^3$, on cherche $\lambda, \mu, \nu \in \mathbb{R}$ tels que $\lambda v_1 + \mu v_2 + \nu v_3 = (x, y, z)$. On cherche alors des solutions au système $\begin{cases} \lambda - 2\mu + \nu = x \\ \mu - 3\nu = y \\ \nu = z \end{cases}$ d'inconnues (λ, μ, ν).

   $$\begin{cases} \lambda - 2\mu + \nu = x \\ \mu - 3\nu = y \\ \nu = z \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda = x + 2\mu - \nu \\ \mu = y + 3\nu \\ \nu = z \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda = x + 2y + 5z \\ \mu = y + 3z \\ \nu = z \end{cases}$$

   Le système admet une solution et on a donc $(x, y, z) = (x + 2y + 5z)v_1 + (y + 3z)v_2 + zv_3$ donc (v_1, v_2, v_3) est une famille génératrice de $\mathbf{R}^3$.

   Finalement, $\mathcal{D}$ est une base de $\mathbf{R}^3$.

b) En utilisant les calculs de la question précédente, on obtient que les coordonnées de w_1 dans la base $\mathcal{D}$ sont données par $(-1,-2,1)$ et celles de w_2 sont données par $(5,3,1)$.

3. On considère les polynômes $P_0 = 1,\ P_1 = X+1,\ P_2 = (X+1)^2$ et $P_3 = (X+1)^3$ dans $\mathbb{R}_3[X]$.

   a) On veut montrer que la famille $\mathcal{E} = (P_0, P_1, P_2, P_3)$ est une base de $\mathbb{R}_3[X]$. La famille $\mathcal{E}$ est échelonnée en degré ($\deg(P_i) = i$) et est donc libre. De plus, on a $\mathrm{Card}(\mathcal{E}) = 4 = 3+1 = \dim \mathbb{R}_3[X]$ donc la famille $\mathcal{E}$ est une base de $\mathbb{R}_3[X]$.

   b)
   - On cherche des réels a, b, c, d tels que $P = X^2 = aP_0 + bP_1 + cP_2 + dP_3$. En développant les expressions de P_2 et P_3, on obtient
   $$X^2 = dX^3 + (3d+c)X^2 + (3d+2c+b)X + (a+b+c+d)$$
   ce qui amène à résoudre le système suivant
   $$\begin{cases} d = 0 \\ 3d + c = 1 \\ 3d + 2c + b = 0 \\ a + b + c + d = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} d = 0 \\ c = 1 \\ b = -2c = -2 \\ a = -b - c - d = c = 1 \end{cases}$$
   Finalement, $P = X^2 = P_0 - 2P_1 + P_2$ donc les coordonnées de P dans la base $\mathcal{E}$ sont données par $(1,-2,1,0)$.
   - On cherche des réels a, b, c, d tels que $Q = 1 + X + X^2 + X^3 = aP_0 + bP_1 + cP_2 + dP_3$. En développant les expressions de P_2 et P_3, on obtient
   $$X^3 + X^2 + X + 1 = dX^3 + (3d+c)X^2 + (3d+2c+b)X + (a+b+c+d)$$
   ce qui amène à résoudre le système suivant
   $$\begin{cases} d = 1 \\ 3d + c = 1 \\ 3d + 2c + b = 1 \\ a + b + c + d = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} d = 1 \\ c = 1 - 3d = -2 \\ b = 1 - 2c - 3d = 2 \\ a = 1 - b - c - d = 0 \end{cases}$$
   Finalement, $Q = 1 + X + X^2 + X^3 = 2P_1 - 2P_2 + P_3$ donc les coordonnées de P dans la base $\mathcal{E}$ sont données par $(0,2,-2,1)$.