ALGORITMOS EM GRAFOS


PLANARIDADE

Prof. Alexei Machado

PUC MINAS


CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Problema das 3 casas




É possível conectar as três casas aos três serviços sem cruzar as tubulações?

Problema das 3 casas




Problema das 3 casas




Grafo planar

□ Um grafo G é **planar** se existe uma representação gráfica de G no plano sem cruzamento de arestas.



Grafo planar


Um grafo G é planar se existe uma representação gráfica de G no plano sem cruzamento de arestas.



7


Grafo planar e grafo plano


 Usaremos o termo grafo plano para uma representação planar de um grafo planar.



Grafo planar e grafo plano


 Usaremos o termo grafo plano para uma representação planar de um grafo planar.








Grafos planares e Kuratowski

 Existem dois grafos não planares que são muito importantes para o estudo de planaridade. Eles são chamados de grafos de Kuratowski











1

Grafos de Kuratowski

□ K₅: grafo não planar com o menor número de vértices




□ K_{3,3}: grafo não planar com o menor número de arestas



- \square Propriedades em comum de K_5 e $K_{3,3}$
 - Ambos são regulares
 - 2. Ambos são não planares
 - 3. A remoção de uma aresta ou um vértice torna ambos os grafos planares

 \square A remoção de um vértice ou aresta torna K_5 planar?




□ A remoção de um vértice ou aresta torna K₅ planar?

A remoção de um vértice ou aresta torna K₅ planar?

A remoção de um vértice ou aresta torna K₅ planar?


□ A remoção de uma aresta ou vértice torna K_{3,3} planar?




Planaridade

Região (ou face): uma representação gráfica planar de um grafo divide o plano em regiões ou faces.
 Cada região é caracterizada pelas arestas que a contornam.


- Cada aresta de G pertence à fronteira de uma ou duas faces de G.
- O grau (comprimento), de uma face f de G, representado por d(F) é igual ao número de arestas da fronteira de F.




Cada face da representação planar de um grafo corresponde a um passeio fechado do grafo constituído pelos vértices e arestas que delimitam a face.
 Chamamos grau da face, d(f), ao comprimento do passeio correspondente.




□ Quantas faces temos neste grafo?



□ Quantas faces temos neste grafo?



Quantas faces temos neste grafo? SEIS



Face infinita:
porção infinita do
plano que não é
contornada por
arestas

Fórmula de Euler

□ TEOREMA: Seja G um grafo conexo planar com n
 vértices e e arestas. O número de faces do grafo é

$$f = e - n + 2$$

Fórmula de Euler

TEOREMA: Seja G um grafo conexo planar com n
 vértices e e arestas. O número de faces do grafo é

$$f = e - n + 2$$

"Apesar das inúmeras maneiras de se desenhar um grafo no plano, o número de faces irá permanecer o mesmo."

Fórmula de Euler

 \square COROLÁRIO: $e \le 3n - 6$

 Condição necessária mas não suficiente para um grafo ser planar

 Um grafo desconexo é planar se e somente se cada um de seus componentes for planar

- Um grafo desconexo é planar se e somente se cada um de seus componentes for planar
- □ Se G é planar, então, a inclusão ou remoção de:
 - arestas paralelas
 - loops
 - vértices de grau 2 (arestas em série)
- não afetam a planaridade de G


□ Técnica de *redução* auxilia nesta detecção

□ Redução elementar

```
enquanto G tem loops, arestas paralelas ou em série faça
remover loops
remover as arestas paralelas
contrair as arestas em série
fim enquanto
```


enquanto G tem loops, arestas paralelas ou em série faça remover loops remover as arestas paralelas

contrair as arestas em série fim enquanto



enquanto G tem loops, arestas paralelas ou em série faça remover loops

remover as arestas paralelas contrair as arestas em série fim enquanto




enquanto G tem loops, arestas paralelas ou em série faça

remover loops

remover as arestas paralelas contrair as arestas em série fim enquanto

□AE e EB



enquanto G tem loops, arestas paralelas ou em série faça


remover loops

remover as arestas paralelas

contrair as arestas em série

fim enquanto

□AE e EB



enquanto G tem loops, arestas paralelas ou em série faça

remover loops


remover as arestas paralelas

contrair as arestas em série

fim enquanto

□AE e EB

□BD e DC



enquanto G tem loops, arestas paralelas ou em série faça

remover loops


remover as arestas paralelas

contrair as arestas em série


fim enquanto

□AE e EB


□BD e DC




enquanto G tem loops, arestas paralelas ou em série faça remover loops remover as arestas paralelas contrair as arestas em série fim enquanto



enquanto G tem loops, arestas paralelas ou em série faça remover loops remover as arestas paralelas contrair as arestas em série fim enquanto



enquanto G tem loops, arestas paralelas ou em série faça remover loops remover as arestas paralelas contrair as arestas em série fim enquanto



enquanto G tem loops, arestas paralelas ou em série faça


remover loops

remover as arestas paralelas

contrair as arestas em série

fim enquanto

□CA e AB



enquanto G tem loops, arestas paralelas ou em série faça


remover loops

remover as arestas paralelas

contrair as arestas em série

fim enquanto

□CA e AB



- De maneira geral, após aplicar o procedimento a cada um dos componentes Gi, qual será o grafo reduzido Hi?
 - 1. Uma única aresta, ou
 - 2. Um grafo completo com 4 vértices, ou
 - 3. Um grafo simples com $n \ge 5$ e e ≥ 7

- 1. Uma única aresta, ou
- 2. Um grafo completo com 4 vértices, ou
- 3. Um grafo simples com $n \ge 5$ e e ≥ 7

1. Uma única aresta, ou

PLANAR!!

- 2. Um grafo completo com 4 vértices, ou
- 3. Um grafo simples com $n \ge 5$ e e ≥ 7

- 1. Uma única aresta, ou
- 2. Um grafo completo com 4 vértices, ou
- Um grafo simples com $n \ge 5$ e e ≥ 7

INVESTIGAR!!

Um grafo simples com $n \ge 5$ e e ≥ 7


INVESTIGAR!!

- \square Podemos verificar se e $\leq 3n-6$.
 - Se o grafo reduzido não satisfaz a inequação, então o grafo é não planar. Se a inequação for satisfeita, é necessário fazer testes adicionais.


Homeomorfismo


- Dois grafos G₁ e G₂ são homeomorfos se os grafos
 H₁ e H₂ obtidos a partir das reduções elementares de
 G₁ e G₂ forem isomorfos
- □ G₁ e G₂ são homeomorfos se pudermos obter G₂ a partir da inserção de vértices intermediários nas arestas de G₁


Homeomorfismo





Homeomorfismo





















- Dado um grafo G planar, o grafo G*, chamado dual de G, é construído da seguinte forma:
 - □ para cada face f de G, G* tem um vértice


- una os vértices de G* da seguinte forma
 - se 2 regiões f_i e f_k são adjacentes (possuem alguma aresta em comum) coloque uma aresta entre v_k e v_k interceptando a aresta em comum
 - $lue{}$ se existirem mais de uma aresta em comum entre f_i e f_k coloque uma aresta entre v_i e v_k para cada aresta em comum
 - se uma aresta está inteiramente em uma região, f_i, coloque um loop no vértice v_i.












□ Qual é o dual deste grafo G?



- □ Qual é o dual deste grafo G?
 - Arestas contidas em uma região tornam-se loops no dual

