

Mateo Andrés Manosalva Amaris

Sergio Alejandro Bello Torres

1. Demostrar que toda variedad es regular y, por lo tanto, metrizable. ¿Dónde se utiliza la condición de Hausdorff?
2. Sea X un espacio compacto de Hausdorff. Suponga que para cada $x \in X$, existe un vecindario U de x y un entero positivo k tal que U puede ser embebido en \mathbb{R}^k . Mostrar que X puede ser embebido en \mathbb{R}^N para algún entero positivo N .
3. Sea X un espacio de Hausdorff tal que cada punto de X tiene un vecindario homeomorfo con un subconjunto abierto de \mathbb{R}^m . Mostrar que si X es compacto, entonces X es una m -variedad.
4. Una familia indexada $\{A_\alpha\}$ de subconjuntos de X se dice *familia indexada puntualmente finita* si cada $x \in X$ pertenece a A_α solo para un número finito de valores de α . **Lema.** Sea X un espacio normal; sea $\{U_1, U_2, \dots\}$ una cobertura indexada puntualmente finita de X . Entonces, existe una cobertura indexada $\{V_1, V_2, \dots\}$ de X tal que $\bar{V}_n \subset U_n$ para cada n .
5. La condición de Hausdorff es una parte esencial en la definición de una variedad; no se sigue de las otras partes de la definición. Considere el siguiente espacio: Sea X la unión del conjunto $\mathbb{R} - \{0\}$ y el conjunto de dos puntos $\{p, q\}$. Se topologiza X tomando como base la colección de todos los intervalos abiertos en \mathbb{R} que no contienen 0, junto con todos los conjuntos de la forma $(-a, 0) \cup \{p\} \cup (0, a)$ y todos los conjuntos de la forma $(-a, 0) \cup \{q\} \cup (0, a)$, para $a > 0$. El espacio X se llama *la recta con dos orígenes*.
 - a) Verificar que esto es una base para una topología.
 - b) Mostrar que cada uno de los espacios $X - \{p\}$ y $X - \{q\}$ es homeomorfo a \mathbb{R} .
 - c) Mostrar que X satisface el axioma T_1 , pero no es de Hausdorff.
 - d) Mostrar que X satisface todas las condiciones para ser una 1-variedad, excepto la condición de Hausdorff.