

Mateo Andrés Manosalva Amaris

Sergio Alejandro Bello Torres

1. a) Un G_δ -conjunto en un espacio X es un conjunto A que es igual a una intersección numerable de conjuntos abiertos de X . Demuestra que en un espacio T_1 de primera numerabilidad, cada conjunto unitario es un G_δ -conjunto.

Demostración. Sea $\{x\}$ un conjunto unitario arbitrario, como X es 1-contable, entonces existe $B_x = \{B_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ una base contable para x , es claro que $x \in \bigcap_{i=1}^{\infty} B_i$, falta ver que dado $y \neq x$, $y \notin \bigcap_{i=1}^{\infty} B_i$, como $y \neq x$, entonces existen V_x y V_y vecindades de x y y respectivamente tal que $y \notin V_x$ y $x \notin V_y$ ya que X es T_1 , esto es nos da que existe B_i tal que $y \notin B_i$, lo que concluye el resultado. \square

- b) Existe un espacio familiar en el cual cada conjunto unitario es un G_δ -conjunto, pero que no satisface el axioma de primera numerabilidad. ¿Cuál es?

Solución. Este espacio es \mathbb{R}^ω con la topología de cajas, este espacio no es 1-contable ya que dado $x = (x_n)_n$ y una colección $\{U_i : i \in \mathbb{N}\}$ de vecindades de x , podemos suponer que $U_i = \prod_n (a_n^{(i)}, b_n^{(i)})$ donde $a_n^{(i)} < x_n < b_n^{(i)}$, tomando $c_n = \frac{a_n^{(n)} + x_n}{2}$ y $d_n = \frac{x_n + b_n^{(n)}}{2}$ se sigue que $V = \prod_n (c_n, d_n)$ es una vecindad de x , pero $U_n \not\subset V$ para cada n .

Note ahora que dado $x = (x_n)_n$, tome $U_i = \prod_n (x_n - \frac{1}{i}, x_n + \frac{1}{i})$ para cada i , en efecto $\bigcap_i U_i = \{x\}$

2. Demuestra que si X tiene una base numerable $\{B_n\}$, entonces toda base \mathcal{C} de X contiene una base numerable para X . [Sugerencia: Para cada par de índices n, m para los cuales sea posible, elige $C_{n,m} \in \mathcal{C}$ tal que $B_n \subset C_{n,m} \subset B_m$.]

Demostración. Sea $x \in X$, ya que \mathcal{B} es base, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $x \in B_m$, como \mathcal{C} también es base, existe C tal que $x \in C \subseteq B_m$, aplicando nuevamente la definición de base, llegamos a que existe n tal que $x \in B_n \subseteq C \subseteq B_m$, denotemos entonces a este C por $C_{n,m}$, así, para $n, m \in \mathbb{N}$ podemos escoger $C_{n,m}$ de tal manera que $B_n \subseteq C_{n,m} \subseteq B_m$.

Veamos que $\mathcal{C}' := \{C_{n,m} \in \mathcal{C} : n, m \in \mathbb{N}, B_n \subseteq C_{n,m} \subseteq B_m\}$ es una base contable para X . La primera propiedad se sigue directamente de como construimos \mathcal{C}' . Ahora sean $x \in X$, C_{n_1, m_1} y C_{n_2, m_2} tales que $x \in C_{n_1, m_1} \cap C_{n_2, m_2}$, como $C_{n_1, m_1} \cap C_{n_2, m_2}$ es abierto en X , existe B_{m_3} tal que $x \in B_{m_3} \subseteq C_{n_1, m_1} \cap C_{n_2, m_2}$, siguiendo el razonamiento anterior encontramos C_{n_3, m_3} tal que $x \in B_{n_3} \subseteq C_{n_3, m_3} \subseteq B_{m_3}$ de ésta manera $x \in C_{n_3, m_3} \subseteq C_{n_1, m_1} \cap C_{n_2, m_2}$, por lo tanto \mathcal{C}' es una base para X . \square

3. Sea X un espacio con una base numerable; sea A un subconjunto no numerable de X . Demuestra que incontablemente muchos puntos de A son puntos de acumulación de A .

Demostración. Primero probaremos que el conjunto de puntos de acumulación A' de A es no vacío: Asuma que A' es vacío, luego dado $x \in X$ existe una vecindad V_x de x tal que $V_x \cap (A - \{x\}) = \emptyset$, de ésta manera la colección $\{V_a\}_{a \in A}$ es una colección no contable de abiertos disyuntos dos a dos, ya que X es 2-contable, tiene un subconjunto denso contable E , luego existe $x_a \in E$ tal que $x_a \in V_a$, pero como los V_a son disyuntos dos a dos, cada x_a debe ser distinto, es decir E es no contable, lo cual contradice que E es contable. Así, $A' \neq \emptyset$. Ahora asuma que A' es contable, ya que X es 2-contable, en particular es 1-contable, luego por cada $y \in A'$ existe una sucesión $\{x_n^{(y)}\} \subseteq A$ que converge a y . De esta manera tenemos que

$$B = \bigcup_{y \in A'} \{x_n^{(y)}\} \subseteq A$$

es contable, pues es unión contable de conjuntos contables, por lo tanto $A - B$ es no contable, lo cual implica que tiene un punto de acumulación. \square

4. Demuestra que todo espacio métrico compacto X tiene una base numerable. [Sugerencia: Sea \mathcal{A}_n un cubrimiento finito de X por bolas de radio $1/n$.]

Demostración. Dado $n \in \mathbb{N}$, considere el cubrimiento \mathcal{A}_n de las bolas de radio $1/n$, como X es compacto entonces \mathcal{A}_n tiene un subcubrimiento finito, digamos \mathcal{B}_n , note que

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{B}_i$$

es una base contable ya que dado $x \in B(x, r)$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $r > \frac{1}{n}$ para todo $r > 0$ por la propiedad arquimediana, luego existe $B_{k_n} \in \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{B}_i$ tal que $x \in B_{k_n} \subset B(x, r)$ \square

5. a) Demuestra que todo espacio métrico con un subconjunto denso contable tiene una base contable.

Demostración. Sea $A \subset X$ tal que $\overline{A} = X$, note que $B = \bigcup_{a \in A} B(a, r)$ tal que $r \in \mathbb{Q}$ es una base contable. \square

- b) Demuestra que todo espacio métrico de Lindelöf tiene una base contable.

Demostración. Considere el cubrimiento $\mathcal{A}_n = \{B(x, \frac{1}{n}) : x \in X\}$, como (X, d) es Lindelöf entonces \mathcal{A}_n tiene un subcubrimiento contable, luego

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{A}_i$$

es un base contable ya que unión contable de contables es contable. \square

6. Demuestra que \mathbb{R}_ℓ e I_0^2 no son metrizablees.

Demostración. Ya que \mathbb{R}_ℓ es separable, pero no 2-contable, no puede ser métrico, pues en un espacio métrico estas dos propiedades son equivalentes.

Ahora, consideremos I_0^2 , por el punto anterior tenemos que en un espacio métrico ser Lindelöf y 2-contable son propiedades equivalentes. De esta manera, si I_0^2 fuera metrizable, como es Lindelöf, sería 2-contable, luego todo subespacio de I_0^2 sería 2-contable y por lo tanto Lindelöf. Sin embargo, el subespacio $[0, 1] \times (0, 1)$ no es Lindelöf, luego I_0^2 no puede ser metrizable. \square

7. ¿Cuáles de nuestros cuatro axiomas de numerabilidad satisface S_Ω ? ¿Qué ocurre con \tilde{S}_Ω ?
8. ¿Cuáles de nuestros cuatro axiomas de numerabilidad satisface \mathbb{R}^ω con la topología uniforme? Ya que \mathbb{R}^ω es métrico, es 1-contable. No es separable pues el conjunto $\{0, 1\}^\omega$ es discreto en \mathbb{R}^ω . Como en espacios métricos ser 2-contable, separable y Lindelöf son equivalentes, éste espacio solo cumple el primer axioma.
9. Sea A un subespacio cerrado de X . Demuestre que si X es Lindelöf, entonces A es Lindelöf. Muestre con un ejemplo que si X tiene un subconjunto denso numerable, A no necesariamente tiene un subconjunto denso numerable.

Demostración. Sea \mathcal{C} un cubrimiento de A , como A es cerrado entonces $\mathcal{C} \cup A^c$ es un cubrimiento de X , como X es Lindelöf entonces tiene un subcubrimiento contable, digamos

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} C_i \cup A^c = X,$$

con $C_i \in \mathcal{C}$, luego $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} C_i$ \square

El ejemplo en cuestión es el plano de Sorgenfrey y esto lo trata más en detalle el libro de Munkres en el ejemplo 4 del capítulo.

10. Demuestra que si X es un producto numerable de espacios con subconjuntos densos numerables, entonces X tiene un subconjunto denso numerable.
11. Sea $f : X \rightarrow Y$ una función continua. Demuestra que si X es Lindelöf, o si X tiene un subconjunto denso numerable, entonces $f(X)$ satisface la misma condición.

Demostración. Sea $\{B_\alpha\}_\alpha$ un cubrimiento de $f(X)$, $A_\alpha = f^{-1}(B_\alpha)$ es abierto en X ya que f es continua y $\{A_\alpha\}_\alpha$ cubre a X , como X es Lindelöf, entonces existe un subcubrimiento contable $\{f^{-1}(B_{\alpha_i})\}_{i \in \mathbb{N}}$, luego $\{(B_{\alpha_i})\}_{i \in \mathbb{N}}$ es un cubrimiento contable de $f(X)$.

Suponga que X tiene un subconjunto denso contable D , como f es continua entonces

$$f(\overline{D}) = f(X) \subset \overline{f(D)},$$

esto nos da que $f(D)$ es denso en $f(X)$ y como D es contable entonces $F(D)$ también. \square

12. Sea $f : X \rightarrow Y$ una aplicación continua y abierta. Demuestra que si X satisface el primer o segundo axioma de numerabilidad, entonces $f(X)$ satisface el mismo axioma.
13. Demuestra que si X tiene un subconjunto denso numerable, entonces toda colección de conjuntos abiertos disjuntos en X es numerable.

14. Demuestra que si X es Lindelöf y Y es compacto, entonces $X \times Y$ es Lindelöf.

15. Considera \mathbb{R}^I con la métrica uniforme, donde $I = [0, 1]$. Sea $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ el subespacio de funciones continuas. Demuestra que $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ tiene un subconjunto denso numerable, y por lo tanto una base numerable.

[Sugerencia: Considera aquellas funciones continuas cuyos gráficos consisten en un número finito de segmentos de línea con extremos racionales.]

16. a) Demuestra que el espacio producto \mathbb{R}^I , donde $I = [0, 1]$, tiene un subconjunto denso numerable.

b) Demuestra que si J tiene cardinalidad mayor que $\mathcal{P}(\mathbb{Z}_+)$, entonces el espacio producto \mathbb{R}^J no tiene un subconjunto denso numerable.

[Sugerencia: Si D es denso en \mathbb{R}^J , define $f: J \rightarrow \mathcal{P}(D)$ por la ecuación $f(\alpha) = D \cap \pi_\alpha^{-1}((a, b))$, donde (a, b) es un intervalo fijo en \mathbb{R} .]

*17. Considera \mathbb{R}^ω con la topología de la caja. Sea \mathbb{Q}^∞ el subespacio que consiste en secuencias de racionales que terminan en una cadena infinita de ceros. ¿Cuáles de nuestros cuatro axiomas de numerabilidad satisface este espacio?

*18. Sea G un grupo topológico de primera numerabilidad. Demuestra que si G tiene un subconjunto denso numerable, o es Lindelöf, entonces G tiene una base numerable.

[Sugerencia: Sea $\{B_n\}$ una base numerable en e . Si D es un subconjunto denso numerable de G , demuestra que los conjuntos dB_n , para $d \in D$, forman una base para G . Si G es Lindelöf, elige para cada n un conjunto numerable C_n tal que los conjuntos cB_n , para $c \in C_n$, cubran G . Demuestra que cuando n recorre \mathbb{Z}_+ , estos conjuntos forman una base para G .]