

Trabajo final de edp, luego vemos un buen título
 xxx

Mateo Andrés Manosalva Amaris.²

mmanosalva@unal.edu.co

Edgar Santiago Ochoa Quiroga

eochoaq@unal.edu.co

16 de septiembre de 2024

Resumen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum
 ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero,
 nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque.
 Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis
 egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna
 fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est,
 iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum.
 Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur
 auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan
 eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1. Preliminares

Definición 1.1. Sea $\{e_j : 1 \leq j \leq n\}$ la base canónica de \mathbb{R}^n , una función $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ se dice periódica de periodo $L \neq 0$, si

$$f(x + Le_j) = f(x), \text{ para todo } x \in \mathbb{R}^n \text{ y } 1 \leq j \leq n$$

Algunas observaciones

- Tenemos que dado $L \in \mathbb{R} - \{0\}$, para todo $m \in \mathbb{Z}$, mL también es un periodo de f en el sentido que $f(x + mL e_j) = f(x)$, para cualquier $x \in \mathbb{R}^n$ y $1 \leq j \leq n$. En particular, $-L$ también es un periodo para la función f . Por esta razón se puede asumir que $L > 0$.
- Si f es constante, entonces f es periódica de cualquier periodo. Si f es periódica no constante, existe un menor periodo $L > 0$, el cual se conoce como periodo fundamental.

Nota. Dado $L > 0$ el conjunto $C_{\text{per}}([-L, L]^n)$ consiste de todas las funciones $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ continuas con periodo $2L$. Similarmente, dado $k \in \mathbb{Z}^+$, $C_{\text{per}}^k([-L, L]^n)$ consiste de todas las funciones $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ periódicas con periodo $2L$ de clase C^k .

De manera equivalente, los espacios anteriores se pueden identificar como sigue

$$C_{\text{per}}([-L, L]^n) := \{f \in C([-L, L]^n) : f(Le_j) = f(-Le_j), 1 \leq j \leq n\}$$

Cuando $k \in \mathbb{Z}^+$, dado un multiíndice $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_n)$

$$C_{\text{per}}^k([-L, L]^n) := \{f \in C^k([-L, L]^n) : \partial^\beta f(\mathbf{Le}_j) = \partial^\beta f(-\mathbf{Le}_j), \text{ para todo } \beta \text{ tal que } |\beta| \leq k \\ \text{y para todo } 1 \leq j \leq n\}$$

Diremos que $f \in C_{\text{per}}^\infty([-L, L]^n)$, si $f \in C_{\text{per}}^k([-L, L]^n)$ para cualquier $k \in \mathbb{Z}^+$. Por consistencia en la notación, definimos $C_{\text{per}}^0([-L, L]^n) = C_{\text{per}}([-L, L]^n)$.

De la definición de los espacios $C_{\text{per}}^k([-L, L]^n)$ notamos que

$$2C_{\text{per}}([-L, L]^n) \supseteq C_{\text{per}}^1([-L, L]^n) \supseteq \cdots \supseteq C_{\text{per}}^k([-L, L]^n).$$

Dado $L > 0$, si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ es una función periódica de periodo $2L$, entonces

$$\tilde{f}(x) := f\left(\frac{L}{\pi}x\right)$$

define una función periódica de periodo 2π . En particular, obtenemos que los espacios $C_{\text{per}}^k([-L, L]^n)$ y $C_{\text{per}}^k([-\pi, \pi]^n)$ son isomorfos como espacios vectoriales. De igual manera, la teoría de la transformada de Fourier se puede reescalar para pasar de la región $[-L, L]^n$ a $[-\pi, \pi]^n$. Por estas razones y sin pérdida de generalidad, en lo que sigue trabajaremos con funciones periódicas de periodo 2π .

Otra notación frecuente para funciones periódicas y transformada de Fourier es considerar funciones sobre el toro \mathbb{T}^n . El toro \mathbb{T}^n es el intervalo $[0, 2\pi]^n$ donde los lados opuestos se identifican. De manera más precisa, el toro es el conjunto de clases de equivalencia en \mathbb{R}^n dada por la relación $x \sim y$ si y solo si $x - y \in 2\pi\mathbb{Z}^n$, es decir $\mathbb{T}^n = \mathbb{R}^n / 2\pi\mathbb{Z}^n$. Adicionalmente el toro es un grupo aditivo por lo que será útil hacerle una traslación a $[-\pi, \pi]^n$

Por las propiedades anteriores, funciones $f : \mathbb{T}^n \rightarrow \mathbb{C}$ se pueden identificar como funciones periódicas $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ con periodo 2π . De esta manera, $C_{\text{per}}^k([-\pi, \pi]^n)$ es isomorfo a $C^k(\mathbb{T}^n)$ por lo que por comodidad trabajaremos sobre este espacio. [1]

Nota. Dado que podemos identificar \mathbb{T}^n como $[-\pi, \pi]^n$, vemos que la integración de funciones sobre el toro resulta de restringir la medida de Lebesgue en $[-\pi, \pi]^n$ y por la periodicidad de las funciones en \mathbb{T}^n tenemos que:

$$\int_{\mathbb{T}^n} f(x) dx = \int_{[-\pi, \pi]^n} f(x) dx = \int_{[-0, 2\pi]^n} f(x) dx = \int_{[a_1, 2\pi+a_1] \times \cdots \times [a_n, 2\pi+a_n]} f(x) dx$$

para cualesquiera $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$

Finalmente por la periodicidad, la integración por partes no nos deja términos de borde:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{T}^n} \partial_j f(x) g(x) dx &= f(x) g(x) \Big|_{\partial \mathbb{T}^n} - \int_{\mathbb{T}^n} \partial_j g(x) f(x) dx \\ &= - \int_{\mathbb{T}^n} \partial_j g(x) f(x) dx \end{aligned}$$

ya que $f(-\pi e_j) g(-\pi e_j) = f(\pi e_j) g(\pi e_j)$ para todo $1 \leq j \leq n$

Esto está bien? Parece que si :3

Referencias

- [1] Riaño Oscar. *Notas de clase : Series de Fourier*. UNAL, 2024.
- [2] L Grafakos. *Classical Fourier Analysis*. Springer, 2008.