

Przygotowanie do egzaminu z geometrii 3D

31 stycznia 2025

Spis treści

| | | |
|----------|---------------------------|-----------|
| 1 | Formulas | 1 |
| 2 | Operacje wektorowe | 3 |
| 3 | Macierze | 6 |
| 4 | Frustum | 13 |

1 Formulas

Długość wektora \mathbf{V} jest określona jako:

$$\|\mathbf{V}\| = \sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2}$$

Opis: Ten wzór pozwala obliczyć długość (moduł) wektora w przestrzeni trójwymiarowej, używając jego współrzędnych V_x , V_y , V_z .

Iloczyn skalarny dwóch wektorów \mathbf{V} i \mathbf{W} jest określony jako:

$$\mathbf{V} \cdot \mathbf{W} = V_x W_x + V_y W_y + V_z W_z$$

Opis: Ten wzór oblicza iloczyn skalarny (dot product) dwóch wektorów w przestrzeni trójwymiarowej, mnożąc odpowiadające sobie współrzędne V_x , W_x , V_y , W_y , V_z , W_z i sumując wyniki.

Iloczyn wektorowy dwóch wektorów \mathbf{V} i \mathbf{W} jest określony jako:

$$\mathbf{V} \times \mathbf{W} = \begin{bmatrix} V_y W_z - V_z W_y \\ V_z W_x - V_x W_z \\ V_x W_y - V_y W_x \end{bmatrix}$$

Opis: Iloczyn wektorowy (cross product) dwóch wektorów w przestrzeni trójwymiarowej tworzy nowy wektor, który jest prostopadły do płaszczyzny utworzonej przez \mathbf{V} i \mathbf{W} . Składniki nowego wektora są obliczane na podstawie powyższego wzoru.

Rzut wektora \mathbf{W} na \mathbf{V} jest określony jako:

$$\text{proj}_{\mathbf{V}} \mathbf{W} = \frac{\mathbf{V} \cdot \mathbf{W}}{\|\mathbf{V}\|^2} \mathbf{V}$$

Opis: Rzut wektora \mathbf{W} na \mathbf{V} to wektor będący projekcją \mathbf{W} na kierunek \mathbf{V} .

Każdy układ liniowo niezależnych wektorów \mathbf{U} , \mathbf{V} i \mathbf{W} można przekształcić w ortonormalny układ \mathbf{u} , \mathbf{v} , \mathbf{w} za pomocą algorytmu ortonormalizacji Grama-Schmidta:

$$\begin{aligned} \mathbf{u} &= \frac{\mathbf{U}}{\|\mathbf{U}\|} \\ \mathbf{v} &= \frac{\mathbf{V} - \text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{V}}{\|\mathbf{V} - \text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{V}\|} \\ \mathbf{w} &= \frac{\mathbf{W} - \text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{W} - \text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{W}}{\|\mathbf{W} - \text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{W} - \text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{W}\|} \end{aligned}$$

Opis: Algorytm ortonormalizacji Grama-Schmidta służy do przekształcenia układu liniowo niezależnych wektorów w układ ortonormalny (wektory wzajemnie prostopadłe o długości 1). Proces polega na: - Normalizacji pierwszego wektora \mathbf{U} , - Usuwanie rzutów kolejnych wektorów na wcześniejsze i normalizacji powstałych wyników.

Wyznacznik macierzy $M - \lambda I$ jest obliczany jako:

$$\det(M - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 0 & 1 \\ 0 & 1 - \lambda & 0 \\ 1 & 0 & 1 - \lambda \end{vmatrix}$$

Opis: Wzór ten przedstawia wyznacznik macierzy $M - \lambda I$, gdzie λ to wartość własna (eigenvalue), a I to macierz jednostkowa. Wyznacznik jest wykorzystywany w obliczaniu wartości własnych macierzy oraz w analizie jej własności algebraicznych.

Wyznacznik macierzy 3×3 można rozwinąć wzdłuż pierwszego wiersza w następujący sposób:

$$\begin{aligned}
 \begin{vmatrix} M_{xx} & M_{xy} & M_{xz} \\ M_{yx} & M_{yy} & M_{yz} \\ M_{zx} & M_{zy} & M_{zz} \end{vmatrix} &= M_{xx}(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} M_{yy} & M_{yz} \\ M_{zy} & M_{zz} \end{vmatrix} \\
 &+ M_{xy}(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} M_{yx} & M_{yz} \\ M_{zx} & M_{zz} \end{vmatrix} + M_{xz}(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} M_{yx} & M_{yy} \\ M_{zx} & M_{zy} \end{vmatrix} \\
 &= M_{xx}M_{yy}M_{zz} - M_{xx}M_{yz}M_{zy} \\
 &\quad - M_{xy}M_{yx}M_{zz} + M_{xy}M_{yz}M_{zx} \\
 &\quad + M_{xz}M_{yx}M_{zy} - M_{xz}M_{yy}M_{zx}
 \end{aligned}$$

Opis: Wyznacznik macierzy 3×3 oblicza się, rozwijając go wzdłuż wiersza lub kolumny. Wzór ten przedstawia rozwinięcie wzdłuż pierwszego wiersza z zastosowaniem wyznaczników macierzy 2×2 dla odpowiednich podmacierzy.

Iloczyn dwóch macierzy M i K można zapisać jako:

$$MK = \begin{pmatrix} M_{xx}K_{xx} + M_{xy}K_{yx} + M_{xz}K_{zx} & M_{xx}K_{xy} + M_{xy}K_{yy} + M_{xz}K_{zy} & M_{xx}K_{xz} + M_{xy}K_{yz} + M_{xz}K_{zz} \\ M_{yx}K_{xx} + M_{yy}K_{yx} + M_{yz}K_{zx} & M_{yx}K_{xy} + M_{yy}K_{yy} + M_{yz}K_{zy} & M_{yx}K_{xz} + M_{yy}K_{yz} + M_{yz}K_{zz} \\ M_{zx}K_{xx} + M_{zy}K_{yx} + M_{zz}K_{zx} & M_{zx}K_{xy} + M_{zy}K_{yy} + M_{zz}K_{zy} & M_{zx}K_{xz} + M_{zy}K_{yz} + M_{zz}K_{zz} \end{pmatrix}$$

Opis: Iloczyn dwóch macierzy M i K oblicza się jako sumę iloczynów odpowiednich wierszy macierzy M i kolumn macierzy K . Wynikiem jest nowa macierz, której elementy są obliczane zgodnie z powyższym wzorem.

2 Operacje wektorowe

1. Oblicz: $\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2$, $\mathbf{V}_1 - \mathbf{V}_2$, $\mathbf{V}_1 \cdot \mathbf{V}_2$, $\mathbf{V}_1 \times \mathbf{V}_2$ dla wektorów:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2 &= \begin{bmatrix} V_{1x} \\ V_{1y} \\ V_{1z} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} V_{2x} \\ V_{2y} \\ V_{2z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{1x} + V_{2x} \\ V_{1y} + V_{2y} \\ V_{1z} + V_{2z} \end{bmatrix} \\
 \mathbf{V}_1 - \mathbf{V}_2 &= \begin{bmatrix} V_{1x} \\ V_{1y} \\ V_{1z} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} V_{2x} \\ V_{2y} \\ V_{2z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{1x} - V_{2x} \\ V_{1y} - V_{2y} \\ V_{1z} - V_{2z} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\mathbf{V}_1 \cdot \mathbf{V}_2 = V_{1x}V_{2x} + V_{1y}V_{2y} + V_{1z}V_{2z}$$

$$\mathbf{V}_1 \times \mathbf{V}_2 = \begin{bmatrix} V_{1y}V_{2z} - V_{1z}V_{2y} \\ V_{1z}V_{2x} - V_{1x}V_{2z} \\ V_{1x}V_{2y} - V_{1y}V_{2x} \end{bmatrix}$$

$$(a) \quad \mathbf{V}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{V}_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$(b) \quad \mathbf{V}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{V}_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(c) \quad \mathbf{V}_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{V}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

2. Wyznacz długość wektora $\|\mathbf{V}\|$:

$$\|\mathbf{V}\| = \sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2}$$

$$(a) \quad \mathbf{V} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(b) \quad \mathbf{V} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$(c) \quad \mathbf{V} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$(d) \quad \mathbf{V} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

3. Wylicz znormalizowany wektor $\hat{\mathbf{V}}$:

$$\hat{\mathbf{V}} = \frac{\mathbf{V}}{\|\mathbf{V}\|}$$

$$\|\mathbf{V}\| = \sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2}$$

(a) $\mathbf{V} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

(b) $\mathbf{V} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

(c) $\mathbf{V} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$

(d) $\mathbf{V} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$

4. Wyznacz projekcję wektora \mathbf{W} na wektor \mathbf{V} dla:

$$\text{proj}_{\mathbf{V}} \mathbf{W} = \frac{\mathbf{V} \cdot \mathbf{W}}{\|\mathbf{V}\|^2} \mathbf{V}$$

(a) $\mathbf{W} = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{V} = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

(b) $\mathbf{W} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{V} = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}$

(c) $\mathbf{W} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{V} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$

5. Sprowadź wektory $\mathbf{U}, \mathbf{V}, \mathbf{W}$ do postaci ortogonalnej, wykorzystując metodę Grama-Schmidta dla danych:

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{U}}{\|\mathbf{U}\|}$$

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{V} - \text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{V}}{\|\mathbf{V} - \text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{V}\|}$$

$$\mathbf{w} = \frac{\mathbf{W} - \text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{W} - \text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{W}}{\|\mathbf{W} - \text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{W} - \text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{W}\|}$$

$$(a) \quad \mathbf{U} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{V} = \begin{bmatrix} 8 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{W} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$(b) \quad \mathbf{U} = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{V} = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{W} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$(c) \quad \mathbf{U} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{V} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{W} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$(d) \quad \mathbf{U} = \begin{bmatrix} 4 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{V} = \begin{bmatrix} -4 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{W} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 10 \end{bmatrix}$$

$$(e) \quad \mathbf{U} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{V} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{W} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$(f) \quad \mathbf{U} = \begin{bmatrix} 4 \\ -4 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{V} = \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{W} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

3 Macierze

1. Oblicz wyznaczniki dla poniższych macierzy i jeśli to możliwe wyznacz macierze odwrotne.

$$(a) \quad M = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}$$

$$(b) \ M = \begin{bmatrix} 1 & 8 & 9 \\ 0 & 4 & 3 \\ 5 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$(c) \ M = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 4 \\ 2 & 7 & 3 \\ 8 & 9 & 5 \end{bmatrix}$$

$$(d) \ M = \begin{bmatrix} 1 & 8 & 9 & 2 \\ 0 & 2 & 4 & 3 \\ 5 & 0 & 2 & 5 \\ 5 & 1 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(e) \ M = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 4 & 0 \\ 2 & 7 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 8 & 9 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

2. Wyznacz macierze odwrotne używając metody Gaussa-Jordana.

$$(a) \ M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$(b) \ M = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 4 \\ 2 & 7 & 3 \\ 8 & 9 & 5 \end{bmatrix}$$

3. Dokonaj diagonalizacji macierzy.

$$(a) \ M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$(b) \ M = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 4 \\ 2 & 7 & 3 \\ 8 & 9 & 5 \end{bmatrix}$$

4. Znajdź wartości własne i wektory własne macierzy.

(a) $M = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

(b) $M = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ -6 & -4 \end{bmatrix}$

(c) $M = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$

(d) $M = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

(e) $M = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -6 & 1 & -6 \\ -3 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

(f) $M = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

5. Wykonaj operacje skalowania macierzą M dla macierzy wierzchołków N .

(a)

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad N = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

(b)

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad N = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 \\ -2 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

(c)

$$M = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad N = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 7 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

6. Zbuduj macierz skalowania S dla której wynikiem operacji na punkcie P_1 będzie punkt P_2 .

$$(a) \quad P_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad P_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

7. Siatka geometryczna obiektu zawiera punkty P_1, P_2, P_3, P_4 . Oblicz pozycję punktów P'_1, P'_2, P'_3, P'_4 , które powstaną po zastosowaniu do nich macierzy skalowania S względem punktu P_T .

(a)

$$P_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad P_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad P_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad P_4 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$S = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad P_T = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(b)

$$P_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad P_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 9 \end{bmatrix}, \quad P_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad P_4 = \begin{bmatrix} -4 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$S = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad P_T = \begin{bmatrix} -4 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

(c)

$$P_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad P_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ -5 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad P_3 = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad P_4 = \begin{bmatrix} -4 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad P_T = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

8. Wyznacz wektor \mathbf{V}' będący wektorem powstałym w wyniku obrotu wektora \mathbf{V} o kąt α w osi \mathbf{Z} .

(a)

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} 9 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha = 60^\circ$$

(b)

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha = 45^\circ$$

(c)

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha = 30^\circ$$

(d)

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha = 90^\circ$$

9. Zbuduj macierz obrotu \mathbf{R} pozwalającą wykonać operację obrotu o kąt α wokół osi \mathbf{Z} .

Macierz obrotu wokół osi \mathbf{Z} ma postać:

(a) $\alpha = 30^\circ$

(b) $\alpha = 45^\circ$

(c) $\alpha = 60^\circ$

(d) $\alpha = 90^\circ$

10. Pracując we współrzędnych jednorodnych zbuduj macierz transformacji F pozwalającą wykonać operację skalowania S oraz translacji T jednocześnie. Oblicz pozycję punktów P'_1, P'_2, P'_3 , które powstaną po zastosowaniu do nich macierzy transformacji F .

(a)

$$P_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad P_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad P_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$S = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(b)

$$P_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad P_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad P_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad T = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(c)

$$P_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad P_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad P_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$S = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad T = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(f)

$$P_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad P_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad P_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$S_x = 2, \quad S_y = 1, \quad S_z = 3, \quad T = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

11. Zbuduj macierz transformacji M pozwalającą wykonać kolejno operację obrotu o kąt α wokół osi Z , obrotu o kąt β wokół osi Y jednocześnie. Oblicz pozycje punktów P'_1, P'_2, P'_3 , które powstaną po zastosowaniu macierzy transformacji M do punktów P_1, P_2, P_3 .

(a)

$$P_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad P_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad P_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\alpha = 45^\circ, \quad \beta = 90^\circ$$

12. Pracując we współrzędnych jednorodnych zbuduj macierz transformacji F pozwalającą wykonać kolejno operację skalowania S , obrotu o kąt α wokół osi X , translacji T_1 , obrotu o kąt β wokół osi Y i translacji T_2 jednocześnie. Oblicz pozycję punktów P'_1, P'_2, P'_3 , które powstaną po zastosowaniu macierzy transformacji F do punktów P_1, P_2, P_3 .

(a)

$$P_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad P_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad P_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$S_x = 2, \quad S_y = 1, \quad S_z = 2, \quad T_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad T_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\alpha = 45^\circ, \quad \beta = 90^\circ$$

(b)

$$P_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad P_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad P_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$S_x = 4, \quad S_y = 2, \quad S_z = 2, \quad T_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad T_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\alpha = 45^\circ, \quad \beta = 120^\circ$$

(c)

$$P_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad P_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad P_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -4 \end{bmatrix}$$

$$S_x = 0.5, \quad S_y = 2, \quad S_z = 3, \quad T_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad T_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\alpha = 150^\circ, \quad \beta = 270^\circ$$

4 Frustum

1. Wyznacz płaszczyzny bryły widzenia

Podane są parametry kąt widzenia β , rozdzielczość ekranu oraz zakres rysowania n, f :

$$(a) \quad \beta = 90^\circ, \quad 1280 \times 960, \quad n = 1, \quad f = 100$$

$$(b) \quad \beta = 45^\circ, \quad 1920 \times 1080, \quad n = 1, \quad f = 100$$

$$(c) \quad \beta = 60^\circ, \quad 1024 \times 768, \quad n = 1, \quad f = 100$$

2. Sprawdź, czy punkt P leży wewnątrz bryły widzenia

$$(a) \quad P = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -10 \end{bmatrix}, \quad a = 4 : 3, \quad e = 1, \quad n = 1, \quad f = 100$$

$$(b) \quad P = \begin{bmatrix} 10 \\ 10 \\ -10 \end{bmatrix}, \quad a = 16 : 9, \quad e = 1, \quad n = 1, \quad f = 100$$

$$(c) \quad P = \begin{bmatrix} 15 \\ 15 \\ 10 \end{bmatrix}, \quad a = 16 : 10, \quad e = 2, \quad n = 1, \quad f = 100$$

3. Wyznacz wektor normalny N i określ relacje punktu O

Dane są płaszczyzny A, B, C zdefiniowane macierzą punktów:

(a)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 5 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 6 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 9 & 0 \end{bmatrix}$$

$$O = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

(b)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 15 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 5 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 6 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 9 & 0 \end{bmatrix}$$

$$O = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(c)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$O = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

4. Sprawdź czy punkty P_1 i P_2 leżą wewnątrz bryły widzenia (frustum) zdefiniowanej płaszczyznami:

| | bliska | daleka | lewa | prawa | górna | dolna |
|-----|--------|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| n | 0 | 0 | $\sqrt{2}/2$ | $-\sqrt{2}/2$ | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | $\sqrt{2}/2$ | $-\sqrt{2}/2$ |
| a | -1 | 1 | $-\sqrt{2}/2$ | $-\sqrt{2}/2$ | $\sqrt{2}/2$ | $-\sqrt{2}/2$ |
| | -1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

$$P_1 = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ -10 \end{bmatrix}, \quad P_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \\ -5 \end{bmatrix}$$

5. Sprawdź czy sfery w punktach P_1 i P_2 , i promieniach r_1 i r_2 leżą wewnątrz bryły widzenia (frustum) zdefiniowanej płaszczyznami:

| | bliska | daleka | lewa | prawa | górna | dolna |
|-----|--------|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| N | 0 | 0 | $\sqrt{2}/2$ | $-\sqrt{2}/2$ | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | $\sqrt{2}/2$ | $-\sqrt{2}/2$ |
| a | -1 | 1 | $-\sqrt{2}/2$ | $-\sqrt{2}/2$ | $\sqrt{2}/2$ | $-\sqrt{2}/2$ |
| | -1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

$$P_1 = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ -10 \end{bmatrix}, \quad r_1 = 3$$

$$P_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \\ -5 \end{bmatrix}, \quad r_2 = 2$$

Ray tracing

1. Sprawdź czy półprosta o początku w punkcie S i kierunku V przecina płaszczyznę określoną przez wektor normalny N i punkt na płaszczyźnie P . Jeżeli to możliwe to wyznacz punkt przecięcia.

(a)

$$S = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad V = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad N = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(b)

$$S = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad V = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad N = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(c)

$$S = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad V = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad N = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

2. Sprawdź czy promień o początku w punkcie S i kierunku V trafi trójkąt zdefiniowany macierzą punktów P .

(a)

$$V = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad S = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 0 & 10 & 5 \\ 0 & 5 & 10 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(b)

$$V = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad S = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(c)

$$V = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad S = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 0 & 8 & 6 \\ 0 & 4 & -10 \\ 0 & 5 & -2 \end{bmatrix}$$

(d)

$$V = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad S = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 0 & 8 & 1 \\ 0 & 4 & 10 \\ 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

3. Sprawdź czy promień o początku w punkcie S i kierunku V trafi wielokąt o wierzchołkach zdefiniowanych macierzą punktów P .

(a)

$$V = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad S = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 0 & 8 & 5 & 10 \\ 0 & 5 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

4. Sprawdź czy promień o początku w punkcie S i kierunku V trafi prostopadłościan o środku w punkcie C , długościach boków a, b, c i orientacji zgodnie z wersorami u, v, w .

(a)

$$S = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad V = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad a = 2, \quad b = 2, \quad c = 1$$

$$(u \ v \ w) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

(b)

$$S = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad V = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad a = 2, \quad b = 2, \quad c = 3$$

$$(u \ v \ w) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

(c)

$$S = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad V = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \\ 8 \end{bmatrix}, \quad a = 4, \quad b = 5, \quad c = 4$$

$$(u \ v \ w) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

Oświetlenie

1. Dla punktowego światła znajdującego się w punkcie Q o kolorze RGB . Wyznacz intensywność światła w punkcie P , dla współczynników osłabienia: k_c, k_l, k_q

(a)

$$Q = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad RGB = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.5 \\ 0.2 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad k_c = 1, \quad k_l = 0.2, \quad k_q = 0.04$$

(b)

$$Q = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}, \quad RGB = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad k_c = 1, \quad k_l = 0.2, \quad k_q = 0.05$$

(c)

$$Q = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad RGB = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.5 \\ 0.2 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad k_c = 1, \quad k_l = 0.2, \quad k_q = 0.05$$

(d)

$$Q = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad RGB = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.5 \\ 0.25 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad k_c = 1, \quad k_l = 0.2, \quad k_q = 0.05$$

(e)

$$Q = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad RGB = \begin{bmatrix} 0.25 \\ 0.5 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad k_c = 1, \quad k_l = 0.2, \quad k_q = 0.02$$

2. Dla światła reflektora znajdującego się w punkcie Q o kierunku s i kolorze RGB oraz parametrze skupienia wiązki p . Wyznacz intensywność światła w punkcie P , dla współczynników osłabienia: k_c, k_l, k_q

(a)

$$Q = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad s = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad RGB = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.5 \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$k_c = 1, \quad k_l = 0.2, \quad k_q = 0.04, \quad p = 2$$

(b)

$$Q = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad s = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad RGB = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.5 \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$k_c = 1, \quad k_l = 0.2, \quad k_q = 0.04, \quad p = 2$$

(c)

$$Q = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad s = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad RGB = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.5 \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$k_c = 1, \quad k_l = 0.2, \quad k_q = 0.04, \quad p = 2$$