

Vortrag 14 – Die Dedekindsche Zetafunktion

Primzahlen der Form $x^2 + ny^2$

Seminar im WS 2021/2022

Vinzenz Baumann

Zusammenfassung

Wir führen die Dedekindsche Zetafunktion ζ_K eines Zahlkörpers K (als Eulerprodukt) ein, zeigen, dass sie eine holomorphe Funktion auf $\{s \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(s) > 1\}$ definiert, und leiten ihre Dirichletreihenentwicklung her. Anschließend *Beweisen* wir, dass ζ_K im Falle eines quadratischen Zahlkörpers K als Produkt der Riemannschen Zetafunktion ζ mit einer gewissen L -Funktion geschrieben werden kann. Ist K imaginär quadratisch, so erhalten wir auf diese Weise eine handliche Formel für die Anzahl der Darstellungen einer natürlichen Zahl $n \in \mathbb{N}$ als $n = f(x, y)$, wobei f eine reduzierte quadratische Form $f \in \mathbb{Z}[X, Y]$ mit Diskriminante Δ_K ist.

1. Definitionen und Notationen

Die Riemannsche Zetafunktion ist definiert als

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

mit

$$\zeta : \{s \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(s) > 1\} \rightarrow \mathbb{C}$$

Dabei ist $\prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}}$ die Definition als Eulerprodukt über Primzahlen und $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ die Definition als Dirichletreihe.

Definition 1.1 (Zahlkörper)

Ein Rationalitätsbereich oder (algebraischer) Zahlkörper ist eine endliche Körpererweiterung der rationalen Zahlen \mathbb{Q} . Sei im Folgenden K ein Zahlkörper. Man nennt einen Zahlkörper *quadratisch*, wenn er die Dimension 2 hat.

Definition 1.2 (Ganzheitsring)

Sei K ein Zahlkörper. Dann definiert $O_K := K \cap \mathbb{A}$ den *Ganzheitsring*, wobei \mathbb{A} als Ring der ganz algebraischen Zahlen definiert ist.

Definition 1.3 (Absolutnorm eines Ideals)

Sei K ein Zahlkörper mit Ganzheitsring O_K und \mathfrak{a} ein Ideal in O_K , welches ungleich dem Nullideal ist. So ist die Absolutnorm definiert durch

$$N(\mathfrak{a}) := [O_K : \mathfrak{a}] = |O_K/\mathfrak{a}|$$

Bemerkung:

- (1) Nach Konvention ist die Norm des Nullideals 0.
- (2) Ist \mathfrak{a} ein Hauptideal (a) , dann ist

$$N(\mathfrak{a}) = |N_{K|\mathbb{Q}}(a)|$$

- (3) Die Norm ist multiplikativ. Es ist $N(\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b}) = N(\mathfrak{a}) \cdot N(\mathfrak{b})$

Definition 1.4 (Dedekindsche Zetafunktion)

Sei K ein Zahlkörper. Wir definieren die *Dedekindsche Zetafunktion* ζ_K zum Zahlkörper K durch

$$\zeta_{K(s)} := \prod_{\mathfrak{p}} \frac{1}{1 - N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{p})^{(-s)}}$$

wobei sich das Produkt über alle Primideale $\langle 0 \rangle \subsetneq \mathfrak{p} \subseteq O_K$ erstreckt. Wir definieren $N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{p}) := |O_K/\mathfrak{p}|$ und auch $N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{p})^{(-s)} := \exp(-\log(N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{p})) \cdot s)$

Satz 1.1

Für Zahlkörper $K = \mathbb{Q}$ stimmt die Dedekindsche Zetafunktion mit der Riemanschen Zetafunktion überein.

Beweis:

Es ist $O_K = \mathbb{Z}$, also sind die Primideale $\langle 0 \rangle \subsetneq \mathfrak{p} \subseteq O_K$ gerade jene Hauptideale $\langle p \rangle \subseteq \mathbb{Z}$, die von Primzahlen p erzeugt werden. Führen wir diesen Gedanken weiter so gilt $N_{\mathbb{Q}|\mathbb{Q}}(\langle p \rangle) = |\mathbb{Z}/\langle p \rangle| = p$, also erhalten wir

$$\zeta_{\mathbb{Q}}(s) = \prod_p \frac{1}{1 - p^{(-s)}} = \zeta(s)$$

Definition 1.5 (Unendliches Produkt)

Sei $(a_\nu) \subset \mathbb{C}$. Das Unendliche Produkt $\prod_{\nu=1}^{\infty} (a_\nu)$ existiert, falls gilt:

- (1) Entweder sind alle $a_\nu \neq 0$, es existiert der Grenzwert $a := \lim \prod_{\nu=1}^n (a_\nu)$ und es ist $a \neq 0$
- (2) Oder es gibt ein ν_0 , so dass $a \neq 0$ für alle $\nu \geq \nu_0$ ist, und es existiert $a^* := \prod_{\nu=\nu_0}^{\infty} a_\nu$ im obigen Sinne. Dann setzen wir $a := a^* \cdot \prod_{\nu=1}^{\nu_0-1} a_\nu$.

Satz:

(Konvergenz von unendlichen Produkten)

Das Unendliche Produkt $\prod_{\nu=1}^{\infty} (a_{\nu})$ existiere. Dann gilt:(1) $\prod_{\nu=1}^{\infty} a_{\nu} = 0$ genau dann, wenn mindestens ein a_{ν} gleich Null ist.(2) Die Folge (a_{ν}) ist "1-Folge", das heißt es ist $\lim_{\nu \rightarrow \infty} a_{\nu} = 1$ **Konstruktion des Logarithmus im Komplexen**Durch die Einschränkung der Exponentialfunktion auf den Streifen $S = \{w \in \mathbb{C} \mid \Im w(-\pi, \pi)\}$ wird sie injektiv und der Satz der Umkehrfunktion ist anwendbar. Daraus folgt:

$$\text{Log}(z) := \log(r) + \phi$$

Hierbei bezeichnet \log den reellen und Log den komplexen Logarithmus.**Cauchy-Riemann-Differentialgleichung in Polarkoordinaten (CRDFG)**Durch die Darstellung einer komplexen Zahl als $z = r \cdot e^{i\phi}$ folgt eine besondere Form der CRDFG. Es ist:

$$(1) \frac{\delta u}{\delta r} = \frac{1}{r} \frac{\delta v}{\delta \phi}$$

und

$$(2) \frac{\delta v}{\delta r} = -\frac{1}{r} \frac{\delta u}{\delta \phi}$$

mit $f = u + iv$.**Bemerkung:** Log ist holomorphMit obiger Gleichung folgt mit $\text{Log}(r \cdot e^{i\phi}) := \log(r) + i\phi$, dass

$$\frac{\delta u}{\delta r} = \frac{1}{r} = \frac{1}{r} \frac{\delta v}{\delta \phi}$$

und

$$\frac{\delta v}{\delta r} = 0 = -\frac{1}{r} \frac{\delta u}{\delta \phi}$$

mit $f = \log(r) + i\phi = u + iv$.**Potenzreihe des Logarithmus auf $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ Mit**

$$\text{Log}(z) := \log|z| + i \cdot \arg(z)$$

folgt:

$$\text{Log}(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{(n-1)}}{n} (z-1)^n$$

als Potenzreihe mit Konvergenzradius 1 für alle $z \in \mathbb{C}$ und $z \neq 0$.**Definition (Normale Konvergenz)**Eine Reihe von Funktionen $f_1 + f_2 + f_3 + \dots f_n : D \rightarrow \mathbb{C}$ für $D \subset \mathbb{C}$ und $n \in \mathbb{N}_0$ heißt *normal konvergent in D*, falls es zu jedem Punkt $a \in D$ eine Umgebung U und eine Folge $(M_n)_{n \geq 0}$ nicht negativer reeller Zahlen gibt, so dass gilt

$$|f_n(z)| \leq M_n$$

für alle $z \in U \cap D$, für alle $n \in \mathbb{N}_0$ und $\sum_{n=0}^{\infty} M_n$ konvergent.

Identitätssatz

Seien f und g holomorphe Funktionen auf einer Umgebung U von z_0 und sei z_0 ein Häufungspunkt der Koinzidenzmenge $\{z \in U \mid f(z) = g(z)\}$, dann existiert eine Umgebung V von z_0 mit $f(z) = g(z)$ auf ganz V .

Hilfslemma (1)

Abschätzung $|\operatorname{Log}(1+z)| \leq 2|z|$ für alle $z \in \mathbb{C}$ mit $|z| \leq \frac{1}{2}$

Beweis:

$$|\operatorname{Log}(1+z)| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{(n-1)} \frac{z^n}{n} \right| \leq |z| \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|z|^n}{n+1} < |z| \cdot \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2 \cdot 2} + \frac{1}{3 \cdot 2^2} + \dots + \frac{1}{(n+1) \cdot 2^n} \right) = 2 \cdot |z|$$

wobei bei dem letzten Gleichheitszeichen der Wert der geometrischen Reihe benutzt wurde. Nämlich

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1) \cdot 2^n} < \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{1 - \left(\frac{1}{2}\right)} = 2$$

Lemma

Sei $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ eine normal konvergente Reihe von holomorphen Funktionen $f_n : D \rightarrow \mathbb{C}$ auf einem Gebiet $D \subseteq \mathbb{C}$. Dann existieren für jeden Punkt $z \in \mathbb{C}$ eine offene Umgebung $z \in U \subseteq \mathbb{C}$ so wie eine natürliche Zahl $N \in \mathbb{N}$, sodass $|f_n(z)| \leq \frac{1}{2}$ für alle $z \in U$ und alle $n \geq N$ gilt. In diesem Fall ist durch

$$F_N(z) := \sum_{n=N}^{\infty} \operatorname{Log}(1 + f_n(z))$$

eine holomorphe Funktion $F_N : U \rightarrow \mathbb{C}$ definiert, Weiter gilt

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^m (1 + f_n(z)) = \prod_{n=1}^{N-1} (1 + f_n(z)) \cdot e^{F_N(z)}$$

für alle $z \in U$. Insbesondere stellt das unendliche Produkt

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + f_n(z)) := \lim_{m \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^m (1 + f_n(z))$$

eine holomorphe Funktion auf D dar.

Beweis

Hilfslemma

Aus $|f_n(z)| \leq \frac{1}{2}$ folgt $f_n(z) \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{\leq 0}$. Ist $|f_n(z)| \leq \frac{1}{2}$ so folgt $f_n(z) \leq +\frac{1}{2}$ oder $f_n(z) \leq -\frac{1}{2}$. Im ersten Fall und zweiten Fall folgt mit der Addition von 1, der Wurzeldearstellung und deren Multiplikativität des komplexen Betrag und dessen positiven Definitheit, dass wir uns nie im reell negativen Zahlbereich befinden. Wäre $f_n(z) = 0$ ist das wiederum aufgrund der Definitheit des Betrags $|f_n(z)| = 0$ und $f_n(z) + 1$ durch die Addition mit 1 wieder positiv und reell.

Es ist $\text{Log}(1 + f_n(z))$ für alle $z \in U$ und $n \geq N$ definiert, da aus der obiger Betrachtung hervorgeht, dass $1 + f_n(z)$ auf der Einschränkung auf der Log definiert ist, operiert.

$(1 + f_n(z)) \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{\leq 0}$ gilt. Zeige weiter $F_N(z) := \sum_{n=N}^{\infty} \text{Log}(1 + f_n(z))$ ist normal konvergent auf U . Dies folgt daraus, dass $|\text{Log}(1 + z)| \leq 2|z|$ für $z \in \mathbb{C}$ mit $|z| \leq \frac{1}{2}$ nach Hilfslemma (1) und der Tatsache das mit der Abschätzung von $|\text{Log}(1 + z)| \leq 2|z|$ mit $|f_n(z)| \leq \frac{1}{2}$ genau der Definition der Normalen Konvergenz entspricht. Insbesondere stellen F_N und e^{F_N} holomorphe Funktionen dar, da Holomorphie unter Bildung von Summen, Produkten und Verkettungen erhalten bleibt. Für beliebige $z \in \mathbb{C}$ und $m \leq N$ gilt, dass

$$\begin{aligned} \prod_{n=1}^m (1 + f_n(z)) &= \prod_{n=1}^{N-1} (1 + f_n(z)) \cdot \prod_{n=N}^m (1 + f_n(z)) = \prod_{n=1}^{N-1} (1 + f_n(z)) \cdot \prod_{n=N}^m (e^{\text{Log}(1 + f_n(z))}) \\ &= \prod_{n=1}^{N-1} (1 + f_n(z)) \cdot \prod_{n=N}^m (e^{\sum_{n=N}^m \text{Log}(1 + f_n(z))}) \end{aligned}$$

wobei hier benutzt wurde, dass e^{F_N} auf der bereits oben angesprochenen Einschränkung, konform mit dem komplexen Logarithmus agiert. Mit der Stetigkeit der Exponentialfunktion folgt,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^m (1 + f_n(z)) = \prod_{n=1}^{N-1} (1 + f_n(z)) \cdot e^{F_N(z)}$$

für alle $z \in U$ gilt. Durch die Holomorphie von $(1 + f_n)$ für $1 \leq n \leq N - 1$ und e^{F_N} und dem Umstand, dass endliche Produkte holomorpher Funktionen wiederum holomorph sind, stellt

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + f_n(z))$$

als unendliches Produkt eine holomorphe Funktion -nicht nur für alle z_0 auf U sondern aufgrund der Offenheit der Umgebung U auf ganz D , dar.

Proposition

Sei K ein Zahlkörper. Dann konvergiert das unendliche Produkt

$$\zeta_K(s) = \prod_{\mathfrak{p}} \frac{1}{1 - N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{p})^{-s}}$$

für $s \in \mathbb{C}$ mit $\text{Re}(s) > 1$. Des weiteren stellt $\zeta_K(s): \{s \in \mathbb{C}: \text{Re}(s) > 1\} \rightarrow \mathbb{C}$ eine holomorphe Funktion dar.

Beweis:

Der Ausdruck

$$\zeta^*_{K(s)} = \prod_{\mathfrak{p}} (1 - N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{p})^{-s})$$

für $s \in \mathbb{C}$ mit $\operatorname{Re}(s) > 1$ konvergiert, beziehungsweise ist auf diesem Gebiet holomorph. Zunächst ist es wichtig zu sehen, dass keiner der Faktoren $1 - N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{p})^{(-s)}$ eine Nullstelle in der Menge $s \in \mathbb{C}$ mit $\operatorname{Re}(s) > 1$ besitzt.

Dies folgt schnell über:

Angenommen $1 - N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{p})^{(-s)}$ hat eine Nullstelle in der Menge $s \in \mathbb{C}$ mit $\operatorname{Re}(s) > 1$ so folgt $1 = N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{p})^{(-s)}$. Das bedeutet nach der Norm $|O_K/\mathfrak{p}| = 1$ das heißt $\mathfrak{p} = O_K$. Dann ist aber \mathfrak{p} nicht echt in O_K und daher kein Primideal. Widerspruch.

Trifft die Behauptung auf ζ_{*K} zu, so gilt zusätzlich $\zeta_{*K} \neq 0$ für alle $s \in \mathbb{C}$ mit $\operatorname{Re}(s) > 1$. Denn wäre $\zeta_{*K} = 0$, so wäre nach oben stehenden Satz mindestens ein Faktor gleich Null. Dies haben wir aber eben ausgeschlossen. So ist auch ζ_{*K}^{-1} holomorph auf diesem Gebiet. Es genügt nun zu zeigen, dass $\zeta_{*K}^{-1} = \zeta_K$. Es ist:

$$\zeta_{*K}^{-1} = \left(\prod_{\mathfrak{p}} (1 - N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{p})^{(-s)}) \right)^{-1} = \prod_{\mathfrak{p}} (1 - N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{p})^{(-s)})^{-1} = \prod_{\mathfrak{p}} \frac{1}{1 - N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{p})^{(-s)}} = \zeta_K$$

Damit folgt ζ_K ist holomorph auf $\{s \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(s) > 1\}$. Der Nachweis der normalen Konvergenz der Funktionenreihe

$$\sum_{\mathfrak{p}} N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{p})^{-s}$$

auf $\{s \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(s) > 1\}$ folgt aus:

$$\sum_{\mathfrak{p}} |e^{\operatorname{Log}(N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{p})^{(-s)})}| = \sum_{\mathfrak{p}} |e^{-s \cdot \operatorname{Log}(N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{p}))}|$$

und unter der Verwendung von: Es ist mit $z = x + iy$

$$|e^z| = e^x$$

da

$$|e^z| = |e^{x+iy}| = |e^x \cdot e^{iy}| = |e^x| \cdot |e^{iy}| = e^x \cdot |e^{iy}| = e^x \cdot |\cos(y) + i \sin(y)| = e^x \cdot \sqrt{\cos^2(y) + \sin^2(y)} = e^x \cdot 1$$

und mithilfe der Betrachtung: Jedes Primideal $\langle 0 \rangle \subsetneq \mathfrak{p} \subseteq O_K$ in $\mathfrak{p} \in O_K$ enthält eine Primzahl p und \mathfrak{p} tritt in diesem Fall in der Primidealzerlegung (Siehe Vortrag 5) des Hauptideals $\langle p \rangle = p \cdot O_K$ auf. Weiter gibt es zu jeder Primzahl p nur endlich viele Primideale $\mathfrak{p} \subset O_K$ die p enthalten. Präziser gilt: Für fast alle Primzahlen p gibt es höchstens $[K : \mathbb{Q}]$ verschiedene Primideale $\mathfrak{p} \subset O_K$, die p enthalten.

////////// warum gilt die norm von \mathfrak{p} ist dasselbe wie die kardinalität von o_K modulo \mathfrak{p} größer gleich p //////////

So folgt:

$$\sum_{\mathfrak{p}, p \in \mathfrak{p}, p > C} (N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{p}))^{-\operatorname{Re}(s)} \leq [K : \mathbb{Q}] \cdot \sum_{p > C} p^{-\operatorname{Re}(s)}$$

Den letzten Ausdruck kann man mithilfe der Geometrischen Reihe abschätzen.

Definition Dirichletreihe

Eine (formale) Dirichletreihe ist eine Reihe der Form

$$\mathbb{D}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}$$

, wobei a_n eine beliebige Folge komplexer Zahlen beschreibt.

Proposition

Sei K ein Zahlkörper. Dann gilt für alle $s \in \mathbb{C}$ mit $\operatorname{Re}(s) > 1$, dass

$$\zeta_K(s) = \sum_{\mathfrak{J}} \frac{1}{(N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{J}))^s} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}$$

wobei sich die Summation in $\sum_{\mathfrak{J}}$ über alle Ideale $\langle 0 \rangle \subsetneq \mathfrak{p} \subseteq O_K$ erstreckt, und a_n für $n \in \mathbb{N}$ die Anzahl der Ideale $\mathfrak{J} \subseteq O_K$ mit $N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{J}) = n$ bezeichnet. Insbesondere gilt:

$$\zeta_K(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

Beweis:

Zur Vereinfachung, führt man eine beliebige Nummerierung auf der Menge aller Primideale $\langle 0 \rangle \subsetneq \mathfrak{p} \subseteq O_K$ ein. Diese hat die Form

$$\{\langle 0 \rangle \subsetneq \mathfrak{p} \subseteq O_K \text{ Primideal}\} = \{\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \mathfrak{p}_3, \dots\}$$

Die Abzählbarkeit dieser Menge folgt aus:

????Angenommen es gibt eine nichtleere Menge M von Idealen für die nicht gilt, dass die Menge der Primideale in einem O_K , welcher noetherscher Integritätsring ist, abzählbar ist. Da O_K noethersch, folgt es existiert ein maximales Ideal a in M . Dieses kann kein Primideal sein, das heißt es gibt Elemente b_1, b_2 in O_K mit $b_1 b_2 \in a$ aber $b_1, b_2 \notin a$. Setzte $a_1 = (b_1) + a$, $a_2 = (b_2) + a$, so ist $a \subsetneq a_1$ und $a \subsetneq a_2$ und $a_1 a_2 \subsetneq a$. Aus Maximalitätsgründen enthalten a_1 und a_2 Produkte von Primidealen, deren Produkte wiederum in a liegen. Widerspruch.????

Sei weiter $s \in \mathbb{C}$ mit $\operatorname{Re}(s) > 1$ beliebig, dann ist mit $N_{K|\mathbb{Q}} \leq 2$ für jedes $m \in \mathbb{N}$, analog dem *Beweis* (siehe oben). So folgt:

$$\prod_{m=1}^n \frac{1}{1 - N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{p}_m)^{-s}} = \prod_{m=1}^n \sum_{k=0}^{\infty} (N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{p}_m))^{-k \cdot s} = \prod_{m=1}^n \sum_{k=0}^{\infty} (N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{p}_m^k))^{(-s)}$$

Daraus resultiert mit Anwendung der Geometrischen Reihe auf $(N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{p}_m^k))^{(-s)} < 1$, dass das Produkt absolut konvergiert, da es Produkt absolut konvergenter Reihen ist. Mithilfe des Umordnungssatzes für absolut konvergente Reihen und der Multiplikativität der Norm spricht dann:

$$\begin{aligned} \prod_{m=1}^n \sum_{k=0}^{\infty} (N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{p}_m^k))^{(-s)} &= 1 + \sum_{j=1}^n \sum N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{p}_{m_1}^{\alpha_1})^{(-s)} \cdots (N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{p}_{m_j}^{\alpha_j}))^{(-s)} \\ &= 1 + \sum_{j=1}^n \sum N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{p}_{m_1}^{\alpha_1} \cdots \mathfrak{p}_{m_j}^{\alpha_j})^{(-s)} \end{aligned}$$

wobei sich die unbeschriftete Summe über alle Teilmengen $\{m_1, \dots, m_j\} \subseteq \{1, \dots, n\}$ und alle $(\alpha_1, \dots, \alpha_j)$ erstreckt. Mit $n \rightarrow \infty$ folgt mit der vorherigen Proposition, dass

$$1 + \sum_{j=1}^{\infty} \sum N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{p}_{m_1}^{\alpha_1} \cdots \mathfrak{p}_{m_j}^{\alpha_j})^{(-s)}$$

Aufgrund der eindeutigen Primidealzerlegung in O_K und dass $\mathbb{N}_K(O_K)^{-s} = 1$ tritt jedes Ideal $\langle 0 \rangle \subsetneq \mathfrak{p} \subseteq O_K$ genau einmal als $\mathfrak{p}_{m_1}^{\alpha_1} \cdots \mathfrak{p}_{m_j}^{\alpha_j}$ genau einmal auf. Wieder aufgrund der Umordnung, folgt daraus

$$\zeta_K(s) = \sum_{\mathfrak{J}} \frac{1}{(N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{J}))^s} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}$$

und im Falle $K = \mathbb{Q}$ gibt es für jede natürliche Zahl genau ein Ideal mit Norm n , nämlich $\langle n \rangle = n\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$, daher gilt $a_n = 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$. So folgt insbesondere:

$$\zeta_K(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

Definition Aus Vortrag 8 existierender Gruppenhomomorphismus als Funktion aufgefasst $\chi_k: \mathbb{N} \rightarrow \{-1, 0, 1\}$, wobei man für $n \in \mathbb{N}$ schreibt, dass

$$\chi_K = \begin{cases} 0 & \text{falls } ggT(n, \Delta_K) > 1, \\ \chi_K(\bar{n}) & \text{falls } ggT(n, \Delta_K) = 1 \end{cases}$$

Theorem

Sei $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ ein quadratischer Zahlkörper. Dann definiert das Euler Produkt

$$L(s, \chi_K) := \prod_p \frac{1}{1 - \chi_K(p)p^{(-s)}}$$

eine holomorphe Funktion $L(s, \chi_K): \{s \in \mathbb{C}: \operatorname{Re}(s) > 1\} \rightarrow \mathbb{C}$, und es gilt

$$\zeta_K(s) = \zeta(s) \cdot L(s, \chi_K)$$

für alle $s \in \mathbb{C}$ mit $\operatorname{Re}(s) > 1$. Man nennt $L(\cdot, \chi_k)$ die *L-Funktion zum Gruppenhomomorphismus* χ_K .

Beweis:

Wenn

$$\prod_{\mathfrak{p}, p \in \mathfrak{p}} \frac{1}{(1 - N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{p}))^{(-s)}} = \frac{1}{1 - p^{-s}} \cdot \frac{1}{1 - \chi_k(p)p^{-s}}$$

für jede Primzahl p gilt, dann folgt daraus

$$L(s, \chi_K) = \zeta_K(s) \cdot \zeta(s)^{-1}$$

für alle $s \in \mathbb{C}$ mit $\operatorname{Re}(s) > 1$ gilt, da $\zeta(s) \neq 0$. Dadurch ist

$$L(\cdot, \chi_K) = \zeta_K \cdot \zeta^{-1}: \{s \in \mathbb{C}: \operatorname{Re}(s) > 1\} \rightarrow \mathbb{C}$$

eine holomorphe Funktion.

Fallunterscheidung

Fall 1: $O_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-d}]$

Betrachte also $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$. Die Primideale $\mathfrak{p} \subseteq O_K$, die p enthalten, entsprechen genau den Primidealen im Ring

$$O_K/\langle p \rangle \cong \mathbb{Z}[X]/\langle X^2 - d, p \rangle \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]/\langle X^2 - \bar{d} \rangle$$

da //////////////////////////////////

Fall 1.1:

Angenommen $p \mid \Delta_K$. Das bedeutet im Fall $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$ das entweder $p = 2$ oder $p \mid d$. Im ersten Fall ist $X^2 - \bar{d} = (X - \bar{d})^2 \in (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X]$.

Im zweiten Fall ist $X^2 - \bar{d} = X^2 \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$, also hat das Polynom $X^2 - \bar{d} \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ auf jeden Fall eine doppelte Nullstelle in $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Vermöge der Isomorphismus von oben, bedeutet das einerseits, dass $\langle p \rangle \subseteq O_K$ kein Primideal ist und andererseits, dass es ein eindeutiges Primideal $\mathfrak{p} \subseteq O_K$ mit $p \in \mathfrak{p}$ gibt,

da //////////////////////////////////

In Anbetracht der eindeutigen Primfaktorzerlegung kann das nur bedeuten, dass in $\langle p \rangle = \mathfrak{p}^k$ für ein $k \geq 2$ gilt. Da aber $p^2 = N_{K|\mathbb{Q}}(\langle p \rangle) = N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{p}^k) = N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{p})^k$ gilt, folgt aus der eindeutigen Primfaktorzerlegung in \mathbb{Z} , dass $k = 2$ und $N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{p}) = p$. So gilt für die linke Seite $\frac{1}{1-p^{-s}}$ und durch die rechte Seite

$$\frac{1}{1-p^{-s}} \cdot \frac{1}{1-0 \cdot p^{-s}} = \frac{1}{1-p^{-s}}$$

die Gleichheit beider Seiten.

Fall 1.2

Angenommen $p \nmid \Delta_K$ und $\chi(\bar{p}) = (\frac{\Delta_K}{p}) = 1$. Da $\Delta_K = 4d$, folgt daraus, dass

$$(\frac{d}{p}) = (\frac{2}{p})^2 \cdot (\frac{d}{p}) = (\frac{4d}{p}) = (\frac{\Delta_K}{p}) = 1$$

dann liefert die Definition des Legendre Symbols, dass $\bar{d} \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ ein Quadrat ist, sagen wir $\bar{d} = \bar{y}^2$ für ein $y \in \mathbb{Z}, p \nmid y$. Das ergibt, dass

$$X^2 - \bar{d} = (X - \bar{y})(X + \bar{y})$$

in $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$ gilt, also dass $X^2 - \bar{d}$ zwei verschiedene Nullstellen in $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ hat. Das bedeutet, dass es genau zwei verschiedene Primideale in O_K gibt, die p enthalten, und wie in (Fall 1.1), dass diese Norm p haben. Somit ist die linke Seite gegeben durch $(\frac{1}{1-p^{-s}})^2$, die rechte Seite durch

$$\frac{1}{1-p^{-s}} \cdot \frac{1}{1-1 \cdot p^{-s}} = (\frac{1}{1-p^{-s}})^2$$

wiederum gleich.

Fall 1.3

Angenommen $p \nmid \Delta_K$ und $\chi(\bar{p}) = (\frac{\Delta_K}{p}) = -1$. Wie in (Fall 1.2) folgt $(\frac{d}{p}) = -1$, also dass $\bar{d} \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ kein Quadrat ist. Das bedeutet aber, dass das Polynom

$X^2 - \bar{d} \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$ keine Nullstelle in $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ besitzt. Es ist $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]/\langle X^2 - \bar{d} \rangle$ ein Körper. Also trifft wegen des Isomorphismus Selbiges auf $O_K/\langle p \rangle$ zu. Das macht das von p erzeugte Ideal in O_K zu einem maximalen und insbesondere zu einem Primideal. Somit haben wir wieder für die linke Seite: $\frac{1}{1-(p^2)}^{-s} = \frac{1}{1-(p)}^{-2s}$ und die rechte Seite stimmt damit überein mit

$$\frac{1}{1-(p^{-s})} \cdot \frac{1}{(1-(-1)1p^{-s})} = \frac{1}{(1-p^{-s}(1+p^{-s}))} = \frac{1}{1-p^{-2s}}$$

Fall 2: $O_K = \mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{d}}{2}]$ Betrachte also $d \equiv 1 \pmod{4}$

Theorem

Sei K ein imaginär quadratischer Zahlkörper. Für jede natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}$ bezeichnen wir mit $r_k(n)$ die Anzahl der Paare $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$, sodass $n = f(x, y)$ für eine reduzierte quadratische Form $f \in \mathbb{Z}[X, Y]$ mit Diskriminante Δ_K gilt. Dann ist

$$r_k(b) = {}^{(1)} |O_K^\times| \cdot a_n = {}^{(2)} |O_K^\times| \cdot \sum_{d|n} \chi_K(n)$$

wobei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ die Folge der Koeffizienten der Dirichletreihe zu ζ_K ist, und

$$|O_K^\times| = \begin{cases} 4, & \text{falls } d = -1 \\ 6, & \text{falls } d = -3 \\ 2, & \text{sonst} \end{cases}$$

gilt.

Beweis:

Die Aussage über $|O_K^\times|$ wurde in Vortrag 3 bewiesen. Somit verbleibt es die Gleichheitszeichen (1) und (2) zu zeigen. Beginne mit dem (2). Es ist

$$L(s, \chi_K) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi_K(n)}{n^s}$$

für alle $s \in \mathbb{C}$ mit $\operatorname{Re}(s) > 1$. Da $\chi_K: \mathbb{N} \rightarrow \{-1, 0, 1\}$ strikt multiplikativ. Das heißt es gilt $\chi(mn) = \chi(m) \cdot \chi(n)$ für beliebige $m, n \in \mathbb{N}$. Die Fallunterscheidung nach O.B.D.A. $\operatorname{ggT}(n, \Delta_K) > 1$ hat direkt zur Folge, dass $\operatorname{ggT}(nm, \Delta_K) > 1$ und daraus resultiert $\chi_K(nm) = 0 = 0 \cdot \chi(m) = \chi(m) \cdot \chi(n)$. Nun bleibt $\operatorname{ggT}(n, \Delta_K) = 1$, so wie $\operatorname{ggT}(m, \Delta_K) = 1$ so folgt, nach der Definition der Abbildung für beliebige natürliche Zahlen als Gruppenhomomorphismus

$$\chi(mn) = \chi(\bar{n}) \cdot \chi(\bar{m}) = \chi(m) \cdot \chi(n)$$

Das führt zur Behauptung

$$\zeta(s) \cdot L(s, \chi_K) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{d|n} \chi_K(d) \right) \frac{1}{n^s}$$

für alle $s \in \mathbb{C}$ mit $\operatorname{Re}(s) > 1$, wobei die Summe $\sum_{d|n}$ über alle positiven Teiler $d \in \mathbb{N}$ von n durchläuft. Da die beiden Dirichletreihen

$$\zeta(s) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^s}$$

und

$$L(s, \chi_K) = \sum_{d=1}^{\infty} \frac{\chi_K(d)}{d^s}$$

für alle $s \in \mathbb{C}$ mit $\operatorname{Re}(s) > 1$ absolut konvergieren. Dies folgt für beide direkt wegen der Anwendung der Geometrischen Reihe.

So konvergiert auch das Produkt aus beiden, mit dem Namen

$$\zeta(s) \cdot L(s, \chi_K) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{d=1}^{\infty} \frac{\chi_K(d)}{(md)^s}$$

absolut. Dadurch ist die Umordnung der Summation beliebig veränderbar zu

$$\zeta(s) \cdot L(s, \chi_K) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{d=1}^{\infty} \frac{\chi_K(d)}{(md)^s} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{d|n} \chi_K(d) \right) \frac{1}{n^s}$$

im letzten Schritt nutzt es, dass $n \cdot m = n$ wiederum in \mathbb{N} durch ein beliebiges $n \in \mathbb{N}$ dargestellt werden kann.

Motivation

Die Identität $\zeta_K(s) = \zeta(s) \cdot L(s, \chi_K)$ aus vorigem Theorem liefert nun eine also eine Identität von, für $s \in \mathbb{C}$ mit $\operatorname{Re}(s) > 1$ absolut konvergenten Dirichletreihen

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{d|n} \chi_K(d) \right) \frac{1}{n^s}$$

wobei $a_n = \sum_{d|n} \chi_K(d)$ für beliebige $n \in \mathbb{N}$ aus dem nächsten Lemma folgt.

Lemma

Sei $N \in \mathbb{N}_0$ und $f: \{s \in \mathbb{C}: \operatorname{Re}(s) > N\} \rightarrow \mathbb{C}$ eine holomorphe Funktion, falls für alle $s \in \mathbb{C}$ mit $\operatorname{Re}(s) > N$ durch eine absolut konvergente Dirichletreihe

$$f(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n^s}$$

gegeben ist, dann ist die Koeffizientenfolge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eindeutig durch f festgelegt. Dies ist äquivalent zur Einzigartigkeit der Darstellung von f als absolut konvergente Dirichletreihe, sofern die Darstellung überhaupt existiert.

Beweis:

Es bietet sich ein induktives Vorgehen an. Zunächst steht die Behauptung

$$b_1 = \lim_{k \rightarrow \infty} f(k)$$

also das b_1 Grenzwert der Folge

$$(f(N+1), f(N+2), f(N+3), \dots)$$

ist. Denn dadurch ist b_1 eindeutig durch f festgelegt. Dies gilt da

$$f(s) = b_1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n^s} \xrightarrow{s \rightarrow \infty} b_1 + 0 = b_1$$

Dadurch ist b_1, \dots, b_m für ein $m \in \mathbb{N}$ eindeutig durch f festgelegt. Ersetze $f(s)$ durch $f(s) - \sum_{n=1}^m \frac{b_n}{n^s}$. Daraus folgt die Annahme, dass $b_1 = \dots = b_m = 0$ gilt. Mit selbigem Argument wie oben folgt

$$b_{m+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} (m+1)^k f(k)$$

also ist auch b_{m+1} eindeutig durch f festgelegt.

Damit ist erreicht, was in der Motivation gefordert war.

Nun schließt der *Beweis* zur Rechtfertigung des ersten Gleichheitszeichen des Theorems. Zuerst ist

$$\zeta_K(s) = \sum_{C \in Cl_K} \sum_{\mathfrak{J} \in C} \frac{1}{N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{J})^s}$$

wobei sich die Summe $\sum_{\mathfrak{J} \in C}$ über alle Ideale $\langle 0 \rangle \subsetneq \mathfrak{J} \subseteq O_K$ aus der Idealklasse $C \in Cl_K$ erstreckt. Das erste Summenzeichen ist nach Vortrag 7 bereits endliche Summe. Die Fixierung eines beliebigen Ideals $\langle 0 \rangle \subsetneq \mathfrak{L} \subseteq O_K$ mit $\mathfrak{L} \in C^{-1}$ wobei C^{-1} die inverse Idealklasse zu C in Cl_K bezeichnet. Die Behauptung liegt nahe, dass

$$\{\text{Ideale } \langle 0 \rangle \subsetneq \mathfrak{J} \subseteq O_K \text{ mit } \mathfrak{J} \in C\} \rightarrow (\mathfrak{L} \setminus \{0\})/O_K^\times = \{\beta \cdot O_K^\times : \beta \in \mathfrak{L} \setminus \{0\}\}$$

gegeben durch

$$\mathfrak{J} \mapsto \text{Erzeuger des Hauptideals } \mathfrak{J} \cdot \mathfrak{L} \cdot O_K^\times$$

eine wohldefinierte Bijektion darstellt.

Zunächst die Wohldefiniertheit:

Es ist $\mathfrak{J} \cdot \mathfrak{L} \subseteq O_K$ ein Hauptideal mit Namen $\langle \alpha \rangle = \mathfrak{J} \cdot \mathfrak{L}$, weil $\mathfrak{J} \cdot \mathfrak{L} \in C \cdot C^{-1} = P_K$, wobei $P_K \in Cl_K$ die Klasse aller gebrochenen Hauptideale, also das neutrale Element bezeichnet. Darüber hinaus ist $\alpha \in \langle \alpha \rangle = \mathfrak{J} \cdot \mathfrak{L} \subseteq \mathfrak{L}$. Es folgt leicht, dass genau dann $\langle \alpha \rangle = \langle \beta \rangle$ für beliebige $\beta \in \mathfrak{L}$ wenn α und β assoziiert sind. Denn sei $\alpha = \beta \cdot y$ mit $y \in O_K^\times$ so folgt $\alpha \mid \beta$ damit unmittelbar $\beta \in \langle \alpha \rangle$ und $\langle \beta \rangle \subseteq \langle \alpha \rangle$. Dasselbe gilt für $y := y^{-1}$ da y eine Einheit ist. Also analog für die Vertauschung von α und β . Die Rückrichtung nutzt, dass O_K ein Hauptidealring ist. Sei weiter $\langle \alpha \rangle = \langle \beta \rangle$. Nach Wahl der Darstellungen für $\beta = \alpha \cdot c$ und $\alpha = \beta \cdot d$, so folgt $\alpha = c \cdot d \cdot \alpha$ daraus unmittelbar $1 - cd = 0$. Da O_K auch noch Integritätsring und somit nullteilerfrei ist, folgt $\alpha = 0$ ($\beta = 0$) oder $1 - cd = 0$. Dies spricht dafür, dass $b, c \in O_K^\times$ also Einheiten sind. So sind α und β assoziiert.

So ist obige Abbildung wohldefiniert und injektiv.

Beweis der Surjektivität

Sei dazu $\beta \in \mathfrak{L} \setminus \{0\}$ und $\langle 0 \rangle \subsetneq \mathfrak{J} \subseteq O_K$ mit $\mathfrak{J} \in C$ beliebig und weiter $\mathfrak{J} \cdot \mathfrak{L} = \langle \alpha \rangle$ für ein $\alpha \in \mathfrak{L}$. Dann gilt $\frac{\beta}{\alpha} \cdot \mathfrak{J} \in C$ und $\frac{\beta}{\alpha} \cdot \mathfrak{J} \cdot \mathfrak{L} = \langle \beta \rangle$. Diese Darstellung ist richtig da für $\frac{\beta}{\alpha} \cdot \mathfrak{J} \subseteq K$ tatsächlich gilt $\frac{\beta}{\alpha} \cdot \mathfrak{J} \subseteq O_K$. Dies folgt daraus, dass $\beta \in \mathfrak{L}$ und damit $\langle \beta \rangle \subseteq \mathfrak{L}$. Das wiederum hat zur Folge, dass $\mathfrak{L} \mid \langle \beta \rangle$ ist. Dies bedeutet, dass ein Ideal $\mathfrak{L}' \subseteq O_K$ mit $\mathfrak{L} \cdot \mathfrak{L}' = \langle \beta \rangle$. Durch Einsetzen in $\frac{\beta}{\alpha} \cdot \mathfrak{J} \cdot \mathfrak{L} = \langle \beta \rangle$ so

ist $\frac{\beta}{\alpha} \cdot \mathfrak{J} \cdot \mathfrak{L} = \mathfrak{L} \cdot \mathfrak{L}'$ und nach Multiplikation mit \mathfrak{L}^{-1} folgt $\frac{\beta}{\alpha} \cdot \mathfrak{L}' \subseteq O_K$. Daraus folgt die Surjektivität.

Wegen der Eigenschaften der Norm $N(\alpha) = N_{K|\mathbb{Q}}(\langle \alpha \rangle) = N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{J} \cdot \mathfrak{L} = N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{J} \cdot N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{L}))$ ermöglicht die Bijektion umzuschreiben. Aus Vortrag 5 ist bekannt dass stets $\gamma, \delta \in \mathfrak{L}$ mit

$$\mathfrak{L} = \mathbb{Z}\gamma + \mathbb{Z}\delta = \{x\gamma + y\delta : x, y \in \mathbb{Z}\}$$

gefunden werden können. Weiter ist aus Vortrag 7 gegeben, dass

$$f := \frac{N(\gamma X + \delta Y)}{N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{L})} = \frac{(\gamma X + \delta Y) \cdot \iota((\gamma)X + \iota(\delta)Y)}{N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{L})} \in \mathbb{Z}[X, Y]$$

eine primitive, positiv definite quadratische Form mit Diskriminante Δ_K ist, die unter der Bijektion $C(\Delta_K) \rightarrow Cl_K$ auf C^{-1} , die Klasse von \mathfrak{L} in Cl_K abgebildet wird. Hieraus folgt, dass

$$\sum_{\mathfrak{J} \in C} \frac{1}{N_{K|\mathbb{Q}}(\mathfrak{J})^s} = \frac{1}{|O_K^\times|} \sum_{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}} \frac{1}{f(x,y)^s}$$

wobei sich dies durch das Ersetzen von f durch eine reduzierte quadratische Form, die eigentlich äquivalent zu f , nicht ändert. Das folgt nach Bemerkung aus Cox.S.23, dass äquivalente Formen dieselben Ganzzahlen repräsentieren.

Seien also $f_1, \dots, f_k \in \mathbb{Z}[X, Y]$ reduzierte quadratische Formen, die die Äquivalenzklassen aus $C(\Delta_K)$ repräsentieren. Dann erhalten wir aufgrund absoluter Konvergenz, dass

$$\zeta_K(s) = \sum_{j=1}^k \frac{1}{|O_K^\times|} \sum_{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}} \frac{1}{f_j(x,y)^s} = \frac{1}{|O_K^\times|} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r_K(n)}{n^s}$$

Das Gleichheitszeichen folgt dann analog mit dem vorherigen Lemma.