

Testas. Dviejų nelygybių sistema

I variantas

Matematika · 7 klasė · tema „Dviejų nelygybių sistema“ (4 skyrius „Nelygybės“) · maks. 13 t.

Vardas, pavardė: _____

Data: _____

1. Išspręsk sistemą ir užrašyk atsakymą intervalu.

3 t.

$$\begin{cases} x > 1 \\ x > 4 \end{cases} \rightarrow \text{-----}$$

2. Išspręsk sistemą ir užrašyk atsakymą intervalu.

3 t.

$$\begin{cases} x + 1 > 0 \\ -2x + 8 \geq -4 \end{cases} \rightarrow \text{-----}$$

3. Išspręsk sistemą ir užrašyk atsakymą intervalu.

3 t.

$$\begin{cases} 2x \geq 6 \\ 3x - 12 < 0 \end{cases} \rightarrow \text{-----}$$

4. Ar skaičius -2 yra sistemos $\begin{cases} x \geq -2 \\ x - 1 < 0 \end{cases}$ sprendinys? Pasitikrink abi nelygybes.

2 t.

5. Koks **didžiausias sveikasis** sistemos $\begin{cases} x < 5 \\ x \geq 0 \end{cases}$ sprendinys?

2 t.

Testas. Dviejų nelygybių sistema

II variantas

Matematika · 7 klasė · tema „Dviejų nelygybių sistema“ (4 skyrius „Nelygybės“) · maks. 13 t.

Vardas, pavardė: _____

Data: _____

1. Išspręsk sistemą ir užrašyk atsakymą intervalu.

3 t.

$$\begin{cases} x < 3 \\ x \geq -3 \end{cases} \rightarrow \text{-----}$$

2. Išspręsk sistemą ir užrašyk atsakymą intervalu.

3 t.

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ 2x + 1 > -3 \end{cases} \rightarrow \text{-----}$$

3. Išspręsk sistemą ir užrašyk atsakymą intervalu.

3 t.

$$\begin{cases} 3x + 2 \leq 8 \\ -4x - 7 < -5 \end{cases} \rightarrow \text{-----}$$

4. Koks **mažiausias sveikasis** sistemos $\begin{cases} x > -3 \\ x \leq 2 \end{cases}$ sprendinys?

2 t.

5. Kiek **sveikųjų** sprendinių turi sistema $\begin{cases} x \geq -1 \\ x < 3 \end{cases}$? Surašyk juos.

2 t.

Atsakymų raktas

Dviejų nelygybių sistema · 7 klasė · mokytojai (nespausdinti mokiniams)

Užd.	I variantas	II variantas
1	$x > 1$ ir $x > 4 \Rightarrow (4; +\infty)$	$x < 3$ ir $x \geq -3 \Rightarrow [-3; 3)$
2	$x > -1$ ir $x \leq 6 \Rightarrow (-1; 6]$	$x \geq 0$ ir $x > -2 \Rightarrow [0; +\infty)$
3	$x \geq 3$ ir $x < 4 \Rightarrow [3; 4)$	$x \leq 2$ ir $x > -\frac{1}{2} \Rightarrow (-\frac{1}{2}; 2]$
4	Taip. $-2 \geq -2 \checkmark$ ir $-2 - 1 = -3 < 0 \checkmark$	-2 (intervalas $(-3; 2]$, mažiausias sveikasis -2)
5	$[0; 5) \Rightarrow 0; 1; 2; 3; 4 \Rightarrow$ didž. 4	$[-1; 3) \Rightarrow -1; 0; 1; 2 \Rightarrow 4$ sveikieji

Vertinimas: užd. 1, 2, 3 po 3 t. (po 1 t. už kiekvieną teisingai išspręstą nelygybę ir 1 t. už teisingą bendrą dalį); užd. 4 ir 5 po 2 t. Iš viso 13 t.

Pažymys: 13 t. $\rightarrow$ 10; 12 $\rightarrow$ 9; 11 $\rightarrow$ 8; 9–10 $\rightarrow$ 7; 8 $\rightarrow$ 6; 6–7 $\rightarrow$ 5; 5 $\rightarrow$ 4; 4 $\rightarrow$ 3; 2–3 $\rightarrow$ 2; 0–1 $\rightarrow$ 1.

Mokytoja Violeta · atsakymų raktas · „Dviejų nelygybių sistema“ · 7 klasė