



Медкарта: Барон Мурлыкенштейн фон Длиннохвостов-Пушистиков Третий, главный кот третьего подъезда

Кошка · Британская короткошёрстная голубая · 11 лет · самец · кастрирован
Вес: 5,3 кг · 16 сентября 2026

Важно знать

Аллергии

Курица, Говядина, Пыльца злаковых трав,
Некоторые антибиотики пенициллинового ряда

Хронические болезни

Хроническая болезнь почек, стадия 2 по IRIS,
Гипертиреоз, Артроз локтевых суставов

Принимает сейчас

Ипакитине · 1 мерная ложка на 5 кг веса с каждым кормлением, 28 июня – 26 октября; Метимазол · 2,5 мг два раза в день, постоянно с 29 мая; Семинтра · 1 мл раствора внутрь один раз в день утром, вместе с небольшим количеством корма, строго в одно и то же время, постоянно с 10 марта; Ренальный лечебный корм · Постоянно, вместо обычного, постоянно с 30 ноября 2025

Прививки

Болезнь	Последняя	Препарат	Следующая
Панлейкопения	01.10.2025	Нобивак Tricat Trio — комплексная вакцина против панлейкопении, калицивируса и ринотрахеита	—
Калицивироз	01.10.2025	Нобивак Tricat Trio — комплексная вакцина против панлейкопении, калицивируса и ринотрахеита	—
Ринотрахеит	01.10.2025	Нобивак Tricat Trio — комплексная вакцина против панлейкопении, калицивируса и ринотрахеита	—
Бешенство	21.10.2025	Нобивак Rabies	—
Лейкоз	03.02.2025	Пуревакс FeLV	—
Хламидиоз	19.01.2026	Фелоцел CVR-C с компонентом против хламидиоза	—

Паразиты

Цель	Последняя обработка	Препарат	Следующая
Блохи и клещи	12.08.2026	Стронгхолд Плюс	—
Глисты	06.09.2026	Профендер	—

Визиты за последний год

Дата / вид	Диагноз	Назначения
29.08.2026 · Визит к врачу · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Артроз локтевых суставов	Препарат 1 после визита 24 — Семинтра — По схеме врача; Препарат 2 после визита 24 — Ипакитине — По схеме врача; Препарат 3 после визита 24 — Метимазол — По схеме врача; Препарат 4 после визита 24 — Мелоксидил — По схеме врача
15.08.2026 · Анализы · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Хроническая болезнь почек, стадия 2 по IRIS, с умеренной протеинурией и артериальной гипертензией; рекомендовано наблюдение нефролога каждые три месяца, контроль креатинина, SDMA и соотношения белок/креатинин в моче, ограничение фосфора в рационе и повторное измерение давления через две недели после начала терапии. Амоксициллинклавуланатсуспензия для перорального Амоксициллинклавуланатсуспензия для перорального	Препарат 1 после визита 23 — Семинтра — По схеме врача; Препарат 2 после визита 23 — Ипакитине — По схеме врача; Препарат 3 после визита 23 — Метимазол — По схеме врача
01.08.2026 · Болезнь · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Гипертиреоз, подбор дозы	Препарат 1 после визита 22 — Семинтра — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 2 после визита 22 — Ипакитине — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники
18.07.2026 · Осмотр · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Обострение хронической болезни почек	Препарат 1 после визита 21 — Семинтра — По схеме врача
04.07.2026 · Визит к врачу · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Зубной камень, гингивит	Препарат 1 после визита 20 — Семинтра — По схеме врача; Препарат 2 после визита 20 — Ипакитине — По схеме врача; Препарат 3 после визита 20 — Метимазол — По схеме врача; Препарат 4 после визита 20 — Мелоксидил — По схеме врача


Дата / вид	Диагноз	Назначения
20.06.2026 · Анализы · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Артроз локтевых суставов	Препарат 1 после визита 19 — Семинтра — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 2 после визита 19 — Ипакитине — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 3 после визита 19 — Метимазол — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники
06.06.2026 · Болезнь · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Хроническая болезнь почек, стадия 2 по IRIS, с умеренной протеинурией и артериальной гипертензией; рекомендовано наблюдение нефролога каждые три месяца, контроль креатинина, SDMA и соотношения белок/креатинин в моче, ограничение фосфора в рационе и повторное измерение давления через две недели после начала терапии. Амоксициллинклавуланатсuspензия для перорального Амоксициллинклавуланатсuspензия для перорального	Препарат 1 после визита 18 — Семинтра — По схеме врача; Препарат 2 после визита 18 — Ипакитине — По схеме врача
23.05.2026 · Осмотр · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Гипертиреоз, подбор дозы	Препарат 1 после визита 17 — Семинтра — По схеме врача
09.05.2026 · Визит к врачу · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Обострение хронической болезни почек	Препарат 1 после визита 16 — Семинтра — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 2 после визита 16 — Ипакитине — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 3 после визита 16 — Метимазол — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 4 после визита 16 — Мелоксидил — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники

Дата / вид	Диагноз	Назначения
25.04.2026 · Анализы · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Зубной камень, гингивит	Препарат 1 после визита 15 — Семинтра — По схеме врача; Препарат 2 после визита 15 — Ипакитине — По схеме врача; Препарат 3 после визита 15 — Метимазол — По схеме врача
11.04.2026 · Болезнь · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Артроз локтевых суставов	Препарат 1 после визита 14 — Семинтра — По схеме врача; Препарат 2 после визита 14 — Ипакитине — По схеме врача
28.03.2026 · Осмотр · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Хроническая болезнь почек, стадия 2 по IRIS, с умеренной протеинурией и артериальной гипертензией; рекомендовано наблюдение нефролога каждые три месяца, контроль креатинина, SDMA и соотношения белок/креатинин в моче, ограничение фосфора в рационе и повторное измерение давления через две недели после начала терапии. Амоксициллинклавуланатсуспензия для перорального Амоксициллинкла вуланатсуспензия для перорального	Препарат 1 после визита 13 — Семинтра — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники
14.03.2026 · Визит к врачу · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Гипертиреоз, подбор дозы	Препарат 1 после визита 12 — Семинтра — По схеме врача; Препарат 2 после визита 12 — Ипакитине — По схеме врача; Препарат 3 после визита 12 — Метимазол — По схеме врача; Препарат 4 после визита 12 — Мелоксидил — По схеме врача
28.02.2026 · Анализы · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Обострение хронической болезни почек	Препарат 1 после визита 11 — Семинтра — По схеме врача; Препарат 2 после визита 11 — Ипакитине — По схеме врача; Препарат 3 после визита 11 — Метимазол — По схеме врача
14.02.2026 · Болезнь · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Зубной камень, гингивит	Препарат 1 после визита 10 — Семинтра — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 2 после визита 10 — Ипакитине — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники
31.01.2026 · Осмотр · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Артроз локтевых суставов	Препарат 1 после визита 9 — Семинтра — По схеме врача

Дата / вид	Диагноз	Назначения
17.01.2026 · Визит к врачу · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Хроническая болезнь почек, стадия 2 по IRIS, с умеренной протеинурией и артериальной гипертензией; рекомендовано наблюдение нефролога каждые три месяца, контроль креатинина, SDMA и соотношения белок/креатинин в моче, ограничение фосфора в рационе и повторное измерение давления через две недели после начала терапии. Амоксициллинклавуланатсуспензия для перорального Амоксициллинклавуланатсуспензия для перорального	Препарат 1 после визита 8 – Семинтра – По схеме врача; Препарат 2 после визита 8 – Ипакитине – По схеме врача; Препарат 3 после визита 8 – Метимазол – По схеме врача; Препарат 4 после визита 8 – Мелоксидил – По схеме врача
03.01.2026 · Анализы · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Гипертиреоз, подбор дозы	Препарат 1 после визита 7 – Семинтра – По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 2 после визита 7 – Ипакитине – По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 3 после визита 7 – Метимазол – По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники
20.12.2025 · Болезнь · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Обострение хронической болезни почек	Препарат 1 после визита 6 – Семинтра – По схеме врача; Препарат 2 после визита 6 – Ипакитине – По схеме врача
06.12.2025 · Осмотр · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Зубной камень, гингивит	Препарат 1 после визита 5 – Семинтра – По схеме врача
22.11.2025 · Визит к врачу · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Артроз локтевых суставов	Препарат 1 после визита 4 – Семинтра – По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 2 после визита 4 – Ипакитине – По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 3 после визита 4 – Метимазол – По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 4 после визита 4 – Мелоксидил – По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники

Дата / вид	Диагноз	Назначения
08.11.2025 · Анализы · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Хроническая болезнь почек, стадия 2 по IRIS, с умеренной протеинурией и артериальной гипертензией; рекомендовано наблюдение нефролога каждые три месяца, контроль креатинина, SDMA и соотношения белок/креатинин в моче, ограничение фосфора в рационе и повторное измерение давления через две недели после начала терапии. Амоксициллинклавуланатсуспензия для перорального Амоксициллинклавуланатсуспензия для перорального	Амоксициллинклавуланатсуспензия для перорального — По схеме врача; Препарат 2 после визита 3 — Ипакитине — По схеме врача; Препарат 3 после визита 3 — Метимазол — По схеме врача
25.10.2025 · Болезнь · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Гипертиреоз, подбор дозы	Препарат 1 после визита 2 — Семинтра — По схеме врача; Препарат 2 после визита 2 — Ипакитине — По схеме врача
11.10.2025 · Осмотр · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Обострение хронической болезни почек	Препарат 1 после визита 1 — Семинтра — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники

Вес



16 сентября — 5,3 кг

28 июля — 5,4 кг · 29 мая — 5,5 кг · 10 марта — 5,6 кг · 30 ноября 2025 — 5,8 кг

Последние проверки

Домашний уход

23 сентября 2026

Чихает второй день, выделения из носа прозрачные

Срочно

14 сентября 2026

Рвота трижды за сутки, отказ от еды со вчерашнего вечера, вялый

Наблюдаем

27 августа 2026

Стал больше пить и чаще ходить в лоток, аппетит сохранён, вес немного снизился за последний месяц

Составлено владельцем в «Лапке» 26 сентября 2026. Не является ветеринарным документом.