



Медкарта: Барон Мурлыкенштейн фон Длиннохвостов-Пушистиков Третий, главный кот третьего подъезда

Составлено владельцем в «Лапке» 27 сентября 2026. Не является ветеринарным документом.

Кошка · Британская короткошёрстная голубая · 11 лет · самец · кастрирован
Вес: 5,3 кг · 17 сентября 2026

Важно знать

Аллергии: Курица, Говядина, Пыльца злаковых трав, Некоторые антибиотики пенициллинового ряда
Хронические болезни: Хроническая болезнь почек, стадия 2 по IRIS, Гипертиреоз, Артроз локтевых суставов

Принимает сейчас: Ипакитине · 1 мерная ложка на 5 кг веса с каждым кормлением, 29 июня – 27 октября; Метимазол · 2,5 мг два раза в день, постоянно с 30 мая; Семинтра · 1 мл раствора внутрь один раз в день утром, вместе с небольшим количеством корма, строго в одно и то же время, постоянно с 11 марта; Ренальный лечебный корм · Постоянно, вместо обычного, постоянно с 1 декабря 2025

Прививки

Болезнь	Последняя	Препарат	Следующая
Панлейкопения	02.10.2025	Нобивак Tricat Trio — комплексная вакцина против панлейкопении, калицивироза и ринотрахеита	—
Калицивироз	02.10.2025	Нобивак Tricat Trio — комплексная вакцина против панлейкопении, калицивироза и ринотрахеита	—
Ринотрахеит	02.10.2025	Нобивак Tricat Trio — комплексная вакцина против панлейкопении, калицивироза и ринотрахеита	—
Бешенство	22.10.2025	Нобивак Rabies	—
Лейкоз	04.02.2025	Пуревакс FeLV	—
Хламидиоз	20.01.2026	Фелоцел CVR-C с компонентом против хламидиоза	—

Паразиты

Цель	Последняя обработка	Препарат	Следующая
Блохи и клещи	13.08.2026	Стронгхолд Плюс	—
Глисты	07.09.2026	Профендер	—

Визиты за последний год

Дата / вид	Диагноз	Назначения
30.08.2026 · Визит к врачу · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Артроз локтевых суставов	Препарат 1 после визита 24 — Семинтра — По схеме врача; Препарат 2 после визита 24 — Ипакитине — По схеме врача; Препарат 3 после визита 24 — Метимазол — По схеме врача; Препарат 4 после визита 24 — Мелоксидил — По схеме врача
16.08.2026 · Анализы · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Хроническая болезнь почек, стадия 2 по IRIS, с умеренной протеинурией и артериальной гипертензией; рекомендовано наблюдение нефролога каждые три месяца, контроль креатинина, SDMA и соотношения белок/креатинин в моче, ограничение фосфора в рационе и повторное измерение давления через две недели после начала терапии. Амоксициллинклавуланатсуспензия для перорального Амоксициллинклавуланатсуспензия для перорального	Препарат 1 после визита 23 — Семинтра — По схеме врача; Препарат 2 после визита 23 — Ипакитине — По схеме врача; Препарат 3 после визита 23 — Метимазол — По схеме врача
02.08.2026 · Болезнь · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Гипертиреоз, подбор дозы	Препарат 1 после визита 22 — Семинтра — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 2 после визита 22 — Ипакитине — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники
19.07.2026 · Осмотр · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Обострение хронической болезни почек	Препарат 1 после визита 21 — Семинтра — По схеме врача
05.07.2026 · Визит к врачу · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Зубной камень, гингивит	Препарат 1 после визита 20 — Семинтра — По схеме врача; Препарат 2 после визита 20 — Ипакитине — По схеме врача; Препарат 3 после визита 20 — Метимазол — По схеме врача; Препарат 4 после визита 20 — Мелоксидил — По схеме врача
21.06.2026 · Анализы · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Артроз локтевых суставов	Препарат 1 после визита 19 — Семинтра — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 2 после визита 19 — Ипакитине — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 3 после визита 19 — Метимазол — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники


Дата / вид	Диагноз	Назначения
07.06.2026 · Болезнь · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Хроническая болезнь почек, стадия 2 по IRIS, с умеренной протеинурией и артериальной гипертензией; рекомендовано наблюдение нефролога каждые три месяца, контроль креатинина, SDMA и соотношения белок/креатинин в моче, ограничение фосфора в рационе и повторное измерение давления через две недели после начала терапии. Амоксициллинклавуланатсуспензия для перорального Амоксициллинклавуланатсуспензия для перорального	Препарат 1 после визита 18 — Семинтра — По схеме врача; Препарат 2 после визита 18 — Ипакитине — По схеме врача
24.05.2026 · Осмотр · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Гипертиреоз, подбор дозы	Препарат 1 после визита 17 — Семинтра — По схеме врача
10.05.2026 · Визит к врачу · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Обострение хронической болезни почек	Препарат 1 после визита 16 — Семинтра — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 2 после визита 16 — Ипакитине — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 3 после визита 16 — Метимазол — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 4 после визита 16 — Мелоксидил — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники
26.04.2026 · Анализы · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Зубной камень, гингивит	Препарат 1 после визита 15 — Семинтра — По схеме врача; Препарат 2 после визита 15 — Ипакитине — По схеме врача; Препарат 3 после визита 15 — Метимазол — По схеме врача
12.04.2026 · Болезнь · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Артроз локтевых суставов	Препарат 1 после визита 14 — Семинтра — По схеме врача; Препарат 2 после визита 14 — Ипакитине — По схеме врача

Дата / вид	Диагноз	Назначения
29.03.2026 · Осмотр · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Хроническая болезнь почек, стадия 2 по IRIS, с умеренной протеинурией и артериальной гипертензией; рекомендовано наблюдение нефролога каждые три месяца, контроль креатинина, SDMA и соотношения белок/креатинин в моче, ограничение фосфора в рационе и повторное измерение давления через две недели после начала терапии. Амоксициллинклавуланатсуспензия для перорального Амоксициллинклавуланатсуспензия для перорального	Препарат 1 после визита 13 – Семинтра – По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники
15.03.2026 · Визит к врачу · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Гипертиреоз, подбор дозы	Препарат 1 после визита 12 – Семинтра – По схеме врача; Препарат 2 после визита 12 – Ипакитине – По схеме врача; Препарат 3 после визита 12 – Метимазол – По схеме врача; Препарат 4 после визита 12 – Мелоксидил – По схеме врача
01.03.2026 · Анализы · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Обострение хронической болезни почек	Препарат 1 после визита 11 – Семинтра – По схеме врача; Препарат 2 после визита 11 – Ипакитине – По схеме врача; Препарат 3 после визита 11 – Метимазол – По схеме врача
15.02.2026 · Болезнь · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Зубной камень, гингивит	Препарат 1 после визита 10 – Семинтра – По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 2 после визита 10 – Ипакитине – По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники
01.02.2026 · Осмотр · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Артроз локтевых суставов	Препарат 1 после визита 9 – Семинтра – По схеме врача
18.01.2026 · Визит к врачу · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Хроническая болезнь почек, стадия 2 по IRIS, с умеренной протеинурией и артериальной гипертензией; рекомендовано наблюдение нефролога каждые три месяца, контроль креатинина, SDMA и соотношения белок/креатинин в моче, ограничение фосфора в рационе и повторное измерение давления через две недели после начала терапии. Амоксициллинклавуланатсуспензия для перорального Амоксициллинклавуланатсуспензия для перорального	Препарат 1 после визита 8 – Семинтра – По схеме врача; Препарат 2 после визита 8 – Ипакитине – По схеме врача; Препарат 3 после визита 8 – Метимазол – По схеме врача; Препарат 4 после визита 8 – Мелоксидил – По схеме врача

Дата / вид	Диагноз	Назначения
04.01.2026 · Анализы · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Гипертиреоз, подбор дозы	Препарат 1 после визита 7 — Семинтра — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 2 после визита 7 — Ипакитине — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 3 после визита 7 — Метимазол — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники
21.12.2025 · Болезнь · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Обострение хронической болезни почек	Препарат 1 после визита 6 — Семинтра — По схеме врача; Препарат 2 после визита 6 — Ипакитине — По схеме врача
07.12.2025 · Осмотр · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Зубной камень, гингивит	Препарат 1 после визита 5 — Семинтра — По схеме врача
23.11.2025 · Визит к врачу · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Артроз локтевых суставов	Препарат 1 после визита 4 — Семинтра — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 2 после визита 4 — Ипакитине — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 3 после визита 4 — Метимазол — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 4 после визита 4 — Мелоксидил — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники
09.11.2025 · Анализы · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Хроническая болезнь почек, стадия 2 по IRIS, с умеренной протеинурией и артериальной гипертензией; рекомендовано наблюдение нефролога каждые три месяца, контроль креатинина, SDMA и соотношения белок/креатинин в моче, ограничение фосфора в рационе и повторное измерение давления через две недели после начала терапии. Амоксициллинклавуланатсуспензия для перорального Амоксициллинклавуланатсуспензия для перорального	Амоксициллинклавуланатсуспензия для перорального Амоксициллинклавуланатсуспензия для перорального — По схеме врача; Препарат 2 после визита 3 — Ипакитине — По схеме врача; Препарат 3 после визита 3 — Метимазол — По схеме врача

Дата / вид	Диагноз	Назначения
26.10.2025 · Болезнь · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Гипертиреоз, подбор дозы	Препарат 1 после визита 2 — Семинтра — По схеме врача; Препарат 2 после визита 2 — Ипакитине — По схеме врача
12.10.2025 · Осмотр · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой	Обострение хронической болезни почек	Препарат 1 после визита 1 — Семинтра — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники

Вес



17 сентября — 5,3 кг
29 июля — 5,4 кг · 30 мая — 5,5 кг · 11 марта — 5,6 кг · 1 декабря 2025 — 5,8 кг

Последние проверки

- 24 сентября 2026 · Домашний уход · Чихает второй день, выделения из носа прозрачные
- 15 сентября 2026 · Срочно · Рвота трижды за сутки, отказ от еды со вчерашнего вечера, вялый
- 28 августа 2026 · Наблюдаем · Стал больше пить и чаще ходить в лоток, аппетит сохранён, вес...