

Epidemiologi og risiko

MS begynder oftest i 20-40-årsalderen og rammer hyppigere kvinder.

Tidligere Epstein-Barr-virusinfektion, rygning og en nær slægtning med MS er forbundet med øget risiko. En risikofaktor er ikke en sikker forudsigelse for den enkelte.

KILDEGRUNDLAG

NIH / MedlinePlus - Multiple Sclerosis

What causes multiple sclerosis? Opdateret 17. september 2026.

<https://medlineplus.gov/multiplesclerosis.html>

Lokalt forfattet sammenfatning, ikke officielle slides. Sidehenvisningerne i kortene gælder dette dokument.

Mekanisme og forløb

MS rammer centralnervesystemet: hjernen og rygmarven. Immunsystemets angreb på myelin, nervefibrenes beskyttende skede, kan forsinke eller blokere signaloverførsel.

Attakvis MS (RRMS) veksler mellem angreb og bedring. Sekundær progressiv MS følger et tidligere angrebst forløb med gradvis forværring. Primær progressiv MS (PPMS) forværres gradvist fra begyndelsen uden tydelige angreb.

KILDEGRUNDLAG

NIH / NCCIH - Multiple Sclerosis

Indledning om mekanisme. November 2019; gamle prævalenstal anvendes ikke.

<https://www.nccih.nih.gov/health/multiple-sclerosis>

MedlinePlus Medical Encyclopedia - Multiple sclerosis

Causes; Exams and Tests. Lægefagligt revideret 27. januar 2026.

<https://medlineplus.gov/ency/article/000737.htm>

Lokalt forfattet sammenfatning, ikke officielle slides. Sidehenvisningerne i kortene gælder dette dokument.

Fra symptomer til diagnose

Typiske symptombilleder er smertefuld synsnedsættelse på ét øje, dobbeltsyn og opadstigende føleforstyrrelser eller kraftnedsættelse.

Diagnosen kræver samlet vurdering af sygehistorie, neurologisk undersøgelse, MR og relevante laboratoriefund samt udelukkelse af andre forklaringer. MR kan vise forandringer i hjernen og rygmarven.

NICE anbefaler de reviderede McDonald-kriterier fra 2024, ikke alene kriterierne fra 2017.

KILDEGRUNDLAG

NICE NG220 - Recommendations

1.1.1; 1.1.6. Opdateret 3. juni 2026.

<https://www.nice.org.uk/guidance/ng220/chapter/Recommendations>

NIH / MedlinePlus - Multiple Sclerosis

How is multiple sclerosis diagnosed?

<https://medlineplus.gov/multiplesclerosis.html>

Lokalt forfattet sammenfatning, ikke officielle slides. Sidehenvisningerne i kortene gælder dette dokument.

Attak og behandling

NICE definerer et attak ved nye eller forværrede symptomer over 24 timer, uden infektion eller anden årsag, efter mindst én stabil måned. Behandlingsbehovet vurderes særskilt.

Langsigtet behandling kan begrænse sygdomsaktivitet, lindre symptomer og støtte daglig funktion. Sygdomsmodificerende medicin, symptomrettet medicin samt fysio- og ergoterapi har forskellige mål.

KILDEGRUNDLAG

NICE NG220 - Recommendations

1.7.1; 1.7.2; 1.7.6.

<https://www.nice.org.uk/guidance/ng220/chapter/Recommendations>

NIH / MedlinePlus - Multiple Sclerosis

What are the treatments for multiple sclerosis?

<https://medlineplus.gov/multiplesclerosis.html>

Lokalt forfattet sammenfatning, ikke officielle slides. Sidehenvisningerne i kortene gælder dette dokument.

MCQ-scenariet er lokalt skrevet uden patientdata. Testpakken er ikke individuel behandlingsvejledning.