| | |
|---|---|
| **Commencé le** | jeudi 22 octobre 2026, 18:47 |
| **État** | Terminée |
| **Terminé le** | lundi 26 octobre 2026, 08:59 |
| **Temps mis** | 3 jours 15 heures |
| **Points** | 6,10/16,00 |
| **Note** | **7,63** sur 20,00 (**38,13**%) |

**Question 1**

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

**Concernant la variabilité de l'effet des médicaments :**

- a. On retrouve des variabilités interindividuelles.
- b. Elle peut être due à des interactions médicamenteuses.
- c. Elle augmente de façon proportionnelle à l'âge.
- d. On retrouve l'impact de la consommation d'alcool et de tabac.
- e. Elle dépend uniquement du fond génétique de l'individu.

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : On retrouve des variabilités interindividuelles., Elle peut être due à des interactions médicamenteuses., On retrouve l'impact de la consommation d'alcool et de tabac.

---

**Question 2**

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

**Concernant la variabilité de l'effet des médicaments :**

- a. Les modifications des fonctions rénales impliquent une adaptation de posologie chez le sujet âgé.
- b. La demi-vie plasmatique des médicaments chez le sujet âgé est augmentée par rapport à l'adulte jeune.
- c. Une hypoalbuminémie peut être associée à une toxicité des AVK.
- d. La bioactivation hépatique du clopidogrel est minorée en cas de consommation de jus de pamplemousse.
- e. Le volume de distribution des médicaments liposolubles est diminué chez l'insuffisant rénal.

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Les modifications des fonctions rénales impliquent une adaptation de posologie chez le sujet âgé., La demi-vie plasmatique des médicaments chez le sujet âgé est augmentée par rapport à l'adulte jeune., Une hypoalbuminémie peut être associée à une toxicité des AVK., La bioactivation hépatique du clopidogrel est minorée en cas de consommation de jus de pamplemousse.

---

**Question 3**

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Le jour de ses 16 ans, le Petit Chaperon Rouge emmène sa grand-mère de 80 ans se promener dans la campagne. Elles passent une journée agréable dans un champ. Or, il s'avère que ce champ a été traité la veille par un épandage d'herbicides. La jeune fille reste en pleine forme mais sa grand-mère est atteinte de nausées et vomissements durant 3 jours. Parmi les propositions suivantes, quelle(s) hypothèse(s) peut ou peuvent expliquer cette variabilité de l'effet de l'exposition aux herbicides ?

- a. Les organes de détoxification du Petit Chaperon Rouge sont immatures et ne prennent pas en charge les herbicides.
- b. La grand-mère suit un traitement médicamenteux inhibiteur d'enzymes hépatiques.
- c. La grand-mère présente une insuffisance rénale.
- d. La jeune fille présente une mutation oncogénétique de résistance aux herbicides.
- e. La grand-mère présente une perméabilité de la barrière hématoencéphalique.

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : La grand-mère suit un traitement médicamenteux inhibiteur d'enzymes hépatiques., La grand-mère présente une insuffisance rénale., La grand-mère présente une perméabilité de la barrière hématoencéphalique.

---

**Question 4**

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

**Le suivi thérapeutique pharmacologique d'un médicament peut être indiqué :**

- a. pour améliorer l'efficacité d'un traitement.
- b. pour diminuer la toxicité d'un traitement.
- c. si la relation dose-concentration présente une grande variabilité inter-individuelle.
- d. pour les médicaments à marge thérapeutique étroite.
- e. si la réponse pharmacologique est difficilement accessible par une mesure de l'effet thérapeutique.

La réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : pour améliorer l'efficacité d'un traitement., pour diminuer la toxicité d'un traitement., si la relation dose-concentration présente une grande variabilité inter-individuelle., pour les médicaments à marge thérapeutique étroite., si la réponse pharmacologique est difficilement accessible par une mesure de l'effet thérapeutique.

---

**Question 5**

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

**Concernant la pharmacocinétique chez le nouveau-né par rapport à l'adulte jeune :**

- a. Tous les médicaments peuvent être administré si la posologie est adaptée au poids en mg/Kg.
- b. La phase de biotransformation métabolique est généralement augmentée.
- c. La fonction rénale est immature, ce qui entraine un risque de surdosage.
- d. Le volume de distribution Vd est augmenté.
- e. Les demi-vies t1/2 d'élimination des médicaments sont augmentées.

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : La fonction rénale est immature, ce qui entraine un risque de surdosage., Le volume de distribution Vd est augmenté., Les demi-vies t1/2 d'élimination des médicaments sont augmentées.

---

**Question 6**

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Madame P. a 80 ans, elle est admise à l'hôpital pour réaliser un suivis thérapeutique pharmacologique de son traitement antiarythmiques. Les résultats montrent une concentration plasmatique trop élevée. Parmi les propositions suivantes, lesquelles peuvent être considérées comme des facteurs de risques de surdosage ?

- a. La polymédication
- b. L'insuffisance rénale
- c. Une mauvaise observance
- d. L'insuffisance hépatique
- e. L'épaisseur de la peau

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : La polymédication, L'insuffisance rénale, Une mauvaise observance, L'insuffisance hépatique

---

**Question 7**

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

**Concernant l'effet des médicaments, il peut présenter des variabilités :**

- [x] a. Interindividuelles
- [x] b. Intra-individuelles
- [x] c. D'ordre pharmacocinétiques
- [x] d. D'origine génétique
- [x] e. Dues à des interactions médicamenteuses

La réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : Interindividuelles, Intra-individuelles, D'ordre pharmacocinétiques, D'origine génétique, Dues à des interactions médicamenteuses

---

**Question 8**

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant la pharmacogénétique :

- [x] a. Elle s'intéresse aux polymorphisme des gènes codant des enzymes impliquées dans la pharmacocinétique des médicaments.
- [x] b. Elle s'intéresse aux pathologies liées aux mutations géniques d'enzymes.
- [x] c. Les sujets dits métaboliseurs lents, pour un Cytochrome P450 impliqué dans l'élimination d'un médicament, présentent un risque de toxicité accru.
- [x] d. Les métaboliseurs ultrarapides présentent entre autres un nombre excessif d'allèles sauvages de gènes codant des CYP450.
- [x] e. Les métaboliseurs dits ultrarapides présentent des mutations réduisant l'activité catalytique de CYP450.

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Elle s'intéresse aux polymorphisme des gènes codant des enzymes impliquées dans la pharmacocinétique des médicaments., Les sujets dits métaboliseurs lents, pour un Cytochrome P450 impliqué dans l'élimination d'un médicament, présentent un risque de toxicité accru., Les métaboliseurs ultrarapides présentent entre autres un nombre excessif d'allèles sauvages de gènes codant des CYP450.

---

**Question 9**

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant la variabilité de l'effet des médicaments liée aux enzymes du métabolisme :

- a. On parle de métaboliseurs lents.
- b. On parle de métaboliseurs anormaux.
- c. On parle de métaboliseurs rapides.
- d. On parle de l'effet inhibiteur enzymatique du tabac.
- e. On parle de l'effet inhibiteur enzymatique du jus de pamplemousse.

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : On parle de métaboliseurs lents., On parle de métaboliseurs rapides., On parle de l'effet inhibiteur enzymatique du jus de pamplemousse.

---

**Question 10**

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

**Concernant le suivi pharmacologique thérapeutique, il concerne :**

- a. Certains antibiotiques
- b. Les anticoagulant par voie orale de type AVK
- c. Les anti-hypertenseurs de type bétabloquants
- d. Les médicaments immunosuppresseurs
- e. Les antalgiques antiinflammatoires

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Certains antibiotiques, Les médicaments immunosuppresseurs

---

**Question 11**

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Concernant les essais précliniques :

- [x] a. L'éthique animale recommande les 3 R : réduire, raffiner et remplacer.
- [x] b. La toxicité à dose réitérées évalue l'aptitude du produit à présenter une toxicité sur le long terme.
- [x] c. Le test d'Ames vise à mettre en évidence l'effet mutagène.
- [x] d. La toxicité aiguë évalue l'aptitude du produit à s'accumuler dans les tissus.
- [x] e. Ils consistent entre autres à étudier la reprotoxicité (effet sur la reproduction et la fertilité).

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : L'éthique animale recommande les 3 R : réduire, raffiner et remplacer., La toxicité à dose réitérées évalue l'aptitude du produit à présenter une toxicité sur le long terme., Le test d'Ames vise à mettre en évidence l'effet mutagène., Ils consistent entre autres à étudier la reprotoxicité (effet sur la reproduction et la fertilité).

---

**Question 12**

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

**Concernant les essais cliniques de phase I :**

- [x] a. Ils étudient la tolérance à un principe actif.
- [x] b. Ils peuvent être réalisés sur des étudiants lorsqu'ils sont malades.
- [x] c. Ils sont réalisés de préférences sur des sujets sains.
- [x] d. Ils permettent de déterminer l'efficacité d'un médicament.
- [ ] e. Ils s'articulent principalement sur des études comparatives.

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Ils étudient la tolérance à un principe actif., Ils sont réalisés de préférences sur des sujets sains.

---

**Question 13**

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

**Concernant les essais cliniques de phase II :**

- a. Il s'agit généralement de la première administration du médicament à des sujets malades.
- b. Ils permettent de vérifier l'effet pharmacologique attendu d'un médicament en situation pathologique.
- c. Ils permettent de déterminer la posologie d'un candidat médicament.
- d. Ils permettent d'évaluer le rapport bénéfice risque d'un candidat médicament.
- e. Ils étudient les variabilités entre personnes de tranches d'âge différent.

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Il s'agit généralement de la première administration du médicament à des sujets malades., Ils permettent de vérifier l'effet pharmacologique attendu d'un médicament en situation pathologique., Ils permettent de déterminer la posologie d'un candidat médicament.

---

**Question 14**

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

**Concernant les essais cliniques de phase III :**

- a. Ils permettent de déterminer l'efficacité d'un médicament.
- b. Ils précèdent les essais cliniques de phase II.
- c. Ils reposent obligatoirement sur un critère de jugement composite.
- d. Ils s'articulent principalement sur des études comparatives randomisées.
- e. Ils sont réalisés après l'obtention de l'AMM.

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Ils permettent de déterminer l'efficacité d'un médicament. , Ils s'articulent principalement sur des études comparatives randomisées.

---

**Question 15**

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

**Concernant la communication de l'industrie pharmaceutique :**

- a. L'objectif principal des visiteurs médicaux est de fournir des informations scientifiques neutres sur les médicaments.
- b. Les visiteurs médicaux présentent toujours des rapports d'essais cliniques complets.
- c. Les visiteurs médicaux proposent des échantillons gratuits de médicaments.
- d. Le praticien doit analyser la manière dont les données sont présentées dans les brochures proposées par les visiteurs médicaux (risque relatif versus risque absolu).
- e. Les stratégies de communication de l'industrie pharmaceutique présentent un risque d'influencer les décisions médicales au détriment de l'intérêt du patient.

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Les visiteurs médicaux proposent des échantillons gratuits de médicaments., Le praticien doit analyser la manière dont les données sont présentées dans les brochures proposées par les visiteurs médicaux (risque relatif versus risque absolu)., Les stratégies de communication de l'industrie pharmaceutique présentent un risque d'influencer les décisions médicales au détriment de l'intérêt du patient.

---

**Question 16**

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

**A propos de la toxicité associée à la prise de paracétamol :**

- a. Le métabolite toxique du paracétamol est le N-Acétyl-Parabenzo-Quinone-Imine (NAPQI).
- b. La toxicité est augmentée en cas de prise aiguë d'alcool.
- c. La détoxification implique la glutathion S transférase.
- d. Le métabolisme du paracétamol implique sa biotransformation en métabolites sulfo- ou glucurono-conjugués
- e. Les métabolites toxiques du paracétamol induisent une cytolyse hépatique.

La réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : Le métabolite toxique du paracétamol est le N-Acétyl-Parabenzo-Quinone-Imine (NAPQI)., La toxicité est augmentée en cas de prise aiguë d'alcool., La détoxification implique la glutathion S transférase., Le métabolisme du paracétamol implique sa biotransformation en métabolites sulfo- ou glucurono-conjugués, Les métabolites toxiques du paracétamol induisent une cytolyse hépatique.