Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 07:10
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 07:11
Temps mis	1 min 28 s
Points	1,50/8,00
Note	**3,75** sur 20,00 (**18,75**%)

Question 1

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant la réaction inflammatoire:

- a. Elle peut être liée à des pathologies dysimmunitaires.
- b. Elle peut être causée par un défaut de vascularisation des tissus.
- c. Elle est toujours localisée.
- d. Les réactions inflammatoires chroniques font toujours suite à une réaction inflammatoire aigüe intense.
- e. Elle fait intervenir dans un premier temps des facteurs cellulaires puis dans un second temps des facteurs sériques.

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont :
Elle peut être liée à des pathologies dysimmunitaires., Elle peut être causée par un défaut de vascularisation des tissus.

Question 2

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

La protéine C réactive (CRP) :

- a. C'est un marqueur de la phase chronique de l'inflammation.
- b. est une opsonine.
- c. favorise la phagocytose.
- d. est d'origine thyroïdienne.
- e. voit sa synthèse inhibée sous l'action de l'interleukine 1.

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : est une opsonine., favorise la phagocytose.

Question 3

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Parmi les affirmations suivantes, la(les)quelle(s) correspond(ent) à l'œdème inflammatoire ?

- a. Il résulte d'une augmentation de la pression hydrostatique due à la vasoconstriction et à une diminution de la perméabilité des vaisseaux.
- b. L'exsudat correspond à un épanchement de liquide de nature séreuse.
- c. Les cytokines ne jouent aucun rôle dans la formation de l'œdème.
- d. Il résulte de l'activation du système immunitaire.
- e. L'œdème de Quincke est une réaction inflammatoire d'origine ischémique.

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : L'exsudat correspond à un épanchement de liquide de nature séreuse., Il résulte de l'activation du système immunitaire.

Question 4

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Parmi ces marqueurs, le(s)quel(s) fait(font) partie des PRI (Protéines de la Réaction inflammatoire) dont le taux diminue lors du déclenchement d'une réaction inflammatoire ?

- a. La protéine C-réactive (CRP)
- b. L'haptoglobine
- c. La protéine sérique amyloïde A (SAA)
- d. Le fibrinogène
- e. La transferrine

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : La transferrine

Question 5

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Concernant les réactions inflammatoires chroniques :

- [x] a. Elles peuvent durer plusieurs mois voire plusieurs années.
- [x] b. Une inflammation chronique et silencieuse est néfaste à l'organisme.
- [x] c. Elles ne sont jamais résolutives.
- [x] d. Elles peuvent persister parce qu'une infection ou une blessure n'a pas bien guéri.
- [x] e. Elles sont caractérisées par la prédominance de la fibrose.

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Elles peuvent durer plusieurs mois voire plusieurs années., Une inflammation chronique et silencieuse est néfaste à l'organisme., Elles peuvent persister parce qu'une infection ou une blessure n'a pas bien guéri., Elles sont caractérisées par la prédominance de la fibrose.

Question 6

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Remettez dans l'ordre les différentes phases associées à la réaction inflammatoire :

a. Détersion

b. Phase cellulaire

c. Phase vasculo-exsudative

d. Réparation/Cicatrisation

- [ ] a. a b c d
- [x] b. a c b d
- [ ] c. c b a d
- [ ] d. b c a d
- [ ] e. c a b d

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : c b a d

Question 7

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Parmi les cellules suivantes, laquelle (lesquelles) fait(font) partie du granulome inflammatoire ?

- [x] a. Neutrophile (PMN)
- [x] b. Macrophage
- [x] c. Lymphocyte T
- [x] d. Fibroblaste
- [x] e. Mastocyte

La réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : Neutrophile (PMN), Macrophage, Lymphocyte T, Fibroblaste, Mastocyte

---

Question 8

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Parmi les médiateurs chimiques de l'inflammation suivant, lequel(lesquels) agit(agissent) sur les récepteurs nociceptifs ?

- [x] a. IL-12
- [x] b. CRP
- [x] c. Prostaglandines
- [x] d. IL-8
- [x] e. Leucotriènes *Réponse vrai mais possiblement non clairement exposé en cours contrairement aux Prostaglandines*

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Prostaglandines, Leucotriènes