Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 07:27
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 07:28
Temps mis	1 min 8 s
Points	3,00/14,00
Note	**4,29** sur 20,00 (**21,43**%)

Question 1

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant la pathologie de l'obésité :

- a. L'obésité de grade 1 est associée à un IMC compris entre 25 et 29,99 kg/m^2 . ✖
- b. L'obésité de grade 2 est associée à un IMC compris entre 30 et 34,99 kg/m^2. ✖
- c. L'obésité de grade 3 est associée à un IMC compris entre 35 et 39,99 kg/m^2. ✖
- d. L'obésité morbide est associée à un IMC supérieur ou égal à 40 kg/m^2. ✔
- e. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte. ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : L'obésité morbide est associée à un IMC supérieur ou égal à 40 kg/m^2.

Question 2

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Les paramètres de diagnostic clinique de l'état d'obésité sont :

- a. L'IMC et l'hypercholestérolémie. ✖
- b. L'IMC et l'hypertriglycéridémie. ✖
- c. L'IMC et le tour de taille. ✔
- d. L'IMC, le tour de taille et le taux de masse grasse corporelle. ✔
- e. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : L'IMC et le tour de taille., L'IMC, le tour de taille et le taux de masse grasse corporelle.

Question 3

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant le tissu adipeux blanc :

- a. C'est son origine épithéliale qui rend compte de l'existence des dépôts graisseux sous-cutanés. ✖
- b. C'est son origine conjonctive qui rend compte de l'existence des dépôts graisseux omentaux. ✔
- c. Le tissu adipeux sous-cutané est présent au niveau abdominal ou fémoral. ✔
- d. Le tissu adipeux viscéral est situé au niveau intestinal comme l'épiploon. ✔
- e. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : C'est son origine conjonctive qui rend compte de l'existence des dépôts graisseux omentaux., Le tissu adipeux sous-cutané est présent au niveau abdominal ou fémoral., Le tissu adipeux viscéral est situé au niveau intestinal comme l'épiploon.

Question 4

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Le tissu adipeux blanc d'un patient atteint d'obésité sévère se caractérise par :

- a. Une hypertrophie adipocytaire. ✔
- b. Une hyperplasie préadipocytaire. ✔
- c. Une surproduction de leptine et de ghréline. ✖
- d. Une sous-production d'adiponectine et d'IL-10. ✔
- e. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Une hypertrophie adipocytaire., Une hyperplasie préadipocytaire., Une sous-production d'adiponectine et d'IL-10.

Question 5

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

L'adipocyte du tissu adipeux blanc d'un patient atteint d'obésité est caractérisé par :

- a. Une accumulation de vacuoles riches en acides gras, cholestérol, phospholipides. ✖
- b. Une accumulation de triglycérides induite par l'insuline. ✔
- c. Une accumulation de gouttelettes lipidiques dans la membrane cytoplasmique. ✖
- d. Une accumulation de gouttelettes lipidiques dans le cytoplasme et le noyau. ✖
- e. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte. ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Une accumulation de triglycérides induite par l'insuline.

Question 6

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Le stress oxydatif relevé dans le tissu adipeux blanc au cours de l'obésité est causé par :

- a. Une surproduction adipocytaire de peroxyde d'hydrogène. ✔
- b. Une surproduction adipocytaire d'anion superoxyde. ✔
- c. Une surproduction adipocytaire de radicaux libres. ✔
- d. Une surproduction adipocytaire d'espèces réactives de l'oxygène. ✔
- e. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Une surproduction adipocytaire de peroxyde d'hydrogène., Une surproduction adipocytaire d'anion superoxyde., Une surproduction adipocytaire de radicaux libres., Une surproduction adipocytaire d'espèces réactives de l'oxygène.

Question 7

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

A propos de la leptine :

- a. Elle exerce un effet hypophagique comme l'insuline. ✔
- b. Elle exerce l'effet inverse de la ghréline qui a une action hyperphagique. ✔
- c. Elle augmente la production de neuropeptides anorexigènes comme POMC. ✔
- d. Elle augmente la production de neuropeptides anorexigènes comme GLP-1. ✔
- e. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Elle exerce un effet hypophagique comme l'insuline., Elle exerce l'effet inverse de la ghréline qui a une action hyperphagique., Elle augmente la production de neuropeptides anorexigènes comme POMC., Elle augmente la production de neuropeptides anorexigènes comme GLP-1.

Question 8

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Le déficit congénital en leptine est associé à :

- a. Une sous-production de neuropeptides comme la neurotensine. ✔
- b. Une surproduction de neuropeptides comme le neuropeptide Y. ✔
- c. Une baisse de la captation adipocytaire de glucose par le transporteur GLUT-2. ✖
- d. Une mutation du gène adipocytaire *ob*. ✔
- e. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Une sous-production de neuropeptides comme la neurotensine., Une surproduction de neuropeptides comme le neuropeptide Y., Une mutation du gène adipocytaire *ob*.

Question 9

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant la relation entre l'adiponectine et l'obésité :

- a. Plus l'adiposité augmente plus l'adiponectinémie diminue. ✔
- b. L'adiponectine exerce un effet anti-inflammatoire comme la résistine. ✖
- c. L'adiponectine exerce un effet anti-athérogène en diminuant l'adhésion monocytaire à l'endothélium. ✔
- d. L'action de l'adiponectine est médiée par AdipoR1 et AdipoR2 qui sont des RCPG. ✔
- e. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Plus l'adiposité augmente plus l'adiponectinémie diminue., L'adiponectine exerce un effet anti-athérogène en diminuant l'adhésion monocytaire à l'endothélium., L'action de l'adiponectine est médiée par AdipoR1 et AdipoR2 qui sont des RCPG.

Question 10

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Un déficit congénital en adiponectine est associé à :

- a. Une sous-production de neuropeptides comme la neurotensine. ✖
- b. Une sous-production de neuropeptides comme POMC. ✖
- c. Une diminution de la captation adipocytaire de glucose par le transporteur GLUT-2. ✖
- d. Une élévation de la sensibilité à l'insuline des tissus adipeux blancs. ✖
- e. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte. ✔

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte.

Question 11

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant l'action de l'insuline sur les adipocytes blancs :

- a. Le récepteur membranaire de l'insuline a une activité sérine-kinase. ✖
- b. Les médiateurs intracellulaires incluent les protéines PI3K, Akt et AS160. ✔
- c. Le facteur de transcription NFκB est activé sous l'effet de l'insuline. ✖
- d. La translocation du transporteur GLUT-2 est activée sous l'effet de l'insuline. ✖
- e. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte. ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Les médiateurs intracellulaires incluent les protéines PI3K, Akt et AS160.

Question 12

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Les adipokines jouant un rôle causal dans l'insulino-résistance adipocytaire sont :

- a. IL-6 et TNF-alpha. ✔
- b. IL-6 et MCP-1. ✔
- c. TNF-alpha et MCP-1. ✔
- d. IL-6, TNF-alpha et MCP-1. ✔
- e. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : IL-6 et TNF-alpha., IL-6 et MCP-1., TNF-alpha et MCP-1., IL-6, TNF-alpha et MCP-1.

Question 13

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

La dysbiose du microbiote intestinal chez le patient atteint d'obésité est associée à :

- a. Une augmentation de la richesse en bactéries comme *Akkermansia muciniphila*. ✖
- b. Une élévation de l'endotoxémie. ✔
- c. Une hyperperméabilité intestinale causée par la baisse du taux de protéines de type occludine. ✔
- d. Une altération de la production de métabolites bactériens comme les acides gras à courte chaîne. ✔
- e. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Une élévation de l'endotoxémie., Une hyperperméabilité intestinale causée par la baisse du taux de protéines de type occludine., Une altération de la production de métabolites bactériens comme les acides gras à courte chaîne.

Question 14

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Les stratégies de prévention ou de traitement des complications de l'obésité impliquent :

- a. Une prise en charge des complications d'ordre somatique. ✔
- b. Une prise en charge des complications d'ordre psycho-social. ✔
- c. L'utilisation de probiotiques comme des bactéries du phylum *Bacteroidetes*. ✔
- d. L'utilisation de prébiotiques comme des fibres alimentaires et polyphénols végétaux. ✔
- e. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Une prise en charge des complications d'ordre somatique., Une prise en charge des complications d'ordre psycho-social., L'utilisation de probiotiques comme des bactéries du phylum *Bacteroidetes*., L'utilisation de prébiotiques comme des fibres alimentaires et polyphénols végétaux.