Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 07:29
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 07:29
Temps mis	34 s
Points	0,50/7,00
Note	**1,43** sur 20,00 (**7,14**%)

Question 1

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

A propos des **signes fonctionnels respiratoires :**

- a. La dyspnée est une sensation subjective de difficulté à respirer ou d'essoufflement expérimentée par le patient. ✔
- b. La fréquence respiratoire FR normale au repos est de 12 à 16 cycles/minute. ✔
- c. En-dessous de cette valeur de FR (12 à 16 cycles/minute), on parle de bradypnée et au-dessus de polypnée. ✖ *La majoration de FR est une tachypnée, la polypnée associe à la tachypnée une baisse du volume courant*
- d. La présence d'un tirage sus-sternal et d'un balancement thoraco-abdominal sont des signes de détresse respiratoire aiguë. ✔
- e. La mécanique ventilatoire s'évalue en mesurant la FR par l'apposition d'une main de l'examinateur sur le thorax du patient et en comptant le nombre de cycles/minutes ainsi que l'ampliation thoracique. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : La dyspnée est une sensation subjective de difficulté à respirer ou d'essoufflement expérimentée par le patient., La fréquence respiratoire FR normale au repos est de 12 à 16 cycles/minute., La présence d'un tirage sus-sternal et d'un balancement thoraco-abdominal sont des signes de détresse respiratoire aiguë., La mécanique ventilatoire s'évalue en mesurant la FR par l'apposition d'une main de l'examinateur sur le thorax du patient et en comptant le nombre de cycles/minutes ainsi que l'ampliation thoracique.

Question 2

Incorrect

Note de 0,00 sur 2,00

A propos des **foyers d'auscultation cardiaque** :

- a. Le foyer aortique se situe au 2ème espace intercostal gauche. ✖ *droit*
- b. Le foyer aortique se situe au 1er espace intercostal droit. ✖ *deuxième*
- c. Un souffle présent au foyer aortique irradie souvent vers l'aisselle. ✖ *irradie vers les carotides surtout*
- d. Le foyer mitral se situe à la pointe ou apex cardiaque. ✔
- e. Le foyer tricuspide se trouve au niveau de l'appendice xyphoïde. ✔
- f. Un souffle est caractérisé par sa présence en systole ventriculaire ou auriculaire et par son intensité. ✖ *en systole ventriculaire ou en diastole ventriculaire*
- g. Le Bruit B1 physiologique correspond à la fermeture des valves mitrale et tricuspide. ✔
- h. La diastole ventriculaire sépare le bruit B1 du bruit B2. ✖ *la systole ventriculaire*
- i. Le temps du souffle peut être déterminé par la palpation de l'onde de pouls. ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Le foyer mitral se situe à la pointe ou apex cardiaque., Le foyer tricuspide se trouve au niveau de l'appendice xyphoïde., Le Bruit B1 physiologique correspond à la fermeture des valves mitrale et tricuspide., Le temps du souffle peut être déterminé par la palpation de l'onde de pouls.

Question 3

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

A propos de l'**examen clinique sémiologique** :

- a. Sa séquence logique consiste en un recueil de données à l'interrogatoire puis un examen physique comprenant notamment l'inspection puis la palpation, une percussion éventuelle et un temps d'auscultation. ✔
- b. Les signes généraux comprennent l'asthénie qui comprend l'anorexie et l'amaigrissement et le syndrome d'altération de l'état général associés de façon variable entre eux. ✖ *Le syndrome d'AEG est défini par les 3 A = asthénie, anorexie et amaigrissement associés de façon variable*
- c. La cyanose est une coloration bleutée de la peau présente le plus souvent au niveau des lèvres ou des extrémités liée à un excès d'hémoglobine réduite (> 5 g/dl) témoin d'une dysfonction hépatique. ✖ *témoin d'une anomalie de l'hématose pulmonaire ou d'une augmentation d'extraction de l'oxygène périphérique*
- d. L'interrogatoire ciblé comprend uniquement les antécédents personnels, familiaux et les traitements et allergies éventuels. ✖ *t aussi recueillir les vaccinations, les habitudes et mode de vie, entre autres*
- e. Le degré de surcharge pondérale ou l'obésité peuvent notamment être appréciés par l'indice de masse corporelle qui nécessite simplement de peser le patient et de diviser le chiffre obtenu (en Kg) par la taille (en m^2) ✔
- f. L'interrogatoire comprend plusieurs temps essentiels : le recueil de l'anamnèse (antécédents) et le recueil de l'histoire de la maladie puis une recherche des signes fonctionnels du patient. ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Sa séquence logique consiste en un recueil de données à l'interrogatoire puis un examen physique comprenant notamment l'inspection puis la palpation, une percussion éventuelle et un temps d'auscultation., Le degré de surcharge pondérale ou l'obésité peuvent notamment être appréciés par l'indice de masse corporelle qui nécessite simplement de peser le patient et de diviser le chiffre obtenu (en Kg) par la taille (en m^2), L'interrogatoire comprend plusieurs temps essentiels : le recueil de l'anamnèse (antécédents) et le recueil de l'histoire de la maladie puis une recherche des signes fonctionnels du patient.

Question 4

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

A propos des réflexes à tester lors de l'examen physique neurologique :

- a. On peut tester des réflexes ostéotendineux et ostéo-muqueux. ✖ *et cutanéo-muqueux*
- b. Le réflexe bicipital se teste en percutant le tendon bicipital avec le marteau réflexe. La réponse observée est une extension de l'avant-bras. ✖ *une flexion de l'avant-bras*
- c. Le réflexe crémastérien entraîne une rétraction de la bourse homolatérale en réponse à une percussion du pubis. ✖ *en réponse à une stimulation du 1/3 supérieur de la face interne de la cuisse homolatérale*
- d. Le réflexe crémastérien est un réflexe ostéotendineux. ✖ *cutanéo-muqueux*
- e. Le réflexe cutané plantaire est un réflexe cutanéo-muqueux. ✔
- f. Le réflexe rotulien peut être aboli ou être au contraire vif, polycinétique et diffusée en cas d'atteinte du faisceau pyramidal. ✔
- g. Le réflexe rotulien est tout le temps pathologique lorsqu'il n'est pas présent. ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Le réflexe cutané plantaire est un réflexe cutanéo-muqueux., Le réflexe rotulien peut être aboli ou être au contraire vif, polycinétique et diffusée en cas d'atteinte du faisceau pyramidal., Le réflexe rotulien est tout le temps pathologique lorsqu'il n'est pas présent.

Question 5

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

A propos du recueil des **signes fonctionnels** :

- a. La douleur est le maître symptôme et un des motifs les plus fréquents de recours à une consultation médicale. ✔
- b. Un recueil exhaustif des caractéristiques de la douleur comprend des précisions de son siège, ses irradiations, son type et les facteurs aggravants ou calmants éventuels. ✖ *Elle comprend bien d'autres éléments (Cf moyen mnémotechnique MISTIDRACS)*
- c. Toutes les douleurs sont liées à un excès de nociception c'est-à-dire une activation des nocicepteurs en réponse à une agression tissulaire. ✖ *il existe des douleurs de désafférentation et des douleurs mixtes, dont les douleurs psychogènes*
- d. En rhumatologie, notamment, on s'attachera à distinguer les caractéristiques des douleurs d'horaire inflammatoire qui apparaissent lors des mouvements et réveillent la nuit des douleurs d'horaire mécanique. ✖ *les douleurs inflammatoires sont spontanées et non influencées par les mouvements/la mobilisation*
- e. La douleur typique de colique néphrétique se situe en fosse lombaire et irradie vers l'épigastre. Elle est à type de broiement ou de crampe et particulièrement intense. ✖ *elle irradie vers les OGE*
- f. L'intensité de la douleur peut être recueillie à condition que le patient soit conscient et en capacité de comprendre les questions. ✖ *On peut recueillir une intensité à l'aide d'échelle d'hétérodoxies-évaluation (exemple : échelle algoplus)*
- g. L'échelle visuelle analogique ou EVA fait partie des échelles d'hétérodoxies-évaluation de la douleur. ✖ *auto-évaluation*
- h. La douleur de colique hépatique siège habituellement en hypochondre droit et irradie "en bretelle" vers l'épaule et l'omoplate homolatéralement. ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : La douleur est le maître symptôme et un des motifs les plus fréquents de recours à une consultation médicale., La douleur de colique hépatique siège habituellement en hypochondre droit et irradie "en bretelle" vers l'épaule et l'omoplate homolatéralement.

Question 6

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

A propos des **facteurs de risques cardiovasculaires** :

- a. L'âge et le genre (sexe) sont les seuls facteurs de risque cardiovasculaires non modifiables. ✖ *il y a aussi les antécédents familiaux*
- b. Le tabagisme actif mais aussi passif représentent un facteur de risque cardiovasculaire identifié. ✔
- c. La dyslipidémie qui est une augmentation du cholestérol est un de ces facteurs de risques. ✖ *la dyslipidémie comprend l'hypercholestérolémie ou hypertriglycéridémie avec une augmentation du LDL ou une baisse du HDLc*
- d. La sédentarité ou absence d'activité physique est un facteur de risque cardiovasculaire modifiable à rechercher à l'anamnèse. ✔
- e. Le diabète et le fait d'avoir une hypertension artérielle sont 2 facteurs de risques cardiovasculaires supplémentaires à rechercher. ✔
- f. La présence d'évènements cardiovasculaires survenus dans la famille n'influe pas sur le risque cardiovasculaire global du patient. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Le tabagisme actif mais aussi passif représentent un facteur de risque cardiovasculaire identifié., La sédentarité ou absence d'activité physique est un facteur de risque cardiovasculaire modifiable à rechercher à l'anamnèse., Le diabète et le fait d'avoir une hypertension artérielle sont 2 facteurs de risques cardiovasculaires supplémentaires à rechercher.