Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 07:41
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 07:44
Temps mis	2 min 53 s
Points	2,30/11,00
Note	**4,18** sur 20,00 (**20,91**%)

Question 1

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant les anticholinergiques :

- a. Ce sont des antagonistes des récepteurs muscariniques. ✔
- b. Ils ont des effets parasympatholytiques. ✔
- c. Ils ont une action anti-inflammatoire. ✖
- d. Ils sont utilisés en première ligne de traitement de la crise d'asthme. ✖
- e. Leur effet bronchodilatateur est plus rapide et plus puissant que celui des beta-2-mimétiques. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Ce sont des antagonistes des récepteurs muscariniques., Ils ont des effets parasympatholytiques.

Question 2

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Dans l'alcalose métabolique, on retrouve ?

- a. Un pH bas ✖
- b. Des bicarbonates augmentés ✔
- c. Une PCO2 abaissée ✖
- d. Des bicarbonates abaissés ✖
- e. Un pH > 7,4 ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Des bicarbonates augmentés, Un pH > 7,4

Question 3

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Parmi ces propositions, quels sont les signes cliniques caractéristiques d'une hypercapnie ?

- a. Asterixis ✔
- b. Sueurs ✔
- c. Cyanose ✖
- d. Agitation ✔
- e. Céphalées ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Asterixis, Sueurs , Agitation, Céphalées

---

Question 4

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

A propos des bêta-2 mimétiques :

- a. Ce sont des agonistes des récepteurs bêta-2 adrénergiques. ✔
- b. Le formeterol est un médicament inhalé à courte durée d'action. ✖
- c. Le salbutamol est un médicament inhalé à longue durée d'action. ✖
- d. Leurs récepteurs β2 sont exprimés dans le muscle lisse bronchique. ✔
- e. Ils induisent une relaxation musculaire dans un délais de 1 à 15 minutes après prise inhalée. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Ce sont des agonistes des récepteurs bêta-2 adrénergiques., Leurs récepteurs β2 sont exprimés dans le muscle lisse bronchique., Ils induisent une relaxation musculaire dans un délais de 1 à 15 minutes après prise inhalée.

Question 5

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Donnez la(les) réponse(s) vraie(s) :

- a. Le diaphragme comprend une partie centrale musculaire et une partie périphérique tendineuse. ✖
- b. L'innervation du diaphragme se fait par les nerfs phréniques dont l'origine est cervicale. ✔
- c. En expiration, le diaphragme remonte activement. ✖
- d. Le hile pulmonaire est constitué d'une artère pulmonaire, d'une bronche souche et d'une veine pulmonaire. ✖
- e. Le poumon droit comprend 3 lobes pulmonaires (supérieur, moyen, inférieur) et le poumon gauche 2 lobes (supérieur, inférieur). ✔

La réponse n'est pas correcte.

partie centrale du diaphragme est tendineux ; le hile pulmonaire contient deux veines pulmonaires).

Les réponses correctes sont : L'innervation du diaphragme se fait par les nerfs phréniques dont l'origine est cervicale., Le poumon droit comprend 3 lobes pulmonaires (supérieur, moyen, inférieur) et le poumon gauche 2 lobes (supérieur, inférieur).

Question 6

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Parmi ces signes cliniques, lesquels permettent d'évaluer la gravité d'une détresse respiratoire aigüe ?

- a. Cyanose ✔
- b. Fréquence respiratoire ✔
- c. Respiration paradoxale ✔
- d. Confusion ✔
- e. Aucune des réponses n'est vraie ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.

Les réponses correctes sont : Cyanose, Fréquence respiratoire, Respiration paradoxale, Confusion

---

Question 7

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

A propos des médicaments bronchodilatateurs, on retrouve :

- a. Des sympathomimétiques ✔
- b. Des sympatholytiques ✖
- c. Des parasympathomimétiques ✖
- d. Des parasympatholytiques ✔
- e. Des inhibiteurs des phosphodiesterases ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Des sympathomimétiques, Des parasympatholytiques, Des inhibiteurs des phosphodiesterases

---

Question 8

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Le syndrome cave supérieur :

- a. est une gêne au retour veineux par compression extrinsèque ou thrombose de la veine cave supérieure. ✔
- b. est dans la majorité des cas d'origine tumorale. ✔
- c. associe une cyanose du visage, un œdème en pélerine, une turgescence jugulaire, une circulation veineuse collatérale et des céphalées en fin de nuit. ✔
- d. peut être lié à un envahissement du médiastin antérieur. ✔
- e. Aucune de ces propositions ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : est une gêne au retour veineux par compression extrinsèque ou thrombose de la veine cave supérieure., est dans la majorité des cas d'origine tumorale., associe une cyanose du visage, un œdème en pélerine, une turgescence jugulaire, une circulation veineuse collatérale et des céphalées en fin de nuit., peut être lié à un envahissement du médiastin antérieur.

Question 9

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Quels facteurs déterminent la compliance des voies aériennes ?

- a. La fréquence respiratoire ✖
- b. Les structures musculaires et osseuses de la cage thoracique ✔
- c. La compression dynamique des voies aériennes ✖
- d. Le parenchyme pulmonaire ✔
- e. Le muscle lisse bronchique ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Les structures musculaires et osseuses de la cage thoracique, Le parenchyme pulmonaire

---

Question 10

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant le diaphragme :

- a. Le diaphragme est un muscle strié ; il est commandé de façon automatique (la plupart du temps) ou volontaire. ✔
- b. C'est un muscle accessoire de la respiration. ✖
- c. Les fibres qui composent le diaphragme sont adaptées à un travail en endurance : 40 % d'entre elles sont de type lent. ✔
- d. Il ne participe pas à la ventilation. ✖
- e. Le contrôle nerveux du diaphragme se fait par l'intermédiaire des nerfs phréniques. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.

Les réponses correctes sont : Le diaphragme est un muscle strié ; il est commandé de façon automatique (la plupart du temps) ou volontaire., Les fibres qui composent le diaphragme sont adaptées à un travail en endurance : 40 % d'entre elles sont de type lent., Le contrôle nerveux du diaphragme se fait par l'intermédiaire des nerfs phréniques.

Question 11

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant l'oxygène :

- a. L'oxygène diffuse de façon passive à travers la membrane alvéolo capillaire. ✔
- b. La pression partielle artérielle en O_2 est un paramètre non mesurable. ✖
- c. Il est transporté dans le sang en majeure partie sous forme lié à l'hémoglobine. ✔
- d. La PaO_2 est toujours stable. ✖
- e. L'oxygène diffuse de l'alvéole vers le compartiment sanguin de façon passive. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.

Les réponses correctes sont : L'oxygène diffuse de façon passive à travers la membrane alvéolo capillaire., Il est transporté dans le sang en majeure partie sous forme lié à l'hémoglobine., L'oxygène diffuse de l'alvéole vers le compartiment sanguin de façon passive.