Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 07:50
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 07:50
Temps mis	17 s
Points	0,00/3,00
Note	**0,00** sur 20,00 (**0**%)

Question 1

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant le traitement de la crise d'asthme par les beta-2 mimétiques :

- a. Les bêta-2 mimétiques agissent principalement en bloquant les récepteurs bêta-2 au niveau des muscles lisses bronchiques. ✖
- b. Les bêta-2 mimétiques agissent principalement en induisant une relaxation des cellules des muscles lisses bronchiques. ✔
- c. Les bêta-2 mimétiques sont indiqués dans le traitement de l'exacerbation des crises aiguës. ✔
- d. Les bêta-2 mimétiques sont indiqués la réduction de l'inflammation chronique des voies respiratoires. ✖
- e. Le chef de file est l'ipratropium. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Les bêta-2 mimétiques agissent principalement en induisant une relaxation des cellules des muscles lisses bronchiques., Les bêta-2 mimétiques sont indiqués dans le traitement de l'exacerbation des crises aiguës.

Question 2

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Parmi les médicaments suivants, le(s)quel(s) est(sont) un(des) bêta-2 mimétique de longue durée d'action (LABA) utilisé pour la gestion de l'asthme ?

- a. Salbutamol ✖
- b. Salmétérol ✔
- c. Aténolol ✖
- d. Formotérol ✔
- e. Montelukast ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Salmétérol, Formotérol

Question 3

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant les médicaments bronchodilatateurs, on retrouve :

- a. Des sympatholytiques ✖
- b. Des parasympathomimétiques ✖
- c. Des anti-leucotriènes ✔
- d. Des inhibiteurs de phosphodiestérase ✔
- e. Des anticorps anti-IgE ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Des anti-leucotriènes, Des inhibiteurs de phosphodiestérase