Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 07:48
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 07:50
Temps mis	1 min 21 s
Points	3,07/21,00
Note	**2,92** sur 20,00 (**14,62**%)

Question 1

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant l'embolie pulmonaire :

- a. En cas de probabilité clinique forte, il faut réaliser le dosage des D-dimères. ✖
- b. Il faut réaliser un angioscanner thoracique en cas de probabilité clinique faible et si les D-dimères sont négatifs. ✖
- c. Les D-dimères sont positives si elles sont mesurées à 570 microgramme/l chez un patient de 52 ans. ✔
- d. Il faut réaliser une scintigraphie pulmonaire ventilation-perfusion en cas de probabilité clinique forte et si insuffisance rénale chronique sévère. ✔
- e. La sensibilité de la scintigraphie pulmonaire de ventilation perfusion est de 100%. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.

Les réponses correctes sont : Les D-dimères sont positives si elles sont mesurées à 570 microgramme/l chez un patient de 52 ans., Il faut réaliser une scintigraphie pulmonaire ventilation-perfusion en cas de probabilité clinique forte et si insuffisance rénale chronique sévère., La sensibilité de la scintigraphie pulmonaire de ventilation perfusion est de 100%.

Question 2

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Un patient de 70 ans se présente à votre consultation pour asthénie. Il décrit des ronflements, un sommeil non réparateur et une somnolence diurne. Il vous explique qu'il se réveille souvent la nuit par manque d'air. Vous suspectez un syndrome d'apnée du sommeil et réalisez une polygraphie ventilatoire :

- a. On peut suspecter une somnolence diurne excessive si le score d'Epworth est supérieur à 11/24. ✔
- b. L'obésité est un facteur de risque de syndrome d'apnée du sommeil obstructif. ✔
- c. La macroglossie est un facteur de risque de syndrome d'apnée du sommeil obstructif. ✔
- d. Le syndrome d'apnée du sommeil est sévère si l'IAH est supérieur à 15/h. ✖
- e. La dépression est un diagnostic différentiel chez un patient présentant une somnolence diurne excessive. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : On peut suspecter une somnolence diurne excessive si le score d'Epworth est supérieur à 11/24., L'obésité est un facteur de risque de syndrome d'apnée du sommeil obstructif., La macroglossie est un facteur de risque de syndrome d'apnée du sommeil obstructif., La dépression est un diagnostic différentiel chez un patient présentant une somnolence diurne excessive.

Question 3

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Un patient de 50 ans consulte aux urgences pour des crachats de sang à la suite d'un effort de toux spontanée de plus de 250 cc :

- a. Il s'agit d'une hémoptysie de grande abondance. ✔
- b. Il s'agit d'une hématémèse de grande abondance. ✖
- c. Le scanner thoracique injecté est indispensable à la prise en charge. ✔
- d. La tuberculose peut être une cause de ce symptôme. ✔
- e. Le cancer broncho-pulmonaire peut être une cause de ce symptôme. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Il s'agit d'une hémoptysie de grande abondance., Le scanner thoracique injecté est indispensable à la prise en charge., La tuberculose peut être une cause de ce symptôme., Le cancer broncho-pulmonaire peut être une cause de ce symptôme.

Question 4

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Quels sont les principes de prise en charge de la pneumopathie du sujet jeune sans signe de gravité ?

- a. Prise en charge urgente ✔
- b. Prise en charge ambulatoire ✔
- c. Radiographie thoracique systématique ✔
- d. Isolement aérien ✖
- e. Antibiothérapie après réception des résultats de l'ECBC ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Prise en charge urgente, Prise en charge ambulatoire, Radiographie thoracique systématique

---

Question 5

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Quelles sont les anomalies pouvant être retrouvées sur la radiographie thoracique d'une pneumopathie aiguë communautaire ?

- a. Opacité alvéolaire systématisée ✔
- b. Opacités alvéolo-interstitielles péri-hilaires ✖
- c. Opacités infiltratives non systématisées ✔
- d. Epanchement pleural ✔
- e. Cardiomégalie ✖
- f. Aucune ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Opacité alvéolaire systématisée, Opacités infiltratives non systématisées, Epanchement pleural, Aucune

---

Question 6

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant la radiographie thoracique :

- a. Il s'agit d'un examen accessible, peu irradiant. ✔
- b. Elle utilise les protons H+. ✖
- c. La visualisation de 9 arcs costaux antérieurs est un critère de qualité. ✖
- d. L'arc supérieur droit correspond au bouton aortique. ✖
- e. Le signe de la silhouette est utile pour différencier un pneumothorax d'une pleurésie. ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Il s'agit d'un examen accessible, peu irradiant.


Question 7

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Mr. J. présente une toux fébrile avec expectorations sales depuis 48h. Vous le voyez aux urgences ;

voici sa radio :



Concernant cette radiographie, quelles propositions sont vraies?

- a. Il s'agit d'un syndrome pleural. ✖
- b. Il s'agit d'un syndrome interstitiel. ✖
- c. Il s'agit d'un syndrome alvéolaire. ✔
- d. Je dois vite lui faire une IRM pour trancher. ✖
- e. Il s'agit d'une probable pneumonie infectieuse. ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Il s'agit d'un syndrome alvéolaire., Il s'agit d'une probable pneumonie infectieuse.

Question 8

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant la radiographie de thorax :

- a. Dans le syndrome interstitiel, on observe souvent un comblement de l'espace pleural. ✖
- b. Un volumineux épanchement pleural liquidien peut causer un poumon blanc unilatéral. ✖
- c. Le pneumothorax de faible abondance est visible principalement à l'apex chez un sujet debout. ✔
- d. En cas de volumineux pneumothorax, le médiastin (dont la trachée) est attiré vers le pneumothorax. ✖
- e. Un bronchogramme aérique est classique dans le syndrome interstitiel. ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Le pneumothorax de faible abondance est visible principalement à l'apex chez un sujet debout.

Question 9

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

A propos de la barrière alvéolo-capillaire :

- a. C'est le lieu de l'hématose. ✔
- b. Il n'y a pas d'adipocytes. ✔
- c. Elle comprend des pneumocytes 1 et des pneumocytes 2. ✖
- d. Elle est riche en fibrocytes. ✖
- e. Elle comprend une lame basale. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.

Les réponses correctes sont : C'est le lieu de l'hématose., Il n'y a pas d'adipocytes., Elle comprend une lame basale.

Question 10

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Les 5 stades de développement de l'appareil respiratoire sont dans l'ordre chronologique ?

a. Stade embryonnaire, stade pseudo-glandulaire, stade canaliculaire, stade sacculaire, stade alvéolaire

b. Stade pseudo-glandulaire, stade embryonnaire, stade sacculaire, stade canaliculaire, stade alvéolaire ✖

c. Stade embryonnaire, stade pseudo-glandulaire, stade sacculaire, stade canaliculaire, stade alvéolaire

d. Stade alvéolaire, stade pseudo-glandulaire, stade sacculaire, stade canaliculaire, stade embryonnaire

e. Stade pseudo-glandulaire, stade embryonnaire, stade canaliculaire, stade sacculaire, stade alvéolaire

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Stade embryonnaire, stade pseudo-glandulaire, stade canaliculaire, stade sacculaire, stade alvéolaire

---

Question 11

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

A propos des voies aériennes respiratoires :

a. Les pneumocytes sont recouverts de surfactant. ✔

b. Les pneumocytes de type 2 synthétisent le surfactant. ✔

c. Au niveau des bronchioles respiratoires, le cartilage forme un anneau complet. ✖

d. Les macrophages ne sont pas présents dans les alvéoles. ✖

e. Les alvéoles sont bordées par un épithélium riche en cellules ciliées. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Les pneumocytes sont recouverts de surfactant., Les pneumocytes de type 2 synthétisent le surfactant.

Question 12

Partiellement correct

Note de 0,67 sur 1,00

Devant une dyspnée aigue, quels sont les 3 examens complémentaires à réaliser en 1ère intention ?

– 3 réponses sont attendues –

- a. NFS ✖
- b. ECG ✔
- c. Radiographie thoracique artérielle ✔
- d. Scanner thoracique
- e. Spirométrie
- f. Gazométrie artérielle

Vous en avez sélectionné correctement 2.
Les réponses correctes sont : ECG, Radiographie thoracique artérielle, Gazométrie artérielle

---

Question 13

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant l'analyse de cet épanchement pleural :

- Protéine 32g/L
- LDH 10000 UI/L
- PNN 75%
- Macrophages 23%
- PNE 1%
- Cellules mésothéliales 1%

- a. L'absence de cellules tumorales exclut une origine néoplasique. ✖
- b. Il faut évoquer une poussée d'insuffisance cardiaque. ✖
- c. Il faut évoquer une origine infectieuse. ✔
- d. C'est un exsudat. ✔
- e. C'est un transsudat.

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Il faut évoquer une origine infectieuse., C'est un exsudat.

Question 14

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant les pneumopathies interstitielles diffuses :

- a. Ces pathologies concernent essentiellement les voies aériennes. ✖
- b. Les étiologies aiguës sont dominés par des causes infectieuses et cardiologique. ✔
- c. La fibroscopie avec lavage broncho alvéolaire est un examen diagnostic ✔
- d. Le scanner thoracique n'est d'aucune utilité. ✖
- e. Aucune de ces propositions ✖

La réponse n'est pas correcte.


Les réponses correctes sont : Les étiologies aiguës sont dominés par des causes infectieuses et cardiologique., La fibroscopie avec lavage broncho alvéolaire est un examen diagnostic

Question 15

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant cette image :



- a. Cette radiographie thoracique est normale.
- b. Syndrome alvéolaire lobaire moyen pouvant faire evoquer une pneumopathie infectieuse
- c. Opacité médiastinale postérieure droite pouvant faire évoquer une tumeur neurogène ✖
- d. Opacité médiastinale antérieure droite pouvant faire évoquer un lymphome
- e. Ce patient pourrait présenter une paralysie récurrentielle droite.

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Opacité médiastinale antérieure droite pouvant faire évoquer un lymphome

Question 16

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Le traitement de la crise d'asthme repose sur :

- a. des bétabloquants. ✖
- b. des bêta-2-agonistes. ✔
- c. des anti-inflammatoires non-stéroïdiens. ✖
- d. des agonistes du récepteurs aux leucotriènes. ✖
- e. des methylxanthines inhalées. ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : des bêta-2-agonistes.

Question 17

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant le pneumothorax :

- a. Il existe toujours un épanchement pleural des bases secondaires a l'irruption d'air dans la cavité pleurale. ✖
- b. Il n'est jamais spontanée. ✖
- c. Il peut-être d'origine traumatique. ✔
- d. La radiographie thoracique de face est toujours normale. ✖
- e. Il peut se traduire par une douleur latérothoracique. ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Il peut-être d'origine traumatique., Il peut se traduire par une douleur latérothoracique.

Question 18

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Quelles fonctions assurent la circulation pulmonaire ?

- a. L'oxygénation du diaphragme ✖
- b. Un rôle de réservoir sanguin ✔
- c. Filtre circulatoire ✔
- d. L'oxygénation musculaire périphérique ✖
- e. L'apport nutritif aux cellules du parenchyme pulmonaire ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Un rôle de réservoir sanguin, Filtre circulatoire, L'apport nutritif aux cellules du parenchyme pulmonaire

---

Question 19

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Quel(s) élément(s) ne participe(nt) pas à la régulation du pH extra cellulaire ?

- a. Les systèmes tampons ✖
- b. L'hémoglobine ✔
- c. La ventilation ✖
- d. Les reins ✖
- e. L'estomac ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : L'hémoglobine, L'estomac

Question 20

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant la sévérité de la BPCO :

- a. La sévérité est évalué en fonction du VEMS après bronchodilatateurs. ✔
- b. Il existe dans la classification Gold quatre stades. ✔
- c. Le grade Gold quatre est le moins sévère. ✖
- d. Le grade Gold 2 est défini par VEMS compris entre 50 et 79% des valeurs théoriques. ✔
- e. La présence d'une réversibilité témoigne d'une maladie plus sévère. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : La sévérité est évalué en fonction du VEMS après bronchodilatateurs., Il existe dans la classification Gold quatre stades., Le grade Gold 2 est défini par VEMS compris entre 50 et 79% des valeurs théoriques.

Question 21

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Quel(s) élément(s) ne participe(nt) pas à la régulation du pH extra cellulaire ?

- a. Les systèmes tampons ✖
- b. L'hémoglobine ✔
- c. La ventilation ✖
- d. Les reins ✖
- e. L'estomac ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : L'hémoglobine, L'estomac