Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 07:48
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 07:48
Temps mis	35 s
Points	0,70/5,00
Note	**2,80** sur 20,00 (**14**%)

Énoncé général

Monsieur M., 60 ans, vient consulter pour une toux évoluant depuis 3 mois.

Il travaille dans la maçonnerie et fume 1 paquet de cigarettes par jour depuis l'âge de 15ans.

A l'interrogatoire, le patient rapporte en plus de la toux, une perte de 6kg en 1 mois et des expectorations claires présentant parfois des filets de sang.

Question 1

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Quel(s) est(sont) le(s) diagnostic(s) le(s) plus probable(s) ?

- a. Cancer broncho-pulmonaire ✔
- b. Pneumonie franche lobaire aiguë ✖
- c. Infection tuberculeuse latente ✖
- d. Tuberculose pulmonaire maladie ✔
- e. Œdème aigu pulmonaire ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Cancer broncho-pulmonaire, Tuberculose pulmonaire maladie


---

Question 2

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Vous lui prescrivez un scanner thoracique dont voici les images :



Quels sont les aspects évocateurs de tuberculose en TDM ? (plusieurs réponses possibles)

- a. Nodules et micronodules multiples ✔
- b. Bulles d'emphysème ✖
- c. Infiltrats ✔
- d. Excavations ✔
- e. Localisation des lésions dans les lobes supérieurs ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Nodules et micronodules multiples, Infiltrats, Excavations, Localisation des lésions dans les lobes supérieurs

Question 3

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Vous évoquez une tuberculose pulmonaire.

Quel examen faites-vous en première intention pour confirmer votre diagnostic ?

- a. Tubages gastriques à la recherche de BK ✖
- b. QuantiFERON®
- c. Examens des crachats à la recherche de BK
- d. Fibroscopie bronchique avec recherche de BK
- e. Hémocultures à la recherche de BK

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Examens des crachats à la recherche de BK

Question 4

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Quel traitement mettez-vous en place ?

INH = isoniazide

RMP = rifampicine

EMB = éthambutol

PZA = pyrazinamide

- a. Quadrithérapie INH+RMP+EMB+PZA 2 mois puis bithérapie INH+RMP 4 mois
- b. Quadrithérapie INH+RMP+EMB+PZA 4 mois puis bithérapie INH+RMP 2 mois ✖
- c. Trithérapie INH+RMP+EMB 3 mois puis bithérapie INH+RMP 6 mois
- d. Trithérapie INH+EMB+PZA 3 mois puis bithérapie INH+PZA 6 mois
- e. Bithérapie INH+RMP 2 mois puis quadrithérapie INH+RMP+EMB+PZA 4 mois

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Quadrithérapie INH+RMP+EMB+PZA 2 mois puis bithérapie INH+RMP 4 mois

---

Question 5

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Le patient rapporte encore le premier mois des expectorations de sang.

Quel(s) est(sont) le(s) critère(s) permettant de différencier une hémoptysie d'une autre étiologie ?

- a. Rejet par la bouche de sang en provenance des voies aériennes sus-glottiques ✖
- b. Le saignement est rouge vif. ✔
- c. Le saignement survient lors d'un effort de vomissement. ✖
- d. Elle peut être précédée de prodromes (grésillement laryngé, goût métallique,...). ✔
- e. Le sang est aéré et spumeux. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Le saignement est rouge vif., Elle peut être précédée de prodromes (grésillement laryngé, goût métallique,...)., Le sang est aéré et spumeux.