Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 07:52
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 07:53
Temps mis	1 min 4 s
Points	0,90/8,00
Note	**2,25** sur 20,00 (**11,25**%)

Énoncé général

Vous recevez en consultation Madame R., âgée de 24 ans, après un passage aux urgences pour une crise d'asthme.

Elle est enceinte à 16 semaines d'aménorrhée.

Dans ces antécédents vous retrouvez :

- Un asthme pendant l'enfance qui avait justifié d'un traitement de fond, interrompu vers l'âge de 16 ans.
- Une rhinite allergique.
- Une allergie aux acariens.
- Un tabagisme à cinq cigarettes par jour.

Traitement : Ventoline à la demande

Question 1

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

À l'interrogatoire, quel(s) signe(s) recherchez vous qui vous ou nous orienterai(en)t vers le diagnostic d'asthme ?

- a. La sensation d'oppression thoracique ✔
- b. Le déclenchement des symptômes par des infections virales et/ où l'exposition à des allergènes ✔
- c. La variabilité des symptômes au cours du temps et leurs réversibilité ✔
- d. Absence de symptôme la nuit ✖
- e. Des crépitants a l'auscultation pulmonaire ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : La sensation d'oppression thoracique, Le déclenchement des symptômes par des infections virales et/ où l'exposition à des allergènes, La variabilité des symptômes au cours du temps et leurs réversibilité

Question 2

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant les épreuves fonctionnelles respiratoires chez cette patiente asthmatique :

- a. Un résultat normal n'élimine pas le diagnostic. ✔
- b. Le trouble ventilatoire obstructif (TVO) n'est pas réversible. ✖
- c. Il existe un syndrome restrictif fréquemment retrouvé pendant la grossesse. ✖
- d. La réversibilité du trouble ventilatoire obstructif est définie par une augmentation du VEMS de plus de 200 ML et de plus de 12 % , après administration de Salbutamol, par rapport aux valeurs initiales. ✔
- e. Le trouble ventilatoire est défini chez l'adulte par un rapport VEMS/CV inférieur à 0,6. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Un résultat normal n'élimine pas le diagnostic., La réversibilité du trouble ventilatoire obstructif est définie par une augmentation du VEMS de plus de 200 ML et de plus de 12 % , après administration de Salbutamol, par rapport aux valeurs initiales.


Question 3

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

La patiente réalise les épreuves fonctionnelles respiratoires suivantes :

COURBES DEBIT-VOLUME ET SPIROMETRIE LENTE



PARAMETRES SPIROMETRIE ET DEBIT-VOLUME

		Théo	Pré	%Théo	Post	%Théo	D%2/1
Date			26/10/09		26/10/09		
Heure			18:26:20		18:40:53		
Substance					<Ventoline		
CVL	[L]	2.55	2.10	82.4	2.26	88.6	7.6
CVF	[L]	2.49	2.10	84.5	2.23	89.6	6.1
VRE	[L]	0.82	0.36	43.7	0.18	22.3	-49.0
VEMS	[L]	2.08	1.57	75.4	1.78	85.6	13.6
VEMS % CVL	[%]	84.73	74.65	88.1	78.81	93.0	5.6
DEP	[L/s]	4.67	3.86	82.7	4.26	91.2	10.3
DEM 75	[L/s]	4.17	2.98	71.4	3.85	92.4	29.4
DEM 50	[L/s]	2.94	1.35	45.9	1.77	60.1	31.0
DEM 25	[L/s]	1.51	0.50	33.1	0.66	43.6	31.7
DEMM 25/75	[L/s]	2.58	1.16	44.9	1.50	58.1	29.4
DID	[L/s]		3.40		2.77		-18.5

Vous interpréter cet examen :

- a. Il existe un syndrome restrictif. ✖
- b. Il existe un syndrome obstructif non réversible. ✖
- c. Il existe un syndrome obstructif réversible. ✔
- d. C'est un examen normal. ✖
- e. Il n'y a pas de restriction. ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Il existe un syndrome obstructif réversible., Il n'y a pas de restriction.

Question 4

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Le tableau clinique et fonctionnel est compatible avec un asthme. Concernant la prise en charge thérapeutique pendant la grossesse :

- a. La majorité des traitements doivent être interrompus. ✖
- b. Il n'y a pas de contre-indications aux corticoïdes inhalées. ✔
- c. On peut utiliser une association corticoïdes inhalées et de bêta 2 mimétique. ✔
- d. Les glucocorticoïdes par voie orale sont les seuls traitements utilisables. ✖
- e. La théophylline est le traitement de choix en première intention. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Il n'y a pas de contre-indications aux corticoïdes inhalées., On peut utiliser une association corticoïdes inhalées et de bêta 2 mimétique.

Question 5

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Quelle prise en charge thérapeutique proposez-vous ?

- a. Mise en place d'une corticothérapie inhalée faible dose ✔
- b. Mise en place d'un traitement par théophylline ✖
- c. Prescription de Ventoline à la demande ✔
- d. Prescription d'un bêta 2 mimétique en monothérapie seul ✖
- e. Prescription d'un atropinique longue durée d'action ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Mise en place d'une corticothérapie inhalée faible dose, Prescription de Ventoline à la demande

---

Question 6

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Quelle(s) autre(s) mesure(s) associez-vous ?

- a. Arrêt du tabac ✔
- b. Réévaluation clinique après la grossesse ✖
- c. Évictions des allergènes ✔
- d. Réévaluation clinique dans un mois ✔
- e. Prise en charge de la rhinite ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Arrêt du tabac, Évictions des allergènes, Réévaluation clinique dans un mois, Prise en charge de la rhinite

---

Question 7

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Vous revoyez votre patiente en consultation avant l'accouchement à la demande de l'anesthésiste. Le traitement est bien toléré. Elle n'a pas représenté de symptômes de son asthme, n'a pas eu recours à la Ventoline au cours des quatre dernières semaines et ne présente pas de symptômes nocturnes.

- a. Son asthme semble contrôlé. ✔
- b. Vous proposez de majorer le traitement de fond en vue de l'accouchement. ✖
- c. Vous encourager la patiente à suivre de façon la plus régulière possible son traitement sans le modifier. ✔
- d. Tout va bien, vous arrêtez le traitement avant l'accouchement. ✖
- e. Vous poursuivez le traitement jusqu'à l'accouchement et vous conseillez à la patiente de l'interrompre ensuite. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Son asthme semble contrôlé., Vous encourager la patiente à suivre de façon la plus régulière possible son traitement sans le modifier.

Question 8

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

La patiente vous interroge concernant son traitement et l'allaitement. Quel(s) conseil(s) pouvez-vous lui donner ?

- a. La Ventoline est contre-indiqué. ✖
- b. Elle doit poursuivre ses corticoïdes inhalées. ✔
- c. La théophylline peut avoir une incidence sur le nourrisson. ✔
- d. Le montelukast peut-être utilisé si nécessaire. ✔
- e. Tous les traitements sont contre-indiqués. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Elle doit poursuivre ses corticoïdes inhalées., La théophylline peut avoir une incidence sur le nourrisson., Le montelukast peut-être utilisé si nécessaire.