Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 07:53
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 07:54
Temps mis	1 min 22 s
Points	4,50/21,00
Note	**4,29** sur 20,00 (**21,43**%)

Question 1

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant les anticholinergiques :

- a. Ce sont des antagonistes des récepteurs muscariniques. ✔
- b. Ils ont des effets parasympatholytiques. ✔
- c. Ils ont une action anti-inflammatoire. ✖
- d. Ils sont utilisés en première ligne de traitement de la crise d'asthme. ✖
- e. Leur effet bronchodilatateur est plus rapide et plus puissant que celui des beta-2-mimétiques. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Ce sont des antagonistes des récepteurs muscariniques., Ils ont des effets parasympatholytiques.

Question 2

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Le traitement de la crise d'asthme :

- a. repose sur des bétabloquants. ✖
- b. repose sur des bêta-2-agonistes. ✔
- c. repose sur des anti-inflammatoires non-stéroïdiens. ✖
- d. repose sur des agonistes du récepteurs aux leucotriènes. ✖
- e. repose sur des methylxanthines inhalées. ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : repose sur des bêta-2-agonistes.

Question 3

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Un patient se présente à votre consultation. Après interrogatoire et examen clinique, vous trouvez qu'il présente un syndrome de Pancoast Tobias. Ce syndrome associe :

- a. Une turgescence jugulaire ✖
- b. Un œdème en pélerine ✖
- c. Une douleur de l'épaule et du membre supérieur de distribution C8 D2 ✔
- d. Un syndrome de Claude Bernard Horner ✔
- e. Une amyotrophie des muscles de la main ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Une douleur de l'épaule et du membre supérieur de distribution C8 D2, Un syndrome de Claude Bernard Horner , Une amyotrophie des muscles de la main

---

Question 4

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Dans l'alcalose métabolique, on retrouve ?

- a. Un pH bas ✖
- b. Des bicarbonates augmentés ✔
- c. Une PCO2 abaissée ✖
- d. Des bicarbonates abaissés ✖
- e. Un pH > 7, 4 ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Des bicarbonates augmentés, Un pH > 7, 4

Question 5

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Donnez la(les) réponse(s) vraie(s) :

- a. L'oropharynx se situe en arrière du « V » lingual, en dessous du voile du palais et se termine au niveau de l'épiglotte. ✔
- b. Les tonsilles pharyngiennes (végétations adénoïdes) sont situées dans l'oropharynx. ✖
- c. Le laryngopharynx appartient au pharynx et constitue le carrefour aérodigestif. ✔
- d. Le cartilage cricoïde est le seul cartilage circulaire des voies aériennes respiratoires. ✔
- e. Les cartilages aryténoïdes s'articulent sur la partie antérieure du cartilage cricoïde, leurs mobilités permettent la mobilité des cordes vocales ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
les tonsilles pharyngiennes sont dans le nasopharynx ; les cartilages aryténoïdes s'articulent à la partie postérieure du cricoïde)

Les réponses correctes sont : L'oropharynx se situe en arrière du « V » lingual, en dessous du voile du palais et se termine au niveau de l'épiglotte., Le laryngopharynx appartient au pharynx et constitue le carrefour aérodigestif., Le cartilage cricoïde est le seul cartilage circulaire des voies aériennes respiratoires.

Question 6

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Parmi ces propositions, quels sont les signes cliniques caractéristiques d'une hypercapnie ?

- a. Asterixis ✔
- b. Sueurs ✔
- c. Cyanose ✖
- d. Agitation ✔
- e. Céphalées ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Asterixis, Sueurs , Agitation, Céphalées

---

Question 7

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

A propos des bêta-2 mimétiques :

- a. Ce sont des agonistes des récepteurs bêta-2 adrénergiques. ✔
- b. Le formeterol est un médicament inhalé à courte durée d'action. ✖
- c. Le salbutamol est un médicament inhalé à longue durée d'action. ✖
- d. Leurs récepteurs β2 sont exprimés dans le muscle lisse bronchique. ✔
- e. Ils induisent une relaxation musculaire dans un délais de 1 à 15 minutes après prise inhalée. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Ce sont des agonistes des récepteurs bêta-2 adrénergiques., Leurs récepteurs β2 sont exprimés dans le muscle lisse bronchique., Ils induisent une relaxation musculaire dans un délais de 1 à 15 minutes après prise inhalée.

Question 8

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Donnez la(les) réponse(s) vraie(s) :

- a. Le diaphragme comprend une partie centrale musculaire et une partie périphérique tendineuse. ✖
- b. L'innervation du diaphragme se fait par les nerfs phréniques dont l'origine est cervicale. ✔
- c. En expiration, le diaphragme remonte passivement. ✔
- d. Le hile pulmonaire est constitué d'une artère pulmonaire, d'une bronche souche et d'une veine pulmonaire. ✖
- e. Le poumon droit comprend 3 lobes pulmonaires (supérieur, moyen, inférieur) et le poumon gauche 2 lobes (supérieur, inférieur). ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
partie centrale du diaphragme est tendineux ; le hile pulmonaire contient deux veines pulmonaires).

Les réponses correctes sont : L'innervation du diaphragme se fait par les nerfs phréniques dont l'origine est cervicale., En expiration, le diaphragme remonte passivement., Le poumon droit comprend 3 lobes pulmonaires (supérieur, moyen, inférieur) et le poumon gauche 2 lobes (supérieur, inférieur).

Question 9

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Sur cette radiographie on retrouve ?



- a. Un pneumothorax droit
- b. Un pneumothorax gauche ✔
- c. Une pneumopathie gauche
- d. Une ligne de Damoiseau à droite
- e. Aucune des propositions

La réponse est correcte.

La réponse correcte est : Un pneumothorax gauche

Question 10

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

A propos des voies aériennes respiratoires :

- a. Les pneumocytes sont recouverts de surfactant. ✔
- b. Les pneumocytes de type 2 synthétisent le surfactant. ✔
- c. Au niveau des bronchioles respiratoires, le cartilage forme un anneau complet. ✖
- d. Les macrophages sont présents dans les alvéoles. ✔
- e. Les alvéoles sont bordées par un épithélium riche en cellules ciliées. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Les pneumocytes sont recouverts de surfactant., Les pneumocytes de type 2 synthétisent le surfactant., Les macrophages sont présents dans les alvéoles.

Question 11

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Quelles fonctions assure la circulation pulmonaire ?

- a. L'oxygénation du diaphragme ✖
- b. Un rôle de réservoir sanguin ✔
- c. Filtre circulatoire ✔
- d. L'oxygénation musculaire périphérique ✖
- e. L'apport nutritif aux cellules du parenchyme pulmonaire ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Un rôle de réservoir sanguin, Filtre circulatoire, L'apport nutritif aux cellules du parenchyme pulmonaire


---

Question 12

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Quelle proposition est vraie concernant cette radiographie thoracique?



- a. Normale ✖
- b. Épanchement pleural droit
- c. Pneumothorax gauche
- d. Opacité lobaire supérieure droite
- e. Opacité lobaire supérieure gauche

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Opacité lobaire supérieure droite

Question 13

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Les 5 stades de développement de l'appareil respiratoire sont dans l'ordre chronologique ?

a. Stade embryonnaire, stade pseudo-glandulaire, stade sacculaire, stade canaliculaire, stade alvéolaire

b. Stade pseudo-glandulaire, stade embryonnaire, stade sacculaire, stade canaliculaire, stade alvéolaire ✖

c. Stade embryonnaire, stade pseudo-glandulaire, stade canaliculaire, stade sacculaire, stade alvéolaire

d. Stade alvéolaire, stade pseudo-glandulaire, stade sacculaire, stade canaliculaire, stade embryonnaire

e. Stade pseudo-glandulaire, stade embryonnaire, stade canaliculaire, stade sacculaire, stade alvéolaire

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Stade embryonnaire, stade pseudo-glandulaire, stade canaliculaire, stade sacculaire, stade alvéolaire

---

Question 14

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

A propos de la barrière alvéolo-capillaire :

a. C'est le lieu de l'hématose. ✔

b. Elle est riche en adipocytes. ✖

c. Elle comprend des pneumocytes 1 et des pneumocytes 2. ✖

d. Elle est riche en fibrocytes. ✖

e. Elle comprend une lame basale. ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : C'est le lieu de l'hématose., Elle comprend une lame basale.

Question 15

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

A propos des médicaments bronchodilatateurs, on retrouve :

- a. Des sympathomimétiques ✔
- b. Des sympatholytiques ✖
- c. Des parasympathomimétiques ✖
- d. Des parasympatholytiques ✔
- e. Des inhibiteurs des phosphodiesterases ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Des sympathomimétiques, Des parasympatholytiques, Des inhibiteurs des phosphodiesterases

---

Question 16

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Parmi ces signes cliniques, la(les)quelle(s) permet(tent) d'évaluer la gravité d'une détresse respiratoire aigüe ?

- a. Cyanose ✔
- b. Fréquence respiratoire ✔
- c. Respiration paradoxale ✔
- d. Confusion ✔
- e. Aucune des réponses n'est vraie ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Cyanose, Fréquence respiratoire, Respiration paradoxale, Confusion

---

Question 17

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant la radiographie thoracique de face :

- a. Un pneumothorax radiographique est caractérisé par une hyperclarté avasculaire périphérique. ✔
- b. L'arc médiastinal moyen gauche radiographique correspond anatomiquement à la veine cave supérieure. ✖
- c. Le syndrome alvéolaire est caractérisé par la présence d'un bronchogramme aérique au sein d'une opacité. ✔
- d. Dans le médiastin, 2 opacités de même densité au contact l'une de l'autre et effaçant leurs bords respectifs sont dans le même plan. ✔
- e. L'appréciation de la réalisation d'une radiographie de face en inspiration profonde se fait sur la présence visible de la poche à air gastrique. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Un pneumothorax radiographique est caractérisé par une hyperclarté avasculaire périphérique., Le syndrome alvéolaire est caractérisé par la présence d'un bronchogramme aérique au sein d'une opacité., Dans le médiastin, 2 opacités de même densité au contact l'une de l'autre et effaçant leurs bords respectifs sont dans le même plan.

Question 18

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Le syndrome cave supérieur :

- a. est une gêne au retour veineux par compression extrinsèque ou thrombose de la veine cave supérieure. ✔
- b. est dans la majorité des cas d'origine tumorale. ✔
- c. associe une cyanose du visage, un œdème en pélerine, une turgescence jugulaire, une circulation veineuse collatérale et des céphalées en fin de nuit. ✔
- d. peut être lié à un envahissement du médiastin antérieur. ✔
- e. Aucune des propositions n'est vraie. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : est une gêne au retour veineux par compression extrinsèque ou thrombose de la veine cave supérieure., est dans la majorité des cas d'origine tumorale., associe une cyanose du visage, un œdème en pélerine, une turgescence jugulaire, une circulation veineuse collatérale et des céphalées en fin de nuit., peut être lié à un envahissement du médiastin antérieur.

Question 19

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant le diaphragme :

- a. Le diaphragme est un muscle strié ; il est commandé de façon automatique (la plupart du temps) ou volontaire. ✔
- b. C'est un muscle accessoire de la respiration. ✖
- c. Les fibres qui composent le diaphragme sont adaptées à un travail en endurance : 40 % d'entre elles sont de type lent. ✔
- d. Il ne participe pas à la ventilation. ✖
- e. Le contrôle nerveux du diaphragme se fait par l'intermédiaire des nerfs phréniques. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Le diaphragme est un muscle strié ; il est commandé de façon automatique (la plupart du temps) ou volontaire., Les fibres qui composent le diaphragme sont adaptées à un travail en endurance : 40 % d'entre elles sont de type lent., Le contrôle nerveux du diaphragme se fait par l'intermédiaire des nerfs phréniques.

Question 20

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Quel(s) facteur(s) détermine(nt) la compliance des voies aériennes ?

- a. La fréquence respiratoire ✖
- b. Les structures musculaires et osseuses de la cage thoracique ✔
- c. La compression dynamique des voies aériennes ✖
- d. Le parenchyme pulmonaire ✔
- e. Le muscle lisse bronchique ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Les structures musculaires et osseuses de la cage thoracique, Le parenchyme pulmonaire

---

Question 21

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant l'oxygène :

- a. L'oxygène diffuse de façon active à travers la membrane alvéolo capillaire. ✖
- b. La pression partielle artérielle en O_2 est un paramètre mesurable. ✔
- c. Il est transporté dans le sang en majeure partie sous forme lié à l'hémoglobine. ✔
- d. La PaO2 est toujours stable. ✖
- e. L'oxygène diffuse de l'alvéole vers le compartiment sanguin de façon passive. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.

Les réponses correctes sont : La pression partielle artérielle en O_2 est un paramètre mesurable., Il est transporté dans le sang en majeure partie sous forme lié à l'hémoglobine., L'oxygène diffuse de l'alvéole vers le compartiment sanguin de façon passive.