Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 07:58
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 07:59
Temps mis	1 min 9 s
Points	4,50/17,00
Note	**5,29** sur 20,00 (**26,47**%)

Question 1

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant les pneumopathies interstitielles diffuses :

- a. Ces pathologies ne concernent pas les voies aériennes proximales. ✔
- b. Les étiologies aiguës sont dominées par des causes infectieuses et cardiologiques. ✔
- c. La fibroscopie avec lavage broncho-alvéolaire est un examen diagnostic clinique. ✔
- d. Le scanner thoracique n'est d'aucune utilité. ✖
- e. Aucune des propositions ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.

Les réponses correctes sont : Ces pathologies ne concernent pas les voies aériennes proximales., Les étiologies aiguës sont dominées par des causes infectieuses et cardiologiques., La fibroscopie avec lavage broncho-alvéolaire est un examen diagnostic clinique.

Question 2

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Donnez la(les) réponse(s) vraie(s) :

- a. L'oropharynx se situe en arrière du « V » lingual, en dessous du voile du palais et se termine au niveau de l'épiglotte. ✔
- b. Les tonsilles pharyngiennes (végétations adénoïdes) sont situées dans l'oropharynx. ✖
- c. Le laryngopharynx appartient au pharynx et constitue le carrefour aérodigestif. ✔
- d. Le cartilage cricoïde est le seul cartilage circulaire des voies aériennes respiratoires. ✔
- e. Les cartilages aryténoïdes s'articulent sur la partie antérieure du cartilage cricoïde, leurs mobilités permettent la mobilité des cordes vocales ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
les tonsilles pharyngiennes sont dans le nasopharynx ; les cartilages aryténoïdes s'articulent à la partie postérieure du cricoïde)

Les réponses correctes sont : L'oropharynx se situe en arrière du « V » lingual, en dessous du voile du palais et se termine au niveau de l'épiglotte., Le laryngopharynx appartient au pharynx et constitue le carrefour aérodigestif., Le cartilage cricoïde est le seul cartilage circulaire des voies aériennes respiratoires.

Question 3

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Un patient de 70 ans se présente à votre consultation pour asthénie. Il décrit des ronflements, un sommeil non réparateur et une somnolence diurne. Il vous explique qu'il se réveille souvent la nuit par manque d'air. Vous suspectez un syndrome d'apnée du sommeil et réalisez une polygraphie ventilatoire :

- a. On peut suspecter une somnolence diurne excessive si le score d'Epworth est supérieur à 11/24. ✔
- b. L'obésité est un facteur de risque de syndrome d'apnée du sommeil obstructif. ✔
- c. La macroglossie est un facteur de risque de syndrome d'apnée du sommeil obstructif. ✔
- d. Le syndrome d'apnée du sommeil est sévère si l'IAH est supérieur à 15/h. ✖
- e. La dépression est un diagnostic différentiel chez un patient présentant une somnolence diurne excessive. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : On peut suspecter une somnolence diurne excessive si le score d'Epworth est supérieur à 11/24., L'obésité est un facteur de risque de syndrome d'apnée du sommeil obstructif., La macroglossie est un facteur de risque de syndrome d'apnée du sommeil obstructif., La dépression est un diagnostic différentiel chez un patient présentant une somnolence diurne excessive.

Question 4

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Parmi ces propositions, quels sont les signes cliniques caractéristiques d'une hypercapnie ?

- a. Asterixis ✔
- b. Sueurs ✔
- c. Cyanose ✖
- d. Agitation ✔
- e. Céphalées ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Asterixis, Sueurs , Agitation, Céphalées

---

Question 5

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Donnez la(les) réponse(s) vraie(s) :

- a. Le diaphragme comprend une partie centrale musculaire et une partie périphérique tendineuse. ✖
- b. L'innervation du diaphragme se fait par les nerfs phréniques dont l'origine est cervicale. ✔
- c. En expiration, le diaphragme remonte passivement. ✔
- d. Le hile pulmonaire est constitué d'une artère pulmonaire, d'une bronche souche et d'une veine pulmonaire. ✖
- e. Le poumon droit comprend 3 lobes pulmonaires (supérieur, moyen, inférieur) et le poumon gauche 2 lobes (supérieur, inférieur). ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
partie centrale du diaphragme est tendineux ; le hile pulmonaire contient deux veines pulmonaires).

Les réponses correctes sont : L'innervation du diaphragme se fait par les nerfs phréniques dont l'origine est cervicale., En expiration, le diaphragme remonte passivement., Le poumon droit comprend 3 lobes pulmonaires (supérieur, moyen, inférieur) et le poumon gauche 2 lobes (supérieur, inférieur).

Question 6

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Les 5 stades de développement de l'appareil respiratoire sont dans l'ordre chronologique ?

a. Stade embryonnaire, stade pseudo-glandulaire, stade sacculaire, stade canaliculaire, stade alvéolaire

b. Stade pseudo-glandulaire, stade embryonnaire, stade sacculaire, stade canaliculaire, stade alvéolaire

c. Stade embryonnaire, stade pseudo-glandulaire, stade canaliculaire, stade sacculaire, stade alvéolaire ✔

d. Stade alvéolaire, stade pseudo-glandulaire, stade sacculaire, stade canaliculaire, stade embryonnaire

e. Stade pseudo-glandulaire, stade embryonnaire, stade canaliculaire, stade sacculaire, stade alvéolaire

La réponse est correcte.

La réponse correcte est : Stade embryonnaire, stade pseudo-glandulaire, stade canaliculaire, stade sacculaire, stade alvéolaire

---

Question 7

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant le développement de la tuberculose maladie, quels sont les facteurs favorisant ?

a. Les âges extrêmes ✔

b. La précarité ✔

c. L'asthme ✖

d. La dénutrition ✔

e. L'obésité ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.

Les réponses correctes sont : Les âges extrêmes, La précarité, La dénutrition

---

Question 8

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Un patient de 50 ans consulte aux urgences pour des crachats de sang à la suite d'un effort de toux spontanée de plus de 250 cc :

- a. Il s'agit d'une hémoptysie de grande abondance. ✔
- b. Il s'agit d'une hématémèse de grande abondance. ✖
- c. Le scanner thoracique injecté est indispensable à la prise en charge. ✔
- d. La tuberculose peut être une cause de ce symptôme. ✔
- e. Le cancer broncho-pulmonaire peut être une cause de ce symptôme. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Il s'agit d'une hémoptysie de grande abondance., Le scanner thoracique injecté est indispensable à la prise en charge., La tuberculose peut être une cause de ce symptôme., Le cancer broncho-pulmonaire peut être une cause de ce symptôme.

Question 9

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Quels sont les principes de prise en charge de la pneumopathie du sujet jeune sans signe de gravité ?

- a. Prise en charge urgente ✔
- b. Prise en charge ambulatoire ✔
- c. Radiographie thoracique systématique ✔
- d. Isolement aérien ✖
- e. Antibiothérapie après réception des résultats de l'ECBC ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Prise en charge urgente, Prise en charge ambulatoire, Radiographie thoracique systématique

---

Question 10

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Donnez la(les) réponse(s) vraie(s) :

- a. La fièvre est systématique en cas de bronchite infectieuse. ✖
- b. En cas de bronchite, l'absence d'antibiothérapie est la règle chez le sujet sain. ✔
- c. Une pneumonie à *Legionella Spp* doit être traitée par Amoxicilline. ✖
- d. Une pneumonie à *Legionella Spp* nécessite une déclaration obligatoire à l'ARS. ✔
- e. Une pneumonie à Pneumocoque peut être compliquée d'un épanchement parapneumonique. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.

Les réponses correctes sont : En cas de bronchite, l'absence d'antibiothérapie est la règle chez le sujet sain., Une pneumonie à *Legionella Spp* nécessite une déclaration obligatoire à l'ARS., Une pneumonie à Pneumocoque peut être compliquée d'un épanchement parapneumonique.

Question 11

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Dans l'alcalose métabolique, on retrouve ?

- a. Un pH bas ✖
- b. Des bicarbonates augmentés ✔
- c. Une PCO2 abaissée ✖
- d. Des bicarbonates abaissés ✖
- e. Un pH > 7, 4 ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Des bicarbonates augmentés, Un pH > 7, 4

Question 12

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant la tuberculose pulmonaire commune, quels sont les signes cliniques évocateurs ?

- a. Une altération de l'état général progressive ✔
- b. Une fébricule à prédominance nocturne ✔
- c. Une fièvre élevée ✖
- d. Des crachats hémoptoïques ✔
- e. Une douleur latéro-thoracique ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Une altération de l'état général progressive, Une fébricule à prédominance nocturne, Des crachats hémoptoïques

---

Question 13

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Quelles sont les anomalies pouvant être retrouvées sur la radiographie thoracique d'une pneumopathie aiguë communautaire ?

- a. Opacité alvéolaire systématisée ✔
- b. Opacités alvéolo-interstitielles péri-hilaires ✖
- c. Opacités infiltratives non systématisées ✔
- d. Epanchement pleural ✔
- e. Cardiomégalie ✖
- f. Aucune ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Opacité alvéolaire systématisée, Opacités infiltratives non systématisées, Epanchement pleural, Aucune

---

Question 14

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant la radiographie thoracique de face :

- a. Un pneumothorax radiographique est caractérisé par une hyperclarté avasculaire périphérique. ✔
- b. L'arc médiastinal moyen gauche radiographique correspond anatomiquement à la veine cave supérieure. ✖
- c. Le syndrome alvéolaire est caractérisé par la présence d'un bronchogramme aérique au sein d'une opacité. ✔
- d. Dans le médiastin, 2 opacités de même densité au contact l'une de l'autre et effaçant leurs bords respectifs sont dans le même plan. ✔
- e. L'appréciation de la réalisation d'une radiographie de face en inspiration profonde se fait sur la présence visible de la poche à air gastrique. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Un pneumothorax radiographique est caractérisé par une hyperclarté avasculaire périphérique., Le syndrome alvéolaire est caractérisé par la présence d'un bronchogramme aérique au sein d'une opacité., Dans le médiastin, 2 opacités de même densité au contact l'une de l'autre et effaçant leurs bords respectifs sont dans le même plan.

Question 15

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Quel(s) facteur(s) détermine(nt) la compliance des voies aériennes ?

- a. La fréquence respiratoire ✖
- b. Les structures musculaires et osseuses de la cage thoracique ✔
- c. La compression dynamique des voies aériennes ✖
- d. Le parenchyme pulmonaire ✔
- e. Le muscle lisse bronchique ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Les structures musculaires et osseuses de la cage thoracique, Le parenchyme pulmonaire

---

Question 16

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant la tuberculose :

- a. C'est une maladie infectieuse transmissible. ✔
- b. C'est une infection à déclaration obligatoire. ✔
- c. Il n'existe pas de forme latente de l'infection. ✖
- d. Les principales localisations sont digestives. ✖
- e. Aucune des propositions n'est vraie ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : C'est une maladie infectieuse transmissible., C'est une infection à déclaration obligatoire.

Question 17

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant les pneumopathies interstitielles diffuse lors d'exploration fonctionnelle respiratoire :

- a. On peut retrouver un trouble ventilatoire, restrictif pur. ✔
- b. Un syndrome obstructif est toujours présent. ✖
- c. La diffusion du monoxyde de carbone (DLCO) peut être abaissée. ✔
- d. Elles peuvent être normales. ✔
- e. Aucune des propositions n'est vraie. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.

Les réponses correctes sont : On peut retrouver un trouble ventilatoire, restrictif pur., La diffusion du monoxyde de carbone (DLCO) peut être abaissée., Elles peuvent être normales.