Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 08:04
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 08:09
Temps mis	4 min 17 s
Points	0,40/4,00
Note	**2,00** sur 20,00 (**10**%)

Question 1

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Le traitement de la crise d'asthme :

- a. repose sur des bétabloquants. ✖
- b. repose sur des bêta-2-agonistes. ✔
- c. repose sur des anti-inflammatoires non-stéroïdiens. ✖
- d. repose sur des agonistes du récepteurs aux leucotriènes. ✖
- e. repose sur des methylxanthines inhalées. ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : repose sur des bêta-2-agonistes.

Question 2

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

A propos des médicaments bronchodilatateurs, on retrouve :

- a. Des sympathomimétiques ✔
- b. Des sympatholytiques ✖
- c. Des parasympathomimétiques ✖
- d. Des parasympatholytiques ✔
- e. Des inhibiteurs des phosphodiesterases ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.

Les réponses correctes sont : Des sympathomimétiques, Des parasympatholytiques, Des inhibiteurs des phosphodiesterases

---

Question 3

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Le traitement de fond de l'asthme :

- a. repose sur la mise en place de paliers d'intensité croissante adaptés selon sévérité de l'asthme. ✔
- b. repose sur l'utilisation d'hormones stéroïdiennes substitutives. ✖
- c. repose sur l'utilisation d'hormones stéroïdiennes substitutives. ✖
- d. implique la suppression de l'exposition aux facteurs d'aggravations. ✔
- e. repose sur l'association de traitements anti-inflammatoires inhalés et de bronchoconstricteurs. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : repose sur la mise en place de paliers d'intensité croissante adaptés selon sévérité de l'asthme., implique la suppression de l'exposition aux facteurs d'aggravations.

Question 4

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

A propos des bêta-2 mimétiques :

- a. Ce sont des agonistes des récepteurs bêta-2 adrénergiques. ✔
- b. Le formeterol est un médicament inhalé à courte durée d'action. ✖
- c. Le salbutamol est un médicament inhalé à longue durée d'action. ✖
- d. Leurs récepteurs β2 sont exprimés dans le muscle lisse bronchique. ✔
- e. Ils induisent une relaxation musculaire dans un délais de 1 à 15 minutes après prise inhalée. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.

Les réponses correctes sont : Ce sont des agonistes des récepteurs bêta-2 adrénergiques., Leurs récepteurs β2 sont exprimés dans le muscle lisse bronchique., Ils induisent une relaxation musculaire dans un délais de 1 à 15 minutes après prise inhalée.