Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 08:10
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 08:10
Temps mis	25 s
Points	1,50/3,00
Note	**10,00** sur 20,00 (**50**%)

Énoncé général

Un patiente de 20 ans vient à votre consultation pour bilan respiratoire. Dans ses antécédents, on note de l'asthme connu depuis l'enfance. Elle vient car elle se sent moins bien depuis quelques mois. Elle travaille dans une boulangerie depuis quelques mois. Elle n'a pas de traitement de fond. Les explorations fonctionnelles respiratoires retrouve un trouble ventilatoire réversible.

Question 1

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Quels sont les symptômes qui peuvent être compatibles avec un asthme ?

- a. Une toux nocturne ✔
- b. Des ronchis ✖
- c. Une dyspnée ✔
- d. Des oppressions thoraciques ✔
- e. Des sifflements ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Une toux nocturne, Une dyspnée, Des oppressions thoraciques, Des sifflements

---

Question 2

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Elle a une rhinite quotidienne persistante. Elle utilise des bougies parfumées et de l'encens chez elle tous les jours. Les facteurs aggravants son asthme chez elle sont ?

- a. Sa profession ✔
- b. L'absence de traitement de fond ✔
- c. La rhinite allergique ✔
- d. L'utilisation de composés volatiles organiques ✔
- e. Aucun ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Sa profession, L'absence de traitement de fond, La rhinite allergique, L'utilisation de composés volatiles organiques

---

Question 3

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Le bilan clinique et les EFR confirment l'asthme. Quels sont les éléments justes concernant le traitement à mettre en place pour cette patiente ?

- a. Une corticothérapie inhalée à faible dose ✔
- b. Une corticothérapie inhalée à forte dose et bronchodilatateur longue durée d'action ✖
- c. Une éducation thérapeutique ✔
- d. Un traitement bronchodilatateur de courte durée d'action ✔
- e. L'éviction des facteurs aggravants ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Une corticothérapie inhalée à faible dose, Une éducation thérapeutique, Un traitement bronchodilatateur de courte durée d'action, L'éviction des facteurs aggravants