Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 07:56
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 07:56
Temps mis	40 s
Points	0,60/3,00
Note	**4,00** sur 20,00 (**20**%)

Énoncé général

Un de vos patient suivit pour un cancer pulmonaire métastique sous chimiothérapie consulte pour une douleur latéro-thoracique gauche avec une majoration de la dyspnée à l'effort depuis une semaine. La radiographie thoracique retrouve les lésions tumorales connues sans modification par rapport au dernier bilan.

Question 1

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Vous suspectez une embolie pulmonaire, quels examens demander ?

- a. Une scintigraphie pulmonaire, ventilation/perfusion ✔
- b. Un dosage des D-dimères ✔
- c. Un électrocardiogramme ✔
- d. Une échographie abdominale ✖
- e. Aucun de ces examens ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Une scintigraphie pulmonaire, ventilation/perfusion, Un dosage des D-dimères, Un électrocardiogramme

---

Question 2

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Le diagnostic d'embolie pulmonaire et confirmé. Quelles affirmations sont vraies concernant le traitement anticoagulant chez ce patient ?

- a. On peut débuter un traitement par une HBPM. ✔
- b. On peut débuter un traitement par un anticoagulant oral direct (AOD). ✔
- c. La durée de traitement est de trois mois. ✖
- d. La durée de traitement est d'au moins six mois et poursuivi le temps que la maladie est active. ✔
- e. Aucune de ces propositions n'est vraie. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : On peut débuter un traitement par une HBPM., On peut débuter un traitement par un anticoagulant oral direct (AOD)., La durée de traitement est d'au moins six mois et poursuivi le temps que la maladie est active.

Question 3

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant les D-dimères :

- a. Il s'agit d'un produit de dégradation de la fibrine. ✔
- b. C'est un test très sensible. ✔
- c. C'est un test très spécifique. ✖
- d. Sa valeur n'est pas interprétable chez les patients sous anticoagulants curatif. ✔
- e. Aucune de ces propositions n'est vraie. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Il s'agit d'un produit de dégradation de la fibrine., C'est un test très sensible., Sa valeur n'est pas interprétable chez les patients sous anticoagulants curatif.