Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 08:12
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 08:12
Temps mis	21 s
Points	0,50/5,00
Note	**2,00** sur 20,00 (**10**%)

Question 1

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant l'atteinte respiratoire à Sars Cov-2 (Covid- 19) initiale :

- a. Une proportion de patients ne présente pas d'atteinte pulmonaire. ✔
- b. Ce n'est pas l'atteinte pulmonaire qui généralement conditionne l'hospitalisation. ✖
- c. L'extension des anomalies radiologique semble proportionnelle à la sévérité clinique. ✔
- d. Tous les patients doivent être hospitalisés. ✖
- e. Aucune de ces propositions n'est exacte. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Une proportion de patients ne présente pas d'atteinte pulmonaire., L'extension des anomalies radiologique semble proportionnelle à la sévérité clinique.

Question 2

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant l'atteinte pulmonaire lors de la phase aiguë :

- a. Elle comporte essentiellement des lésions bilatérale plutôt périphérique sous pleurale. ✔
- b. Elle comporte essentiellement des opacités en verre dépoli de type extensive. ✔
- c. Elle n'est jamais associée à des lésions de condensation alvéolaire uni ou bilatérale. ✖
- d. Il n'existe aucun lien entre l'extension des anomalies radiologique et la sévérité clinique. ✖
- e. Aucune de ces propositions n'est exacte. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Elle comporte essentiellement des lésions bilatérale plutôt périphérique sous pleurale., Elle comporte essentiellement des opacités en verre dépoli de type extensive.

Question 3

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

D'un point de vue thrombo-embolique et cardio-vasculaire :

- a. L'épisode inflammatoire induite par l'infection à SARS-CoV-2 peut générer des lésions immédiates à type de myocardite et péricardite. ✔
- b. Les événements thrombo-embolique ne sont pas majorés. ✖
- c. Des événements thrombo-emboliques peuvent survenir pendant ou après l'atteinte pulmonaire initiale. ✔
- d. L'embolie pulmonaire est systématique. ✖
- e. Aucune de ces propositions n'est exacte. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : L'épisode inflammatoire induite par l'infection à SARS-CoV-2 peut générer des lésions immédiates à type de myocardite et péricardite., Des événements thrombo-emboliques peuvent survenir pendant ou après l'atteinte pulmonaire initiale.

Question 4

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant la survenue des symptômes tardifs au cours de la covid-19 :

- a. Ils ne vont survenir que chez les patients ayant fait des formes sévères. ✖
- b. Leur évolution est fluctuante sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. ✔
- c. Ils justifient systématiquement un bilan en hospitalisation. ✖
- d. Il convient d'éliminer une complication de la phase aiguë ou une décompensation de comorbidité dans un premier temps. ✔
- e. Aucune de ces propositions n'est exacte. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Leur évolution est fluctuante sur plusieurs semaines ou plusieurs mois., Il convient d'éliminer une complication de la phase aiguë ou une décompensation de comorbidité dans un premier temps.

Question 5

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Parmi les symptômes tardifs les plus fréquemment rencontrées, on trouve :

- a. Une fatigue pouvant être sévère ✔
- b. Les troubles neurologiques cognitifs, sensoriels, céphalées ✔
- c. Les troubles cardiothoracique ✔
- d. Les troubles de l'odorat et du goût ✔
- e. Aucune de ces propositions n'est exacte. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Une fatigue pouvant être sévère, Les troubles neurologiques cognitifs, sensoriels, céphalées, Les troubles cardiothoracique, Les troubles de l'odorat et du goût